

CONSIDERAZIONI

S O P R A

I CORPI ORGANIZZATI

Dove si tratta della loro origine, del loro sviluppo, della loro riproduzione ec. e dove si raduna in compendio tutto ciò che la storia naturale, offerisce di più certo, e di più interessante sopra questa materia.

O P E R A

DEL C. BONNET.

DELLE ACCADEMIE D'INGHILTERRA, DI SVEZIA, DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA, CORRISPONDENTE DELL'ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE, ec.

RECATA DAL FRANCESE

DAL P. F. F. N. N.

Sacerdote Professo Carmelitano Scalzo della Provincia di Toscana.

TOMO SECONDO.



IN VENEZIA,

APPRESSO FRANCESCO DI NICCOLÒ PEZZANA.



MDCCLXXXI

CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO.



3

CONSIDERAZIONI
S O P R A
I CORPI ORGANIZZATI
S E C O N D A P A R T E.

~~~~~  
CAPITOLO PRIMO.

*Compendiosa esposizione di diversi fatti concernenti le Propagini, e gl'Innesti animali. Osservazioni sopra la riproduzione de' vermi di terra, sopra quella de' vermi di acqua dolce, e sopra la rigenerazione delle zampe del gambero. Saggio della spiegazione di questi fatti.*

242. Introduzione.

**IO** ho scorso tutto ciò, che concerne le riproduzioni *vegetabili* di differenti generi: ho tirate dai fatti le conseguenze naturali, che potevano condurmi ad una spiegazione soddisfacente di queste riproduzioni. Adesso io considero sotto la medesima veduta tutto ciò, che concerne le riproduzioni *animali*, e mi ajuto co' fatti, che ci offeriscono i *vegetabili*, a tentare di spandere qualche lume sopra la rigenerazione de' *polipi*, e degli altri insetti, che possono essere *innestati*, e moltiplicati *per divisione* ec.

243. *Invito a fare delle nuove sperienze sopra i vermi di terra, per perfezionare la teoria delle riproduzioni animali, e quella della generazione.*

I maggiori *polipi* di acqua dolce sono ancora piccolissimi insetti in comparazione de' *vermi di terra*: osservando dunque con attenzione ciò, che accade nella riproduzione di questi ultimi, si può sperare di acqui-

stare de' lumi sopra la maniera , con cui si operano tutte le riproduzioni del medesimo genere. Questo fu in parte , che impegnò il Sig. di Reaumur , e me a tentare dell'esperienze sopra i vermi di terra. Oltredichè essi sono grossissimi , e conosciutissimi ; essi hanno ancora i due sessi insieme , e questa singolarità tanto rimarcabile prepara de' nuovi prodigj. La morte di questo grande Osservatore , il quale avea tanto arricchita la Storia Naturale , e che ne avea sparso il gusto , ha privato il Pubblico del ragguaglio delle sue esperienze . Noi non abbiamo di esso sopra questo interessante soggetto , se non il poco , ch'egli ne ha pubblicato nella bella Prefazione del sesto Tomo delle sue *Memorie per servire alla storia degl' insetti* , pagine 64. e 65. Io non trascriverò qui il passo , poichè non c' insegna niente sopra la maniera , per cui si fa la riproduzione della quale trattiamo. Il Sig. di Reaumur si è contentato di assicurare , che risultava dalle sue esperienze , che i vermi di terra si riproducevano dopo essere stati divisi ; e pare che gli sia stato facilmente creduto , sopra la sua parola ; almeno non conosco Naturalista alcuno , che abbia verificato il fatto , e che abbia pubblicato sopra questo delle nuove esperienze . Io sono adunque obbligato a ricorrere alle mie proprie osservazioni . Io le giudicai così imperfette alloraquando diedi al pubblico il mio *Trattato dell' Insettologia* , che schisai di farne un articolo a parte , e di annunziarle nel titolo : le rigettai alla fine del libro , ed in un luogo dove pochi Lettori le avranno vedute ; cioè nella *Spiegazione delle Figure* . Mi si permetta adesso di trarle da questa spezie di oscurità , mentre benchè imperfette come sono , elleno contengono delle particolarità essenziali pel mio scopo . Io non le avrei lasciate così imperfette , se i miei occhi fossero stati assuefatti a contemplare la natura ; ma io non posso far altro , se non efficacemente esortare i Fisici , che han-

hanno a cuore lo schiarire il gran mistero della generazione, a riprenderle, e ad attaccarvisi con preferenza. Questo soggetto è tanto secondo in maraviglie, che eglino non tarderanno ad essere ricompensati de' loro travagli. Reca maraviglia, che dappoichè si è saputo, che i vermi di terra si riproducevano per divisione, non siasi trovati degli osservatori che ne abbiano fatto l'oggetto principale delle loro ricerche: ma tra il piccolo numero degli uomini, che coltivano la Storia Naturale, quanti ve ne sono eglino, che si dilettono dello studio degl'Insetti? E tra questi ultimi quanti ve ne sono eglino, che vogliano consacrarsi allo studio di un solo Insetto. Imperciocchè vi sono tali spezie d'Insetti, che potrebbero stancare la pazienza, e la sagacità dell'osservatore il più laborioso, ed il più intelligente; il polipo ne somministra un bello esempio, e il verme di terra benchè vile in apparenza, non la cede punto in questa linea, al polipo. L'autore della Natura ha impresso, per così dire, a tutte le sue opere il segno della sua immensità, e non ven'è alcuna di cui noi possiamo sperare di comprenderne il fondo.

244. *Esperienze dell'Autore sopra la riproduzione de' vermi di terra.*

Un verme di terra diviso trasversalmente in due, o più porzioni non muore già, ma se si ha l'attenzione di tener ciascheduna porzione in un luogo convenevole, ella vi si rigenererà alla fine di un tempo più, o meno lungo. Soventi volte nulladimeno accaderà che tutte, o quasi tutte periranno senz'aver data prova alcuna della rigenerazione: questo lo provai nel 1742. Fui più felice nel 1743., e se non vidi allora tutto ciò, che desideravo di vedere, vidi almeno abbastanza per esser securissimo, che il verme di terra si riproduce per divisione. Un verme di questa specie, che avevo diviso trasversalmente per mezzo del corpo il 27. di Luglio, incominciò il

15. di Agosto soddisfare la mia curiosità. Dalla estremità posteriore della parte anteriore, di quella dov'era la testa dell'Insetto, usciva un'appendice vermiforme sottilissima, lunga circa 8. o 9. linee, e di un colore più chiaro che il resto del corpo. Osservata più da vicino sembrava essere un piccolo verme, che pullulava dalla estremità del grande, e sopra la medesima linea. Io posso assicurare, che questa comparazione è esatta, e coloro che ripeteranno questa esperienza facilmente ne converranno. Quell'appendice, o per ispiegarmi più esattamente, quella nuova parte posteriore era organizzatissima. Ella era formata di una successione di anelli ferratissimi, e sopra le coste de' quali si vedevano le aperture destinate alla respirazione, e che sono chiamate *stimate*. Si sa, che ciascuna di queste *stimate* corrisponde ad un mazzo di *trachee*, che imitano perfettamente quelle delle piante, delle quali ho parlato nell'articolo 220. La rigenerazione delle *stimate* suppone adunque quella delle *trachee*, e delle loro ramificazioni. Ma quello, che la produzione di questa nuova parte posteriore mi offerì di più interessante, fu la grande *arteria*, o quel vaso, che tiene il luogo del *cuore* negl'insetti. Egli regnava da una estremità all'altra di questa nuova parte, e li suoi movimenti alternativi di *sistole*, e di *diastole* erano estremamente sensibili. Egli sembra contrarsi, e dilatarsi sopra una maggior parte della sua estensione, lo che non faceva l'arteria maggiore de' vermi di acqua dolce, che ho moltiplicati per *divisone* (1). In questi l'arteria pareva contrarsi, e dilatarsi di anello in anello. Direbbesi, che ogni anello contenesse un piccolo cuore, che la sua *sistole*, e la sua *diastole*, e che ogni arteria non è, che una successione di piccoli cuori messi a filo, e che si trasmettono

(1) Vedi l'articolo 192., e il mio *Trattato dell'Insetto-logia* pag. 10. e 11. della Seconda parte.

tono successivamente il sangue. Si vede qualche cosa di analogo nel *verme da seta*; e questo fece credere al Malpighi, che esso fosse una catena di cuori. (1). Ma quando il distillamento di questo vaso non avesse provato il contrario al Sig. di Reaumur, (2) l'arteria del nostro verme di terra basterebbe per convincerci della sua *unità*; ogni sistole, ed ogni diastole non erano contenute nella lunghezza di un anello; elleno sembravano manifestamente abbracciarne molti. La circolazione del sangue si faceva in questa nuova produzione, come nel resto del corpo, dall'estremità posteriore verso l'anteriore. Il sangue della maggior parte degli insetti è un liquore trasparente, e quasi senza colore, e che senza essere spiritoso può in alcune specie resistere ad un freddo superiore a quello del 1709. (3): il sangue de' vermi di terra ha il colore proprio del sangue degli altri animali i più conosciuti; egli è di un bel colore assai rosso. Mi era dunque altrettanto più facile l'assicurarmi della direzione del suo moto nella produzione che io esaminavo. Alla fine di un mese e mezzo, a contare dal giorno dell'operazione, questa nuova parte posteriore, al principio così gracile, avea acquistata una grossezza uguale quasi a quella del resto del corpo, ed era proporzionalmente in lunghezza. Il suo colore avea presa una tinta più oscura, e li nuovi *intestini* erano pieni di terra. Si fa, che questa specie di verme se ne nutrisce. Gl'intestini nuovamente rigenerati erano dunque capaci di fare le loro funzioni. Dopo aver veduto quello, che io racconto, farebbesi accordato senza dubbio al verme di terra il riprodursi per divisione: non si trattava, che di seguitare i progressi di questa riproduzione. Si noti, che il verme, di cui io

A 4

parlo

(1) *Differratio de Bombyce.*(2) *Memorie per servire alla Storia degli Insetti Tom. I.*(3) *Ibidem Tom. II.*

parlo era stato diviso trasversalmente pel mezzo del corpo. Io ho raccontato i progressi della prima metà. La seconda dovea riprodurre una nuova parte anteriore, dove dovea trovarsi una testa, ed in poca distanza da questa, degli organi compostissimi, voglio dire, quelli che caratterizzano i due sessi. Io l'osservai più di nove mesi senz'chè mi desse segno alcuno di riproduzione, e quantunque essa non avesse potuto prendere nutrimento alcuno per sì lungo tempo, pareva, che non avesse perduto niente della sua agilità. Essa stava ordinariamente immobile, e raccolta sopra se medesima: ma quando la mettevo sopra la mia mano, vi dava movimenti vivissimi. Io la vedevo ancora immergersi nella terra, come avrebbe potuto fare un verme intiero. Si giudica bene, che la sua vita avesse sofferto una considerabile diminuzione. Ella avea preso un colore biancastro, e molta trasparenza. Ella finalmente morì di debolezza. Siccome la parte anteriore del verme di terra contiene un maggiore apparato di organi della parte posteriore, la riproduzione di quella non può farsi così prontamente, come la riproduzione di questa; la natura ha dunque messo il verme di terra in istato di sostenere lunghissimi digiuni. Colla speranza di arrivare ad osservare la riproduzione della parte anteriore, io feci molte altre sperienze. Io tagliai la testa, ed i primi anelli ad un verme di terra verso la fine di Luglio. Verso la metà di Agosto questa enorme piaga erasi perfettamente cicatrizzata; ma l'animale non dava ancora segno alcuno di riproduzione. La piaga era circonscritta da un orlo, che sporgeva molto in fuori, e lo formavano le antiche carni, e la superficie del taglio pareva cresciuta in forma di ranuncolo. Dopo molti giorni vidi nel centro di questa cavità un punto bianco, che ingrossandosi appoco appoco prese la figura di una piccola gemma. Era una nuova parte anteriore, che incominciava a svilupparsi. Il ven-

ti di Settembre questa gemma s'era allungata, e si terminava in una punta ottusa. Il 2. di Ottobre l'allungamento era maggiormente sensibile; la nuova produzione si mostrava allora sotto l'apparenza di un piccolo verme, che nasceva dal mezzo della cicatrice. Nel mese di Novembre, e di Dicembre, la nuova parte anteriore continuò a prolungarsi: ella ingrossava proporzionatamente, e la cavità della cicatrice insensibilmente scancellavasi. La morte dell'insetto interruppe queste osservazioni. Se si vuole acquistare un'idea più chiara de' progressi di questo sviluppamento, bisogna consultare le Figure I. II. III. e IV. della Tavola terza della seconda parte del mio Trattato dell'Infettologia. Quantunque queste Figure non sieno che grossamente sbazzate, posso però dire, che le proporzioni sono esatte. Io ho osservati i medesimi fenomeni intorno a' vermi di terra, divisi in tre, quattro, o cinque porzioni. Ho veduto delle porzioni intermedie germogliare nel medesimo tempo una parte anteriore, ed una parte posteriore; ma i progressi di questa furono costantemente maggiori, in tempo eguale, che i progressi di quella. Allorchè la parte posteriore avea già tre linee di lunghezza, la parte anteriore non si mostrava ancora se non sotto la forma di un piccolo bottoncino; ed allorchè questa ultima avea acquistata una lunghezza di due, o tre linee, l'altra n'avea almeno sei. Tutti questi vermi perirono avantichè mi fosse permesso di vederla riproduzione compita di una parte anteriore. Io era almeno arrivato a soddisfarmi sopra i primi progressi della rigenerazione; e prego il mio Lettore a stare attento alle conseguenze, che se ne deducono.

245. *Conseguenze di queste esperienze. Parallelo delle riproduzioni de' vermi di terra con quelle de' vegetabili. Conformità dell'une, e dell'altre.*

Allorchè si scorona un albero, o che si taglia uno  
de'

de' suoi rami maestri, in qualche distanza della sua origine, il tronco non si prolunga; ma si forma sopra gli orli della circonferenza del taglio un cordone, donde escono de' piccoli bottoni, che danno nascita a de' nuovi polloni. Questi polloni non sono propriamente prolungamenti del tronco; eglino hanno una organizzazione particolare; eglino hanno delle parti, che li distinguono, e che si vedono contenute in piccolo nel bottone. In una parola essi medesimi sono alberi completissimi; e che non differiscono da quello sopra il quale sono cresciuti, che per la loro estrema delicatezza, e picciolezza. Il mio Leggitore non ha obbliato ciò, che ha veduto di sopra, nel Capitolo precedente, ed in molti luoghi di questa Opera. Io lo rimetto sopra tutto a quello che ho detto nel articolo 238. lo ho toccato a bella posta ciò, che passa nella rigenerazione de' vegetabili; se si rassomiglia con quello, che accade nella rigenerazione de' vermi di terra, recherà maraviglia; nè sono sicuro dell'analogia, che si osserverà in questo punto tra il vegetale, e l'animale. Ne' vermi di terra, che si sono divisi, il tronco non si prolunga altrimenti, egli rimane tale, come era avanti l'operazione; ma dal centro della cicatrice esce un piccolo Bottone, che s'ingrossa, e si allunga di giorno in giorno, e si mostra finalmente sotto la forma di un verme nascente innestato in qualche maniera sopra il tronco. Si riconosce ad evidenza, che non sono le antiche carni del tronco, che in prolungandosi hanno somministrata questa produzione. Non si può dissimulare, che non sia questo un nuovo tutto organico, che si sviluppa, un tutto, le di cui parti costituenti, contenute da principio in piccolissimo in una gemma, si estendono per tutti i versi, e si mostrano appoco appoco sotto la forma di un piccolo verme innestato sopra il grande. Non si può impedire di rassomigliare questa gemma *animale* alla gemma *vegetale*, e.

il piccolo verme al *pollone*. La nuova produzione nell' animale, come nel vegetale, alla sua nascita, è di un composto delicatissimo; tutto è molle, ed erbaceo, ed il suo colore al principio chiarissimo si rinforza per gradi. Io non accenno che i tratti più maravigliosi di questa analogia: eglino bastano, come mi sembra per farne conoscere la verità. Eglino mi serviranno ben tosto a spiegare de' casi più difficili.

246. *Esperienze dell' Autore sopra la riproduzione di una specie di vermi d'acqua dolce.*

La riproduzione de' vermi d'acqua dolce, che io ho moltiplicati per *divisione*, offerisce le medesime particolarità essenziali, che quella de' vermi di terra; ma il tutto s'opera assai più presto in quelli, che in questi. Non bisognano ordinariamente che pochi giorni in uno innesto, acciocchè le porzioni de' nostri vermi d'acqua dolce diventino animali completi, ai quali non resta più, che prendere un maggiore accrescimento. Le parti anteriori, e posteriori, che questi vermi riproducono, si mostrano ancora successivamente sotto le forme di bottone, di punta ottusa, e di verme nascente. L'antico tronco, come ho detto, nell'articolo 167. non cresce. Io l'ho misurato molte volte dopo l'operazione, ed al fine di due anni gli ho trovate le medesime dimensioni. Per tutto questo lungo intervallo di tempo, mi è stato sempre facile il distinguerlo pel suo colore, dalle parti *riprodotte*. Egli è di un rosso bruno; le parti, che germogliano dalle sue estremità, al principio sono biancastre, e giallognole, e non va molto in lungo, ch'elleno diventano brune.

247. *Maniere colle quali si fa la riproduzione. Circostanze, che la precedono, e che la seguitano.*

Avantichè le porzioni de' vermi incominciassero a perfezionarsi, ho sovente veduto all'estremità del tronco un piccolo rigonfiamento, una specie di *cordone*, che mi pareva analogo a quello, che noi abbia-

mo

mo veduto formarfi sopra le piaghe degl'alberi. Egli appariva più dall'estremità anteriore, che dall'estremità opposta. Dal centro di questo cordone usciva spesso un piccolo bottone, che in isviluppandosi diveniva una nuova parte anteriore, o posteriore. V'era questa differenza rimarcabile tra l'accrescimento della parte anteriore, e quello della posteriore, che la prima cessava di crescere dacchè ella era arrivata alla lunghezza di una linea, ad una linea e mezzo; l'altra al contrario continuava ad allungarsi, ed acquistava qualche volta una lunghezza di molti pollici. La parte anteriore di questi vermi contiene la testa, ed una moltitudine di anelli, che si sviluppano successivamente. Io ho descritta nel mio Trattato la figura di questa *testa*, e le differenti forme, sotto le quali si fa vedere la *bocca*: ho descritte ancora quelle dell'*ano* (1). Ogni volta che io ho separata la parte anteriore dal resto del corpo, ella è morta al fine di un giorno, o due senza fare alcuna produzione. Io non ho mai veduto eccezione a questa legge, e le mie esperienze sopra questo punto sono in gran numero. Non è già succeduto il medesimo della parte posteriore: io do qui questa denominazione all'estremità del corpo, dove esiste l'ano, ed un seguito di anelli della lunghezza di una linea, ad una linea, e mezzo. Non si deve cercare la ragione di questo fatto nella piccola lunghezza delle parti, perchè porzioni molto più corte, ma prese sopra la metà del tronco, arrivano benissimo a riprodurre una testa, ed una coda (2). Noi vedremo ben tosto ciò, che si può pensare di più probabile sopra questo soggetto.

248. *Tubercoli, che germogliano le porzioni di questa specie di vermi. Conghietture sopra la loro natura.*

Mentrechè ero occupato a seguitare la vegetazione delle

---

(1) Osserv. I. pag. 7. 8. 9. della seconda parte.

(2) Osservazione XIII.

delle differenti porzioni de' miei vermi acquatici, vidi sopra il dorso di molti, quasi dall'estremità anteriore, o dall'origine della parte nuovamente riprodotta, una specie di bottone, o di tubercolo, di colore bianchiccio, e che formava col corpo un angolo più o meno aperto. Osservai ancora di questi tubercoli dalle due parti della testa, e in poca distanza dall'ano; e mi fecero risovvenire la moltiplicazione de' polipi per germogli. Io non potei dispensarmi dal supporre, che fossero vermi nascenti, vermi che venissero alla luce nella maniera de' polipi. Io mi aspettavo adunque di vederli crescere, e dopo separarsi dalla loro madre: ma fui ingannato nella mia aspettativa, e tutti quei bottoni, o tubercoli sparirono al termine del giro di tre settimane senz'aver prodotto niente (1). Io comunicai la mia osservazione, e la mia conghiettura al Sig. de Reaumur, che mi diede questa risposta, in data degli undici Novembre 1742. *I miei vermi assai simili ai vostri, che io ho trovati in quantità ne' contorni di Reaumur; e che lo stesso si trova qui, mi hanno fatto vedere di questi tubercoli, ed era molto naturale il credere, che fossero parti, che incominciassero a germogliare. Ma sopra i miei vermi, come sopra i vostri, questi tubercoli non hanno prodotto nulla.*

249. *Continuazione del medesimo soggetto. Verme da due teste, e da due volontà.*

Io non deciderò nientemeno se, questi tubercoli sieno parti anteriori, o posteriori soprannumerarie, che incominciano a svilupparsi; e' si mostrano almeno sotto la forma, che hanno nel nascere. Sembrerebbe confermarlo una esperienza, che io ho riportata in sufficiente dettaglio alla pag. 113. e seguenti della seconda parte del mio *Trattato dell'Insettologia*. Io v'ho fat-

ta

---

(1) Osservazione XIX. XX. pag. 111. 120. 121. della seconda parte.

ta menzione di uno di que' vermi acquatici, a' quali io ero arrivato a dare due teste, in tagliando l'estremità di un tubercolo, ch'erafi alzato presso la parte anteriore nuovamente rigenerata. La parte, che io chiamerò *soprannumeraria*, formava un angolo presso a poco diritto col tronco. Ella compariva al microscopio tanto perfetta, come quella, che s'era sviluppata nell'ordine naturale: ma avendo di nuovo tagliata questa ultima, l'antico stomaco non si riempì più di terra. Ciò prova o che questa parte soprannumeraria non era tanto perfetta com'ella sembrava, o ch'ella non avea comunicazione coll'antico stomaco; perchè questi vermi si nutrono della medesima terra, nella quale eglino fanno la loro dimora. Io ho fatto osservare nel mio libro „ che le due teste non „ aveano una medesima volontà: poichè, allorchè „ una tirava da una parte, l'altra tirava dalla parte „ opposta; e che ordinariamente la più antica, e „ quella, ch'era germogliata la prima, trasportava „ seco la più giovane “. Io aggiugnerò, che questa era un poco inferiore all'altra in grandezza, ma non era tanto piccola, che dovesse parere un verme nascente, ed ella non serbava nel suo accrescimento le medesime proporzioni, che avrebbe dovuto osservare. Ella avea tutte le proporzioni, e quasi tutte, che sono proprie della parte anteriore. Si può consultare la Figura 16. della prima tavola delle mie *Osservazioni sopra i vermi d'acqua dolce ec.* (1) Queste considerazioni non mi permisero di risguardarla come un piccolo verme, che fosse restato innestato sopra il grande. Il Sig. di Reaumur non ha lasciato di preferire nemmeno questa ultima conghiettura, come si vede dall'estratto seguente di una lettera, ch'egli mi scrisse agli undici Novembre 1743. *Le due teste,*

---

(1) Seconda parte del *Trattato dell'Inferologia*.

ste, che voi siete arrivato a dare ad un verme, sopra il corpo del quale vi erano di quei tubercoli simili a quelli, che abbiamo osservati voi, ed io sopra le porzioni de' vermi tagliati; queste due teste, dico io, non mi sembrano punto contrarie all'idea, che ci parve allora la più probabile riguardo alla natura di questi tubercoli; a quella, che ce li fece supporre vermi nascenti; perchè in mezzo della sezione, il verme, che deve nascere, sembra, che sia rimasto innestato sopra l'altro: le due volontà contrarie, che voi credete avere osservate nelle due teste, favoriscono questo sentimento. Io non insisterò attualmente sopra le due volontà, di cui parla il Sig. de Reaumur; ma mi spiegherò altrove sopra questo punto di metafisica.

250. Piccolissimi vermi usciti dall'interno di alcune porzioni di un verme grande.

Nel dividere di questi vermi, mi è accaduto più di una fiata il vedere uscire dall'interno di alcune delle loro porzioni, de piccoli vermi viventi, di un color bianco assai vivo, e che nuotavano con molta vivezza. Nell'osservazione XVII. della seconda parte del mio Trattato, mi sono intertenuto a descrivere la figura, e i varj movimenti di uno di questi piccoli vermi venuto alla luce sotto i miei occhi, mediante un'operazione equivalente alla Cefariana. Io ho procurato di provare, che questo piccolo verme era della medesima specie di quello, dall'interno del quale l'avevo in qualche maniera estratto, e ne avea inferito, che questa specie era vivipara; ma un esame più scrupoloso del fatto mi porta al presente a pensare, che io non sia stato esatto nella conseguenza, che ne ho tratta. L'esteriore del piccolo verme offeriva delle particolarità, che non si vedono nella specie di cui parlo: li suoi anelli erano molto segnati, e la sua coda si terminava da un fiocco di piccoli peli in forma di alette, e che sembravano farne le funzioni. I suoi movimenti differivano moltissimo da quelli,

li, che sono proprj alla specie, di cui si tratta. Io dunque supporrei più volentieri, che questo piccolo verme fosse stato inghiottito da quello stomaco, dal quale l'aveo fatto uscire. Conferma ancora questo supposto, poichè egli era impantanato quando nacque della medesima materia terrosa, di cui lo stomaco dell' insetto è ordinariamente ripieno. Un accidente improvviso avendomelo tolto alla fine di sei settimane, non potei avere il seguito della sua storia: ma dirò ch'era cresciuto sensibilmente.

251. *Esperienze dell'Autore sopra un'altra specie di vermi d'acqua dolce. Quanto questa specie sia degna di osservazione, per la singolarità delle sue riproduzioni, ed in che consista questa singolarità. Che ancor essa germoglia de' tubercoli.*

La specie de' vermi d'acqua dolce, e senza gambe, sopra la quale io ho fatto il maggior numero delle mie esperienze, è di un colore bruno rossigno: io ne ho scoperta un'altra, che non ne differisce se non pel colore: quella specie, di cui parlo adesso è albiccia, o bigiccia. Io ho fatto vedere nella seconda parte del mio Trattato, Osservaz. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. quanto meriti questa nuova specie l'attenzione de' Naturalisti. Allorchè io ho diviso trasversalmente il tronco in due, o più porzioni, ciascheduna porzione ha germogliato dalla sua estremità anteriore una coda, in vece di una testa; ma allorchè io non ho fatto che tagliare la testa alla parte anteriore, l'insetto ne ha riprodotta una nuova simile a quella, che gli era stata tagliata. Non si deve presumere, che io mi sia lasciato imporre alla veduta di questa corda soprannumeraria: io ho veduto questo fatto singolare un troppo gran numero di volte, e l'ho osservato con troppa attenzione, ed è difficile che io mi sia ingannato. Se si legge ciò, che io ho riportato alla pag. 132. della seconda parte del mio Trattato, non resterà, cred'io, dubbio alcuno sopra la verità

rità dell'osservazione. „ Non era, dissi, come potrebbesi supporre, una testa più magra dell'ordinario, „ una foggia, per così dire, di testa, e di coda; era „ una coda benissimo formata, dove l'ano era distintissimo; in una parola una coda assolutamente tale, come deve essere quella di questa specie di vermi. E per finire di metter la cosa fuori d'ogni dubbio; quella parte ch'era germogliata nel luogo della testa, non era capace di alcuno de' movimenti, che vedonsi fare a questa: ella non si raccorciava, nè si allungava, ella non si contraeva, nè si dilatava. Il verme non ne facea uso alcuno, nè per nutrirsi, nè per ajutarsi a camminare; se li vedeva solamente agitare di tempo in tempo la sua parte anteriore, portarla a dritto, ed a sinistra, ma senza fare il minimo tentativo per cambiare di luogo. Avrebbe si detto, ch'è conosceva il suo stato; egli avea l'aria, per così dire, imbarazzata. Del resto, e questo non devo trascurare di farlo osservare, il corso del sangue non avea cambiato punto la direzione. Egli continuava a farsi dall'estremità posteriore all'anteriore. Finalmente, per non lasciar niente da desiderare, io dirò ancora, che le porzioni di questi vermi, a' quali è accaduto di germogliare una coda invece di una testa, non hanno mai preso nutrimento alcuno; il loro stomaco, ed i loro intestini sono stati sempre trasparentissimi, ed è degno di osservazione, poichè io ne ho avuti, che sono vissuti in questo stato, per lo spazio di sette mesi. Questo caso è simile a quello di quella metà del verme di terra, di cui ho parlato, e che avea sostenuto un digiuno più lungo ancora. Del resto questa specie di vermi d'acqua dolce germoglia altresì di que' *tubercoli*, che sembrano analoghi a' germogli de' polipi a *branche*: io ne ho contati fino a otto sopra la medesima porzione, quattro per ciascheduna parte, ma sono spariti appoco

appoco senza produr niente, come ho raccontato di quelli dei vermi d'acqua dolce della prima specie.

252. *Fenomeni della riproduzione delle zampe del gambero.*

Io non ho messe quì le mie osservazioni sopra i vermi di acqua dolce, in seguito di quelle sopra i vermi di terra, che per la ragione de' rapporti, che si osservano nella maniera, per cui l'une, e l'altre si rigenerano. Perchè la mia intenzione al principio era stata di cercare in animali più grossi de' polipi, che potessero ajutarmia spiegare la riproduzione di questi ultimi: ma i vermi acquatici, che ho più seguitati, non sono più grossi dei polipi. Io ritorno dunque adesso alla mia prima intenzione; e dirò qualcosa di una rigenerazione singolare, che ci offerisce un animale di una mostruosa grandezza in comparazione de' polipi; io ho veduto il *gambero* d'acqua dolce molto tempo avanti che si conoscesse la riproduzione del polipo. I Fisici ammiravano quella delle zampe del gambero: ma nissuno l'avea osservata con maggiore esattezza, e sagacità, come il Sig. de Reaumur (1). Le zampe del gambero hanno cinque articolazioni, se si conta dall'estremità del piede, dalla quarta la zampa si rompe più frequentemente, e si riproduce più facilmente. Allorchè la zampa è stata rotta in questo luogo, o vicino a questo luogo, per accidente, o a bella posta, la parte che resta attaccata al corpo, e che contiene due articolazioni, mostra dalla sua estremità anteriore un'apertura rotonda, che si può rassomigliare a quella di uno stuccio di squamma. Una sostanza carnosa occupa tutto l'interiore di questo stuccio. Al termine di un giorno, odue, se è in istato, una membrana rossigna ferra l'apertura, in estendendosi sopra come un pezzo di panno. Ella al principio

---

(1) *Memorie dell' Accademia Reale delle scienze*, an. 1712.

pio è piana; quattro, o cinque giorni dopo prende della convessità. Questa convessità cresce. Il mezzo, o il centro s'innalza più del resto; egli s'innalza sempre più: sembra un piccolo cono; e questo cono non ha da principio che una linea d'altezza. Egli s'allunga senzachè la base si allarghi, e in capo a dieci giorni, alle volte è alto più di tre linee. Egli non è voto, le carni lo riempiono; e queste carni sonogli elementi di una nuova zampa. La membrana, che le involuppa, fa risguardo alla zampa nascente, l'offizio delle membrane del feto. Ella si estende a misura, che cresce l'embrione. Allorachè è molto densa, non lascia vedere che un cono allungato. Dopo quindici giorni questo cono s'inclina verso la testa dell'animale; e s'incurva maggiormente ne' giorni seguenti, ed incomincia a prendere la figura di una zampa di gambero morto. Questa zampa ancora incapace di operazione acquista fino dasei in sette linee di lunghezza in un mese, o cinque settimane. La membrana, che la ferra, divenendo più sottile a misura ch'ella si estende, permette di vedere a traverso le parti proprie della zampa, e si conosce allora, che questa massa conica non è una semplice carnosità. È venuto il momento, nel quale la zampa nasce. A forza di affottigliarsi la membrana si rompe, e lascia allo scoperto la nuova zampa ancora molle, e che in capo a pochi giorni si trova ricoperta di una scaglia tanto dura, quanto quella dell'antica zampa; ella non ha poco più che la metà della sua lunghezza, ed è sottilissima; nulladimeno fa tutte le sue funzioni. Se invece di tagliare la zampa alla quarta giuntura, si taglia altronde, e se non si faccia che staccare il piede, o una parte del piede, l'animale ricupererà precisamente quello, che avrà perduto. La medesima riproduzione si opera nelle gambe, e nelle corna; ma la coda non si rigenera, ed il gambero, a cui si è tagliata, non sopravvive che pochi giorni dopo l'operazione.

253. *Saggio della spiegazione de' fatti esposti in questo Capitolo. Principj importanti tratti dalle riproduzioni vegetali. Applicazione di questi principj alle riproduzioni animali, di cui si fa quistione.*

Avanti di tentare di applicare queste osservazioni alla moltiplicazione de' polipi, torniamo sopra di noi, e procuriamo di dedurre dai fatti, le conseguenze naturali, che possono condurci ad una spiegazione filosofica delle riproduzioni, che io descrivo. Io ho fatto vedere in questo Capitolo, quanto la riproduzione de' vermi di terra è analoga a quella de' vegetali; io ho dimostrato dopo, che non v'ha men di analogia tra la riproduzione de' vermi d'acqua dolce, e quella de' vermi di terra. Una nuova scorza, un nuovo legno, devon la loro nascita a delle specie di filamenti contenuti nell'antica scorza, o nell'antico legno, che si estendono, si condensano, e si formano appoco appoco delle sottili lame, concentriche l'une all'altre. Un nuovo ramo trae la sua origine da una gemma, che contiene un pollone, e questo pollone è un ramo in piccolo, e le di cui partigj preformate coesistono insieme. Io chiamo questo pollone un *tutto organico*, perchè egli rappresenta la *specie* in piccolo. Egli è facile il concepire, che un ramo è un piccolo albero, che cresce sopra un'albero grande della medesima specie. Io non risguardo come veri *tutti organici*, i filamenti, e le lame, da cui la scorza, ed il legno traggono la loro origine. La scorza, od il legno non sono, a propriamente parlare, esse parti costituenti di un tutto organico. Egli non rappresentano in piccolo, perchè questa rappresentazione appartiene alle forme, alle proporzioni, ad un ordine, e ad una organizzazione, che non si trovano nelle semplici fogliette corticali, o legnose. Ma queste fogliette sono rappresentate in piccolo da filamenti gelatinosi, che le producono, e che si sviluppano nella maniera, che ho descritta nel Capitolo precedente. Così nell'

ani:-

animale la rigenerazione di una nuova pelle appartiene, come quella di una nuova scorza, a de' filamenti gelatinosi, che da una derivazione accidentale di succhi nutritizj sono messi in istato di svilupparli. Questo si conosce osservando tutto quello, che accade nella consolidazione delle piaghe. Si vede abbastanza, che questi filamenti erano parti infinitamente piccole dell'antica pelle, che non sarebbonsi forse mai sviluppate senza l'intervento di una causa accidentale, e che erano riserbate per questa, o per altre circostanze analoghe. Io rimando sopra all' articolo 236. Ma quando si tratta di produrre nell'animale un nuovo tutto organico, ed una nuova parte *integrante*, ch'è essa medesima in qualche modo un nuovo tutto organico, la natura sembra occuparsi della medesima maniera, che per produrre nel vegetabile un nuovo ramo. Ella ha preformato questo ramo, ella l'ha ferrato in piccolo in un bottone, e la sua produzione è meno una vera *generazione*, che il semplice sviluppamento di ciò, ch'era, già tutto formato. La natura sembra avere della medesima maniera ferrato in piccolo, in una specie di gemma, le parti che gl' insetti riproducono in luogo di quelle, che hanno perdute. Questo si vede per così dire, chiaramente nella moltiplicazione de' vermi per divisione, e nella riproduzione delle zampe del gambero. La nuova parte passa per tutti i gradi di accrescimento, pe' quali l'animale medesimo è passato per arrivare allo statodi perfezione. Si trova in esso al printipio la medesima forma essenziale, i medesimi organi, ch'è per offerire dopo in grande. La circolazione del sangue è visibilissima in quell'appendice vermiforme tanto sottile, che germoglia all'estremità posteriore di un verme di terra, e che deve diventare una nuova parte posteriore. Le arterie suppongono delle vene; l'une, e l'altre suppongono de' nervi, e molti altri organi. Tutto questo coesiste dunque nel

medesimo tempo; poichè come concepire, che differenti parti destinate a formare un medesimo tutto, a concorrere insieme al medesimo fine, e di cui per conseguenza tutte le azioni sono cospiranti, o relative, sieno prodotte l'une dopo l'altre *per apposizione*, o per una segreta meccanica? Come potrebbe si ammettere una tal formazione, quando uno è arrivato ad assicurarsi, che tutte le parti del pollo coesistono insieme molto tempo avanti che cadano sotto i nostri sensi? (1) Perchè la parte che si riproduce è ella tanto sproporzionata a quella, di cui prende il luogo? Perchè è ella tanto molle, tanto delicata, e tanto sottile? Perchè le sue articolazioni sono elleno tanto ferrate, tanto vicine l'une all'altre? Non è l'antico tutto, ed il tronco, che cresce, e forma questa nuova produzione; è un nuovo tutto, che si sviluppa nell'antico, e coll'ajuto de' succhi, che questi gli somministra. Io non credo, che sia possibile il negare questa conseguenza, alloracchè si è tenuto dietro con attenzione alla rigenerazione de' vermi, che moltiplicano per divisione, e che si è veduto, e riveduto co' proprj occhj cento volte questa maravigliosa rigenerazione. Ma i Fisici, che hanno confutato il sentimento, che io addotto, sembra, che abbiano più bramato la gloria di ritrovare un nuovo sistema, che il piacere più filosofico, e meno strepitoso di studiare la natura in un insetto. Io quì non fo sistema, perchè non intraprendo a spiegare, come si formi l'animale: io lo suppongo preformato dal principio, ed il mio supposto si fonda sopra dei fatti, che sono stati molto osservati. Invano si obietterebbe, che se si potesse prendere l'animale più avanti, non troverebbesi preformato; imperocchè io non penso, che si possa prendere più avanti, come pen-

---

(1) Vedi il Capitolo IX. del Tom. I.

pensò il Sig. de Haller , allorchè dimostrò che il pollo preesiste nell'uovo avanti la fecondazione (1).

254. *Conseguenza.*

L' Autore della natura ha dunque posto nell' ovaja della gallina i germi dei polli , che ne devono nascere . Si può dire , ch' egli ha poste nella medesima maniera nel corpo di diversi vermi delle specie di ovaje , che contengono de' germi prolifici . Ma le ovaje della gallina occupano un luogo particolare , quelle de' nostri vermi sono sparse per tutto il tronco . L' esperienza lo dimostra , poichè in qualunque luogo del tronco si faccia la sezione , egli riproduce de' nuovi organi .

255. *Esame della quistione , se i medesimi germi servano ed alla moltiplicazione naturale della specie , ed alla riproduzione delle parti tagliate . Comparazione tratta dalla differenza essenziale , ch' è tralla plantula esistente nel seme , e quella , ch' esiste nella gemma del legno .*

Se si risguardano i tubercoli , che io ho veduti alzarsi sopra il corpo de' vermi d'acqua dolce , come analoghi a' germogli de' polipi a branche , questi saranno piccoli vermi , i di cui germi nascosti nell' interiore della madre , si svilupperanno secondo certe leggi . Questi germi devono rappresentare in piccolo un animale perfetto , poichè sono preparati per la moltiplicazione naturale dell' insetto . Ma non è egli il medesimo de' germi destinati a riparare la perdita dell' una , o dell' altra delle estremità ? Questi germi contengono eglino altresì gli elementi di tutte le parti proprie dell' insetto ? Sono eglino l' insetto medesimo in piccolissimo ? Non vi è altro , che la parte anteriore , che si sviluppi nel germe destinato a riparare la perdita della testa ec. ? Mi è parso di aver ammesso nel Capit. IV. articoli 50. 51. e 52. ed ho accennate alcu-

(1) Nel medesimo luogo , Primo fatto.

alcune cause, che possono impedire l'accrescimento di quella parte del germe, che non deve svilupparsi. Al presente, che vi ho fatta maggior riflessione, io non vedo inconveniente alcuna a supporre in queste specie di vermi, de' germi delle parti anteriori, e de' germi delle parti posteriori. Questa ipotesi mi sembra soggetta a minori difficoltà di quella dell'obliterazione di una parte del germe. Se si ammettono de' germi particolari per la produzione de' denti, perchè si ricuserà di ammetterne per la produzione delle parti molto più composte, e la di cui formazione ripugna ancora molto alle spiegazioni meccaniche? Una osservazione presa da' vegetali, sembra confermare questa diversità di germi nel medesimo individuo. Il granello, *ossia il seme*, che opera la moltiplicazione più naturale del vegetale, contiene una pianta perfetta. Una dissezione grossolana basta per mettere in evidenza le principali parti di questa piccola pianta, io voglio dire, la *plumula*, e la *radicula*. Si sa, che lo sviluppo della prima produce il tronco, ed i suoi rami, e che lo sviluppo della seconda produce la radice maestra, e le sue ramificazioni. Il germe contenuto originalmente nel seme è dunque un' intera pianta in piccolo. Una gemma del *legno* non contiene al contrario, che la *plumula*; io ne ho detta altronde la ragione. Le radici, che derivano da' cordoni, traggono la loro origine dalle *papille*, e queste papille sembrano fare rispetto a loro, l'ufficio delle gemme. Una simil gemma non contiene più che la *radicula*. Vi sono dunque nel vegetale de' germi di plumule, e de' germi di radicule, come ve ne sono, che contengono nel medesimo tempo, e la plumula, e la radicula. Ne' vermi, che si moltiplicano per divisione, i germi, che non contengono, che delle parti anteriori, o posteriori, possono essere assomigliati a' germi vegetali, che non contengono, che delle plumule, o delle radicule. I germi destinati ad ope-

rare

rare la moltiplicazione naturale dell'insetto, possono essere assomigliati della medesima maniera ai germi conteuti ne' semi. Potrebbe uno esser curioso di sapere il pensiero del Sig. de Reaumur sopra la presente quistione: si vedrà nell'estratto seguente di una Lettera, che mi scrisse li 21. Dicembre 1742. „ La continuazione delle vostre osservazioni „ sopra le divisioni de' vermi acquatici, contiene „ un gran numero di fatti estremamente curiosi. „ Dopochè ne avrete radunati molti, come quelli „ che avete riportati nella vostra lettera, noi potremo ragionare sopra una riproduzione tanto strana. Queste osservazioni di code, che sono nate, „ o di teste, che doveano nascere, sono singolari „ in estremo, ed io spero, che le rifarete più di „ una volta. Il fatto essendo molto costante, l'imbarazzo non sarà di trovare il germe della parte posteriore, ch'è stata prodotta, perchè bisogna che vi sia dappertutto in questi animali de' germi di parti anteriori, e di parti posteriori, che si tocchino, e l'une non sien determinate a svilupparsi con preferenza all'altre, se non allora, ch'è l'estremità, dove elleno si trovano è più favorevole al loro sviluppo; resterà a sapersi ciò che può in alcune circostanze facilitare lo sviluppo di una parte posteriore sopra una estremità anteriore. Io chiamo così la più vicina alla testa „.

256. *Indifferenza della quistione al fine dell'Autore. Ragioni di lasciarla indecisa.*

Quantunque vi sia della similarità, o della dissimilarità organica de' germi nel medesimo individuo, io dirò, che questa quistione è indifferente al mio fine, e noi non siamo a portata di deciderla. Se l'intima struttura delle parti più grossolane è impercettibile, come potremo noi attendere alla cognizione delle parti di una sottigliezza, e di una piccolezza estrema? La

ma-

materia è stata prodigiosamente divisa, ed i germi sono in qualche modo le ultime divisioni della materia organizzata. Io non ho adesso altro oggetto, che di attendere a stabilire, che ciò che noi chiamiamo produzione, o riproduzione nelle molte specie di zoofiti, non è che lo sviluppo di piccioli tutti organici, che preesistevano nel gran tutto, di cui essi riparano le perdite. Così, o che questa riparazione dipende da' germi, che non contengono precisamente se non quello che si tratta di riparare; o che ella dipenda da' germi, che contengono un animale intero, e di cui non si sviluppa che una parte, precisamente simile a quella ch'è stata tolta, tutto torna il medesimo nell'una, e nell'altra supposizione: questa non è mai una generazione propriamente detta; è sempre la stessa evoluzione di quello ch'era già generato. Tanti fatti certissimi, che ho radunati in quest'opera concorrono ad evidenza a stabilire questo gran principio; poichè non vi è, che la più forte predilezione per le nuove idee, che possa obbligarci a contrastarlo. Io ricorderò ancora quello, che ho detto nel Capitolo X. del Tomo I. sopra la preesistenza della farfalla del bruco. Un verme, che si nutrice dell'interno di questa, sa non attaccare le parti proprie alla farfalla: il bruco continua a soddisfare i suoi esercizi: vive e fa vivere il suo nemico, ma non è farfalla.

257. *Riflessioni sopra la preesistenza delle parti, e de' tutti che sembrano riprodotti, o generati.*

Tutto ci accenna, che la natura ha preparato da lungi ne' corpi organizzati, le diverse produzioni, ch'ella vi dovea mettere alla luce. Mentrechè elleno incominciano a svilupparsi, noi non dubitiamo punto della loro esistenza, e noi diciamo, ch'elleno nascono, allorchè sono sviluppate abbastanza per cadere sotto i nostri sensi. Un intelletto che aves-

se

se gli occhi più perspicaci de' nostri, antivedrebbe molto da lungi il momento di questa pretesa nascita. Ci può esser permesso di discorrere sopra i fini dell'Autore della natura, quando questi fini sono evidenti. Sembra ch'egli abbia voluto, che alcuni degl'insetti, il di cui corpo è fragilissimo, e di cui l'una, e l'altra estremità erano esposte a servire di cibo a'differenti animali voraci, potessero riparare le perdite, che doveano loro cagionare questi accidenti. La sua sapienza ha dunque posto in questi insetti delle seconde sorgenti di riparazione. Essa ha fabbricato il loro corpo sopra un modello particolare; essa vi ha seminato de'germi, lo sviluppo de' quali opera queste riproduzioni, che noi non lasciamo di ammirare. Lo staccamento di una parte anteriore, o posteriore rivolge a favore del germe posto all'estremità corrispondente del tronco, i succhi nutritizj, che sarebbero stati impiegati nella conservazione di questa parte. Il germe incomincia dunque a svilupparsi; egli si fa vedere da principio sotto l'aspetto di un piccolo bottone ritondo, che fa vedere in qualche modo il suo primo stato di corpo oviforme.

258. *Dell'unione della parte riprodotta col tronco: com'ella si operi.*

L'unione, che la nuova parte contrae col tronco, non ha niente di più imbarazzante di quella del pollone coll'albero, o dell'innesto col soggetto. Vedesi abbastanza, che a misura che i vasi del germe si sviluppano, possono unirsi per differenti punti a quelli del tronco, e da questa unione deve risultarne una circolazione comune. Ma la picciolezza, e trasparenza dei vasi non permettono di osservare queste *anastomasi*, come si osservano negl'innesti vegetabili. La riunione, che si opera qualche volta nelle carni de'grandi animali, dà del lume per quella ancora, di cui si tratta: io ne parlerò altrove.

259. *Regolarità perfetta delle riproduzioni ne' vermi d'acqua dolce, della prima specie.*

Sono apparentemente leggi semplicissime quelle, che presiedono alle riproduzioni de' miei vermi acquatici della prima specie, o di quelli che io ho chiamati *rossigni* (1). Egli è però rimarcabile, che tra un gran numero di sperienze che ho tentate sopra questa specie, non ve ne sia stata alcuna, che sia stata seguita da una produzione mostruosa. Io ho veduto costantemente una nuova parte anteriore svilupparsi all'estremità anteriore dell'antico tronco, e una nuova parte posteriore germogliare all'estremità corrispondente di questo tronco. La parte riprodotta è sempre stata precisamente simile a quella che io avevo tagliata, e capace delle medesime funzioni; nessuna irregolarità apparente, nessuna differenza sensibile nell'organizzazione; identità perfetta nella forma, nella positura, nei movimenti tanto esteriori che interiori.

260. *Ricerche sopra le cause, che determinano lo sviluppo di un germe con preferenza a quello di un altro, in un dato luogo.*

Ma qual è la causa che determina una parte anteriore a svilupparsi con preferenza di una parte posteriore? Perchè una testa si sviluppa ella sopra l'estremità anteriore, una coda sopra la posteriore? Egli è manifestissimo, che l'estremità ch'è anteriore in qualunque tronco, avrebbe potuto divenire posteriore, se la sezione fosse stata fatta in un altro punto; il solo caso ne decide. Vi ha dunque a ciascheduna estremità un germe di testa, e un germe di coda: donde viene che questi due germi non si sviluppano nel medesimo tempo, e sopra la medesima estremità? Perchè il busto non germoglia egli dalle sue due estre-

---

(1) *Trattato dell'Insettologia*, Seconda parte, Osserv. I.

estremità nel medesimo tempo una testa, ed una coda? Io tenterò di rispondere a questa quistione con una conghietture, che non mi sembra sprovvista di verosimiglianza, e che io traggo da un fatto certissimo. Io ho detto, che la circolazione del sangue si eseguisce in questi vermi dalla coda verso la testa, dall'estremità posteriore verso l'anteriore: io ho fatto osservare altrove la regolarità costante di questo movimento, che le sezioni le più moltiplicate non turbano giammai. (1) Vi ha dunque in questa specie di vermi un succo *ascendente*; io chiamo così quell'umore, la cui costante direzione è dalla coda verso la testa. Sarebbe forse un abusar di conghietture, il supporre che v'abbia un umore *descendente*, o la cui direzione sia in senso opposto? Perchè, bisogna bene che la parte posteriore dell'insetto riceva il nutrimento necessario: egli è dunque probabile che lo riceva dalle arterie, che si possono chiamare *descendenti*, e che traggono la loro origine dall'arteria principale. Io ho fatto osservare nelle mie osservazioni sopra questi vermi, *che la testa è per l'ordinario la parte che si sviluppa la prima*. (2) Lo sviluppo è sempre un effetto della nutrizione; il germe della testa riceve dunque per l'ordinario il primo gli umori appropriati allo sviluppo. Sembra ch'egli li riceverà il primo, se li riceve per quel vaso, che scarica continuamente il sangue verso l'estremità anteriore. Il germe della testa ha dunque probabilmente con questo vaso delle congiunzioni dirette ed immediate, che non ha il germe destinato a produrre una coda. Questo, nutrito probabilmente dai vasi descendenti, non si sviluppa che all'estremità dove tendono questi vasi. Questa cosa ha qualche analogia con ciò che si osserva negli

al-

(1) Vedi il Tomo I. pag. 121.

(2) *Traктato dell' Insetologia*, Seconda Parte, pag. 24.

alberi: si è veduto nel Capitolo precedente, che i rami sono nutriti da un sugo ascendente, le radici da un sugo discendente. Ma i rami possono germogliare sopra le radici, le radici sopra i rami: non bisogna dunque pressar troppo questa comparazione.

261. *Conghietture sopra quella specie di vermi di acqua dolce, che in certe circostanze, germogliano una coda invece di una testa.*

I miei vermi acquatici della seconda specie, ed il colore de' quali è albiccio, (1) non si riproducono colla medesima regolarità. Se si taglia ad uno di questi vermi la parte anteriore, egli ne riproduce una nuova. Ma se si divide trasversalmente in due, o più porzioni, tutte riproducono una coda nel luogo, dove avrebbero dovuto riprodurre una testa. La specie di costanza del fenomeno non permette di collocarlo nel rango di quelle produzioni casuali, e mostruose, che si vedono qualche volta nel regno animale. I polipi a branche fanno delle simili produzioni; vedonsi nascere sopra il loro corpo delle code soprannumerarie, delle quali essi si servono come di loro estremità posteriore per attaccarsi. Ma il Sig. Trembley vuole, che sia un caso straordinario, dicendo, *che non si osserva che qualche volta*; sono sue parole. (2) Io non cercherò d'indovinare, perchè le porzioni de' nostri vermi albicci germogliano una coda nel luogo, nel quale dovrebbero germogliare una testa; io non so alcun fatto, che possa illuminarmi sopra questo fatto; io farò solamente osservare, che questa coda soprannumeraria, essendo sì ben formata come quella che cresce all'estremità posteriore, egli è verisimile ch'ella abbia la medesima origine. Ella proviene da un germe, che si è  
svi-

(1) Ibid. Osserv. XXII. XXI.

(2) *Memorie sopra i polipi a branche*, in 8. Tom. 2. pag. 122.

sviluppato nel luogo, dove avrebbe dovuto svilupparsi una parte anteriore. Sembra potersi inferire dalla mie esperienze, che questa specie di vermi sia stata formata in maniera, che non si trovino germi di testa che verso la parte anteriore dell'insetto, e che altrove non v'abbia che de' germi di coda. Noi non sappiamo, perchè l'Autore della natura abbia ristretta in questi vermi la riproduzione in tali limiti; e perchè l'abbia tanto estesa negli altri insetti; ma noi vediamo almeno ch'egli ha messo i nostri vermi *albicci* in istato di riparare la perdita ch'essi erano più spesso esposti a fare; io voglio dire quella della loro parte posteriore; essi la tengono ordinariamente fuori della terra, nella quale fanno la loro dimora: ella è dunque più esposta ad esser divorata dagli insetti voraci di quello, che sia il resto del corpo. Lo sviluppamento di una coda soprannumeraria, può dipendere in parte dall'assenza di un germe di testa. Il germe della coda posto all'estremità anteriore riceve solamente i sughi nutrimentali, che vanno a questa estremità pel nutrimento delle parti ch'egli contiene. Ma tutto questo non è che una conghiettura, ed io non v'insisterò di vantaggio; della struttura di questi vermi non ne ho gran cognizione.

262. *Tentativi per ispiegare la riproduzione delle zampe del gambero.*

Ciò ch'è la riproduzione di una testa, e di una coda ne' vermi che ho moltiplicati per divisione, è altresì la riproduzione delle gambe, e delle corna del gambero. Noi abbiamo veduto, che la zampa nascente si mostra da principio sotto la forma di una papilla conica, che si allunga di giorno in giorno. Una membrana molto spessa, che ricuopre le carni, e l'estrema delicatezza di queste non permettono nei primi giorni all'Osservatore, di distinguere le parti proprie della zampa. Ma allorchè esse si sono un poco fortificate, diventano sensibili, e formando allora l'in-

l'inviluppo, si mettono allo scoperto delle articolazioni sensibilissime. Noi siamo dunque fondati nel riguardare la zampa nuova, come un nuovo tutto organico, il di cui germe esisteva nel tronco dell'antica zampa. La rottura di questa ha dato luogo allo sviluppo di quel germe, rivoltando in utile suo gli umori che sarebbonsi tramandati ad altre parti. Qui si presenta una difficoltà che merita ch'io mi vi arresti. Io ho detto qui sopra, che in qualunque luogo si tagli la zampa, ciò che si riproduce è sempre precisamente simile a ciò che si è tagliato. Il Sig. de Reaumur ha insistito molto sopra questa difficoltà, e conviene sentire esso medesimo. „ Dobbiamo noi intraprendere, dic'egli, (1) a spiegare come si fanno queste riproduzioni? Noi non potremo al più che arrischiare alcune conghietture, e qual fede darebbersi a delle conghietture, allorchè si tratta di render ragione di fatti, i di cui chiari ragionamenti sembrerebbero provarne l'impossibilità? Noi diremo bene, che verso la parte tagliata si tramanda molto sugo nutrimentale, ed abbastanza per formare delle nuove carni. Ma dove trovare la causa, che divide queste carni in diverse articolazioni, e che ne forma de'nervi, de'muscoli, e de'tendini? Tuttociò che noi potremo avanzare, e di più facile, e forse di più ragionevole, sarebbe il supporre che queste piccole gambe, che noi vediamo nascere, fosse ciascheduna contenuta in piccole uova, e che avendo tagliata una parte della gamba, i medesimi sughi che servivano a nutrire, e far crescere questa parte, sieno impiegati a far sviluppare, e nascere la specie del piccolo germe della gamba contenuto in quell'uovo. Per facile che sia questo supposto, pochi si risolveranno di ammet-

(1) *Memorie dell'Accad. Reale delle Scienze*. An. 1712.

„ metterlo. Eſſo impegnerebbe ancora a ſupporre,  
„ che non vi ſia luogo della gamba di un gambe-  
„ ro, dove non vi ſia un'uovo, che contenga un  
„ altra gamba; o, ch'è più maraviglioſo, una parte  
„ di gamba ſimile a quella, ch'è dopo il luogo,  
„ dove è collocato queſt'uovo fino all'eſtremità del-  
„ la gamba: dimanierachè qualunque luogo della  
„ gamba, che ſi aſſegnaffe vi ſi troverebbe uno di  
„ queſte uova, che conterrebbe un'altra parte di  
„ gamba, come l'uovo, ch'è poco ſopra, o come  
„ quello, ch'è poco ſotto. Le uova, che farebbono  
„ all'origine di ciaſchedun piede, per eſempio,  
„ non conterrebbero che un piede; vicino all'eſtre-  
„ mità de' piedi biſognerebbe collocarne dell'altre,  
„ le quali non conteneſſero, che dell'eſtremità de'  
„ piedi. Forſe amerebbeſi meglio il credere, che  
„ ognuno di queſte uova conteneſſe una gamba inte-  
„ ra; ma uno non farebbe meno imbarazzato, allo-  
„ rachè gli biſoggaſſe render ragione perchè da ciaſcu-  
„ na di queſte piccole gambe, non ne riſcaſſe che  
„ una parte ſimile a quella che ſi è ſtaccata al gam-  
„ bero? Non farebbe ancora abbaſtanza il ſupporre,  
„ che v'abbia un uovo in ogni luogo della gamba  
„ del gambero, biſognerebbe ſupporvene molti, e  
„ noi non ſapremmo determinar quanti. Se ſi taglia  
„ la nuova gamba ne riſcaſce un'altra nel medeſi-  
„ mo luogo. Finalmente biſognerebbe ancora am-  
„ mettere, che ogni nuova gamba, è come l'antica,  
„ ripiena di un'inſinità di uova ciaſcuno de' quali  
„ può ſervire a rinnovare la parte della gamba,  
„ che potrebbeſi eſſer tagliata. Può eſſere pertanto,  
„ che in ogni gamba, il gambero non v'abbia che  
„ una certa provviſione di gambe nuove, o di parti  
„ di gambe. Come la maggior parte degli animali  
„ giovani hanno un piccolo dente naſcoſto al di ſotto  
„ di ciaſcheduno de' loro denti: da queſto accade, che  
„ ſe ſi cava loro un dente, ne ritorna un altro nel  
Tom. II. C „ me-

„ medesimo luogo, ma se si cava loro quest'ultimo,  
 „ il suo luogo resta voto, la natura non ne ha messi  
 „ altri in serbo sotto questo. Sarebbe curiosa cosa  
 „ da saperfi, se della medesima maniera i gamberi  
 „ hanno in ogni luogo delle loro gambe una prov-  
 „ visione di parti di gambe, che possa terminarsi.  
 „ Sopra questo io non saprei ancora decider niente. „  
 Non si può certamente dissimulare, che la rigene-  
 razione delle zampe del gambero, non presenti,  
 come tutte l'altre riproduzioni del medesimo genere,  
 delle parti oscure; ma queste ombre fanno risaltare  
 la luce, che danno diversi fatti, e la Filosofia deve  
 seguirne la chiarezza di questa luce. Io ho stabilito  
 i fondamenti della preesistenza de' germi, ed ho  
 fatto toccar con mano l'insufficienza delle spiegazioni  
 puramente meccaniche. Il Sig. de Reaumur era molto  
 lontano dal ricorrere a tali spiegazioni, come si rac-  
 coglie dal passo, che ho citato, e meglio ancora  
 dall'estratto della Lettera, ch'egli mi scrisse li 21.  
 Dicembre 1742. che ho riportata qui sopra. Tutta  
 la difficoltà dunque si riduce a spiegare secondo l'  
 ipotesi de' germi, la rigenerazione di una parte deter-  
 minata della zampa, di una metà, di un quarto ec.  
 Se la riproduzione di tutta la zampa non può essere  
 il prodotto di una segreta meccanica, la rigenerazione  
 di una parte di questa zampa non lo può essere per  
 maggior ragione. Bisogna dunque, che ciò, che si  
 rigenera preesistesse originalmente in piccolo, perchè  
 noi non concepiamo meglio la produzione meccanica  
 di una parte di zampa, che quella di una zampa in-  
 tieria, e l'une, e l'altre sono egualmente opposte  
 ai fatti, che provano la preesistenza de' germi. Io  
 non vedo altronde alcuno inconveniente ad ammet-  
 tere che v'abbia in ciascuna zampa del gambero una  
 successione di germi, che contengano in piccolo delle  
 parti simili a quelle, che la natura ha intenzione di  
 rimpiazzare. Io concepisco adunque, che il germe  
 posto

posto all'origine dell'antica zampa, contenga una zampa intera, o cinque articolazioni, siccome quello, che immediatamente lo segue, contiene una zampa, che non ha che quattro articolazioni, e così degli altri. Se il Sig. de Reaumur ci avesse detto tutto ciò, che accade nella rigenerazione di un semplice piede, noi saremmo in istato di maggiormente analizzarlo. Io mi propongo di tentare alcune esperienze per istruirmi, ed invito i Fisici a rimaneggiare di nuovo questa materia interessante, e che ha tanta analogia coll'importante materia della generazione. La nuova zampa simile in tutto all'antica, contiene altresì de' germi destinati a' medesimi fini, e la precontinenza di questi germi gli uni, negli altri, non spaventa che l'immaginazione, come l'ho detto altrove. Il Filosofo non metterà quì i sensi in luogo del puro intelletto; ragionare non è immaginare.

## CAPITOLO II.

*Continuazione della storia delle propagini, o degl'innesti animali. Saggio della spiegazione de' polipi.*

263. *Introduzione alla teoria dell'e riproduzioni del polipo. Vedute dell'Autore.*

**E**GLI è tempo finalmente, che io ritorni a' polipi: non mi si rimprovererà di aver differito fin quì a tentare di spiegare i fatti, ch'eglino ci offeriscono, e de' quali ho sbazzata la pittura nel Capitolo XI. del Tomo I. Io volevo facilitare a me medesimo questa intrapresa in ricercando nell'esame de' fatti analoghi, de' principj di soluzione, de' quali possa io fare una felice applicazione ai polipi. Tale è stato il fine del mio travaglio ne' due Capitoli, che hanno preceduto immediatamente questo; io ho paragonato tra loro i fatti, che ~~mi~~ hanno som-

ministrati i vegetali ; io ho estese le comparazioni ai fatti ; che ho osservati nelle differenti specie de' vermi , che possono esser moltiplicati per divisione , e da questo ponderato esame , ho veduto nascere una conseguenza generale in favore dell' *evoluzione* . Questa conseguenza non sembrerà precipitata a coloro de' miei Lettori , che si daranno la pena di seguitare le mie orme , e di meditare le mie idee . Essi giudicheranno , come me , che i fatti concorrono a stabilire il gran principio della preesistenza de' germi . Eglino non crederanno doverla abbandonare alla veduta de' prodigi , che la storia de' polipi ci presenta ; ma eglino preferiranno di cercar meco come questi fatti strani si conciglino colla legge dell' *evoluzione* . Io non stracchierò punto questi fatti per farli venire sotto questa legge ; io mi contenterò di rassomigliargli a' fatti analoghi , che sono sottoposti ad evidenza alla detta legge , e laddove non troverò soluzione , che soddisfaccia , l'avverterò ; io procurerò di non confonder mai il dubbioso col probabile , e la confessione della mia ignoranza non mi costerà niente . Noi siamo ancora alla nascita delle cose ; per qual ragione un Filosofo arrossirà di non ispiegare tutto ? Vi sono mille casi , ne' quali un , *io non ne so nulla* ; è più commendabile , che un tentativo presuntuoso .

264. *Come si operi la riproduzione del polipo diviso trasversalmente . Energia della forza riproduttrice .*

Non vi ha difficoltà per riguardo alla riproduzione del polipo tagliato trasversalmente : si vede a sufficienza , che questo fatto è analogo a quello de' vermi , che ho tagliati in questa maniera , ed avere spiegato l'uno , è l'aver spiegato l'altro . Solamente tutto sembra operarfi più presto , e più facilmente nel polipo . La forza riproduttrice vi è dotata di una maggiore energia , ed ella vi esercita la sua attività fino nelle minime parti . In qualunque luo-

go ,

go, che si tagli il polipo, e per piccola che sia la parte, che si taglia, la riproduzione ha luogo ordinariamente ed in questa parte, e nel tronco. Un polipo tritato si riproduce nella stessa maniera, e riproduce altrettanti polipi quante particelle sono state fatte nella divisione. Finalmente il Sig. Boezel, buono osservatore, assicura di aver veduto le branche del polipo divise, diventare polipi compiuti. Il Sig. Trembley avea procurato di vedere questo fatto, ma non vi era riuscito; ma ha detto, che non lo giudicava impossibile. (1). Il polipo dunque è un tutto organico, ogni parte del quale, ogni molecula, ogni atomo tende continuamente a produrre. Egli è, per così dire tutto ovaja, e tutto germe. Mettendo un polipo in pezzi, il sugo nutritizio va a pro de' germi posti in ciascuna particella, il quale sarebbe stato impiegato all' accrescimento del tutto, o ad altri usi. Questo non ha bisogno di spiegazione dappoichè si è letto ne' Capitoli precedenti sopra le riproduzioni de' vegetali, e sopra quelle ne' vermi, che io ho moltiplicati in tagliandoli trasversalmente; passo dunque ad altri fatti.

265. *Come si può concepire, che si faccia la riproduzione nel polipo diviso pel mezzo secondo la sua lunghezza.*

È una cosa indifferente alla riproduzione del polipo, che sia tagliato secondo la sua lunghezza, o secondo la sua larghezza. In un polipo diviso pel mezzo secondo la sua lunghezza, ciascuna metà rappresenta da principio una mezza canna, e l'estremità opposte di questa mezza canna si uniscono subito, ed in meno di un'ora diventa una canna perfetta. La riunione dell'estremità è tanto perfetta, che non lascia sopra il corpo alcun segno di cicatrice. Tutto questo  
segue

(1) *Memorie sopra i polipi a Branche in ottavq. Tom. II. pag. 171.*

segue tanto presto, che non è stato possibile al Sig. Trembley di seguitare i progressi di questa rigenerazione; in capo a tre ore egli ha veduto il polipo rigenerato prendere del nutrimento; la testa si era rifatta; ma non avea che la metà delle branche, che appartenevano all'antico polipo. Non tardarono a germogliare delle nuove branche dalla parte opposta delle antiche, e niente mancò alla perfezione dell'insetto. (1) Quantunque occhi perspicaci, ed illuminati non abbiano potuto scoprire tutto ciò, che accade nella riunione delle estremità di una metà del polipo diviso secondo la sua lunghezza, si può senza presunzione procurare di farsi un'idea della maniera, di cui si opera questa riunione. Finalmente ella non ha di sorprendente che la sua estrema prontezza, ed ella altronde per l'essenziale, quadra con quella di due scorze, e di due pelli, che vegetano tuttavia. Un certo grado di contrazione, e certi movimenti dell'insetto possono bastare per riunire l'una all'altra l'estremità opposte, ed ancora per procurarne il contatto. Dato che l'estremità della piaga si tocchino, i corrispondenti vasi si abboccano; si sviluppano de' nuovi vasi, come negl'innesti, e moltiplicano i punti della legatura, o dell'abboccamento; il corso de' liquori si ristabilisce, e con esso l'economia vitale. In un insetto, che non è quasi, che una gelatina condensata, le fibre hanno tanta flessibilità, tanta durezza, che non è maraviglia se piaghe enormi vi si consolidino senza cicatrice apparente. La consolidazione vi segue prontamente: il tempo dello sviluppamento corrisponde alla delicatezza degli organi; quanto più sono delicati, o estensibili, tanto più lo sviluppamento segue con prontezza. (2) L'elemento, che

---

(1) Ibid. pag. 168. ec.

(2) Vedi l'art. 167.

che il polipo abita , contribuisce molto alla prestezza dell'accrescimento conservando alle fibre la loro estrema flessibilità.

266. *Spiegazione dell'idre , e della maniera che si forma un nuovo stomaco in frammenti picciolissimi del polipo .*

Quello , che io dico , si applica facilmente all'idre , delle quali ho parlato nell'articolo 190. Se una porzione di polipo tagliata in parte secondo la sua lunghezza , conserva abbastanza di larghezza , acciocchè l'estremità opposte possano accostarsi fino a toccarsi , questa porzione prenderà subito la forma di una canna , e questa canna (1) diventerà un polipo . Ma accade il medesimo delle porzioni strettissime , o de' picciolissimi frammenti . Io ho detto , dietro la scorta del Sig. Trembley , che queste porzioni , o frammenti si rigonfiano , e che l'interiore del rigonfiamento è il nuovo stomaco . (2) Qui non si può veder tutto , bisogna contentarsi sovente di travvedere . Io ho abbastanza provato , che la natura non crea niente ; ella dunque non crea quel nuovo stomaco , ma si comprende , che la pelle del polipo può non esser semplice , che ella può esser composta di due membrane principali , la duplicatura delle quali somministra il nuovo stomaco . Io non so precisamente , perchè queste due membrane si separino in picciolissime porzioni , e perchè elleno non si separino in porzioni più larghe ; io vedo solamente , che in queste , l'estremità opposte si accostano prontamente ; queste membrane possono non avere nè il tempo , nè i mezzi di separarsi . Nel primo caso ,  
le

---

(1) Intanto l'Autore si serve della comparazione della canna , inquantochè un polipo diviso in due parti , è della stessa figura di una canna divisa , e quando dice , che queste due parti si riuniscono , e formano due canne , vuol dire , che queste due parti riunite prendono la figura cilindrica .

(2) *Memorie sopra i polipi a branche* in ottavo . T. II. pag. 106.

le carni hanno de' punti d'appoggio, che permettono loro i movimenti necessarj per la riunione dell'estremità; nel secondo elleno ne sono sprovviste, e può agire la causa, che opera la separazione. Io non so quale sia questa causa, e non cerco di penetrarla; mi basta, che questo piccolo fatto non ripugni a' miei principj.

*267. Singularità grande, che fanno vedere i frammenti del polipo diventati essi medesimi veri polipi. Conseguenza relativa alla struttura dell'insetto, ed al suo rovesciamento.*

Que' frammenti del polipo divenuti essi medesimi polipi, ci fanno vedere una cosa molto singolare; quel che formava l'interiore dell'antico stomaco, compone al presente una parte esteriore dell'insetto: perchè una parte d'ogni frammento apparteneva all'interiore dell'antico polipo. Dunque l'interiore del polipo, è tanto simile all'esteriore, che possono essere sostituiti uno all'altro, senzachè ne soffrino le funzioni vitali. Vi è dunque molta semplicità ed uniformità negli organi. L'osservazione, siccome l'esperienza conduce a questo risultato: io l'ho già osservato: coll'ajuto de' migliori microscopj non si vede nel polipo, che un ammasso di piccioli grani sparsi da per tutto. Ve n'ha senza dubbio ancora in tutta la grossezza della pelle, ed in quella duplicatura, che vi si può supporre. Quando si conosce questa struttura, e, che si fa quello che accade a' frammenti del polipo, uno rimane più sorpreso del succedersi di questo rovesciamento, che ho descritto nell'articolo 205. Ma non si cessa di ammirare il genio, che ha conceputo, ed eseguito il primo un'operazione sì nuova, e sì delicata. Il polipo non era fatto dalla natura per esser rovesciato, e raddirizzato, ma era fatto in maniera, che poteva esserlo. La sua organizzazione avea del rapporto con differenti casi possibili, molti de' quali supponevano la mano dell'uomo.

268. *Come le porzioni del polipo arrivano ad innestarsi l'une all'altre.*

Noi abbiamo veduto , quanta disposizione hanno i vasi del polipo ad abboccarsi , e ad unirsi : forse non la devono , che alla loro consistenza quasi gelatinosa ! Si uniscono nella matrice delle parti solide dell'embrione , per esempio , de' diti : si uniscono similmente de' frutti , e delle foglie ancora tenere. Egli è dunque naturalissimo , che le porzioni del medesimo polipo , e che porzioni di differenti polipi , accostate , e messe a filo , s'innestino l'une all'altre , *per approssimazione*. Un polipo non differisce più apparentemente da un altro polipo , di quello , che differisca il susino dal mandorlo . Io ho provato , che l'unione dell'*innesto* col *soggetto* , si opera mediante lo sviluppamento di piccoli vasi , da principio gelatinosi , dipoi erbacei , dopo corticali , che passano reciprocamente dall'uno all'altro . Vi ha luogo di presumere , che segua qualcosa di analogo nelle porzioni di uno , o più polipi , che si sforzino a toccarsi . Elleno si uniscono subito mediante un filo sottile , ma l'unione diventa più intima , e più perfetta a misura , che si sviluppano de' nuovi vasi , e che si moltiplicano i punti di comunicazione . Il fatto non è più maraviglioso nell'animale , che nel vegetale ; perchè il polipo è quasi una pianta per la semplicità della sua struttura . Egli daltronde è tale , che porzioni del polipo prese senza scelta contengono , come un ramo , od una foglia , tutti gli organi essenziali alla vita vegetativa . Esse dunque possono vegetare a parte , e fare delle nuove produzioni . Divise , germoglierebbono una testa , delle branche , una coda : messe a filo non fanno , che unirsi . La morbidezza dell'insetto rende ancora questo innesto meno singolare di quello del vegetale : ma noi eravamo assuefatti agl'innesti vegetali , e non avevamo veduti gl'innesti animali .

269. *Come si può concepire , che segua l'unione , o l'innesto di due polipi messi l'uno nell'altro .*

Nel divorare una preda, il polipo divora sovente le sue proprie branche, qualche fiata due polipi si disputano le medesima preda, e l'uno divora le branche dell'altro; non si aspetti, che vengano ad esser digerite colla preda; questo non segue, ma elleno riescono dallo stomaco senz'apparente alterazione. Quel che opera dunque la digestione nel polipo, non fa alterazione sopra le parti proprie dell'insetto. Il Sig. Trembley ha veduto un polipo dimorare quattro giorni nello stomaco di un altro polipo, e riuscirne vivissimo. (1) L'Osservatore sempre secondo in iscoperte eccellenti, l'avea introdotto nel corpo dell'altro per tentare con questo mezzo ingegnoso una nuova specie d'innesto. Sembra dunque, che un polipo non possa digerirne un' altro; ma una porzione di polipo può unirsi esteriormente ad un'altra, e la parte interiore di qualsivoglia porzione non differisce punto dalla parte esteriore: finalmente non v'è alcun punto dell'esteriore, o dell'interiore di un polipo, che non possa fare delle produzioni. Se dunque si arrivasse a ritenere un polipo nell'altro polipo, egli è probabile, che vi s'innestasse, e, che duplicasse in qualche maniera il polipo esteriore. Il Sig. Trembley ha saputo eseguirlo, come io l'ho narrato nel articolo 202. Li due polipi si sono perfettamente confusi, e le due teste, non ne hanno formate sicuramente, che una sola; ma la saggia diffidenza dell'Autore, non gli ha permesso di pronunziare sopra la realtà della unione de' due corpi: *Io non saprei dire, dic' egli, (1) ciò, che sia diventato il corpo del polipo interiore, se egli sia stato digerito nello stomaco del polipo*

(1) Ibid. pag. 274.

(2) Ibid. pag. 283.

*lipo esteriore, o se egli si è incorporato con quest'ultimo polipo; ma io posso assicurare di aver veduto quel corpo del polipo interiore nel polipo esteriore molti giorni dacchè vi è stato introdotto. Per rapporto alla testa del polipo interiore, in son certo ch'ella si è riunita con quella del polipo esteriore. Io non ragiono sopra i fatti, che il nostro eccellente Osservatore mi somministra, e non devo tirarne da questi fatti delle conseguenze, ch'esso medesimo non ha osato tirare. Così io mi contenterò di fare osservare, che ammettendo la realtà dell'unione, di cui si tratta, ella spiegherebbeasi facilmente co' principj, che ci offeriscono diversi fatti analoghi. Questa specie d'innesto a flauto non differisce molto da quello, che si eseguisce sopra il vegetale; e se si provasse una volta, che il polipo, il quale si tiene nell'interiore di un altro, non vi si digerisce, comprenderebbeasi, che li due polipi dovrebbero unirsi più facilmente, che due scorze; perchè le due parti di una scorza, non si rassomigliano tanto, quanto le due parti di un polipo, ed una scorza non ha nè la morbidezza, nè la duttilità della pelle di questo insetto. Io prego, che si richiami quì ciò, che ho detto nel Capitolo XII. del precedente volume sopra la necessità dell'analogia trall'innesto, ed il soggetto.*

270. *Estimazione delle maraviglie del polipo. Che la rigenerazione delle piaghe de' grandi animali ci offerisce de' fatti altrettanto maravigliosi. Bella esperienza del Sig. Duhamel sopra questa materia.*

Allorachè s'intende dire, che un Fisico ha innestato la testa di un'animale sopra il tronco di un altro, o che egli ha introdotto un animale nell'interiore di un altro, e che di due animali se n'è fatto un solo, ch'è vissuto, e moltiplicato, subito la mente apprende una maraviglia a misura, che in lei non resta più luogo a spiegazioni semplici, e naturali. Imperciocchè dappoichè un Filosofo esamina a san-

fangue freddo i fatti, e li paragona tra loro, ed a' fatti relativi, e soprattutto dappoichè riflette sopra la natura del polipo, il maraviglioso sparisce, e non resta più che l'impressione passeggiata della novità. Io non parlo in questo modo per diminuire la giusta ammirazione, che devono inspirarci i polipi, non per loro medesimi, ma per la sorprendente sagacità di quello, che ce gli ha fatti conoscere. Gli animali grossi ci offeriscono delle particolarità, che un dotto Notomista giudicherebbe più rimarcabili ancora di quelle, che contengono i polipi. Io diceva 13. anni sono, in quel *parallolo delle piante, e degli animali*, che pubblicherò forse un giorno, *che se si proseguissero le ricerche sopra le piaghe, vi si scoprirebbero maggiori maraviglie che nel polipo*. Io fondava la mia riflessione sopra la composizione, e sopra la varietà delle parti, che possono rigenerarsi, ed unirsi. Io non sapeva allora una bella esperienza del Signor Duhamel (1), il quale mette questa riflessione in una gran chiarezza, e la giustifica. Dopo aver rotto l'osso della gamba di un pollo, ed aver dato tempo al *callo* di formarsi, egli ha tagliate le carni all'intorno, per un terzo della circonferenza della gamba, arrivando fino all'osso, e l'ha ancora raschiato. Essendosi fatta la consolidazione, egli ha tagliato della medesima maniera le carni del secondo terzo, ritoccando un poco l'antica piaga. Fecce il medesimo nell'altra terza parte. Quindi tutte le parti solide hanno sofferto un totale staccamento, e pure la natura ha riparato questo gran disordine: tutte queste parti si sono rigenerate, riunite, innestate; nuove fibre, nuovi vasi si sono sviluppati dalla parte di sopra, e da quella di sotto dell'incisione; e' si sono abboccati, e la circolazione si è ristabilita, e il *distillamento* è passato liberamente da una estremità all'altra

---

(1) *Memorie dell' Accademia*. Anno 1746.

altra della gamba. Si consideri un poco questa esperienza, si rifletta sopra il numero delle vene, dell'arterie, de' vasi linfatici, delle fibre carnose, tendinose, muscolari, che hanno dovuto riprodursi, crescere, riunirsi, e si concederà, ne sono sicuro, che la rigenerazione di tante parti *dissimilari*, è più rimarcabile ancora di quella del polipo, tutte le parti del quale sono quasi *similari*. Io ho indicato in molti luoghi di questo libro ciò, che si può pensare di più ragionevole sopra la maniera, colla quale si operano queste sorte di riproduzioni: consultate particolarmente l'Articolo 236.

271. *Spiegazione dell'innesto dello sprone del gallo sopra la sua cresta.*

Non è necessario andare nel gabinetto di un Osservatore di polipi, per vedere un esempio patente d'innesti *animali*; ve n'è uno, che i contadini eseguiscano ne' gallinaj, ed il quale è sufficiente a stancare la sagacità del più bravo Fisico. Il mio Leggitore comprende, che io ho in vista quell'innesto dello sprone del gallo sopra la sua cresta, di cui ho parlato nel Capitolo XI. del primo Tomo; ho riserbato per questo luogo ciò, che offerisce di più singolare, e di più difficile a spiegarsi. Questo sprone, che non è più grosso di un granello di canapa, quando si mette nella duplicatura della cresta tagliata, vi prende radice, ed in sei mesi cresce un mezzo pollice. In capo a quattro anni diventa un *corno* di tre, o quattro pollici di lunghezza. L'espressione è esatta; è un vero *corno*, simile a quello del bue, e che ha come quello le parti ossee. Esso arriva ad articolarsi colla testa, mediante un legamento cassulare, e diverse parte legamentose. Ma questo legamento, e queste parti non esistono nello sprone, nè nella cresta: la più raffinata: Notomia non ve li può ritrovare. Ne concluderemo forse noi, che la natura crea questi nuovi organi? Io non lo penso; ella non crea nè il cordon degl'innesti, nè il callo, nè la zampa del gambero,

nè

nè la testa del polipo ec. Noi concederemo di buon animo, che questi organi preesistevano invisibili nello sprone, e nella cresta, ma con differenti determinazioni da quelle, che hanno ricevute nell'innesto. La testa rispetto allo sprone è un terreno molto differente da quello, nel quale era destinato a crescere. Si fa come la qualità de' sughi, la loro abbondanza, o la loro penuria modifichino le produzioni. Si fa ancora, che una leggiera alterazione, che sopravvenga alle fibre tenere, ritarda l'accrescimento, e basta per cangiare le forme, le proporzioni, e la consistenza. La sostanza cornea dello sprone, confondendosi colla sostanza carnosa della cresta, può cagionare delle nuove varietà. Il composto di uno sprone imita assai quello di un corno, e se la cresta è carnosa, e non sono forse molte le parti molli, che diventano ossee? Quante mostruosità, delle quali ignorerebbesi l'origine, se un accurato esame non lo scoprisse? Qui segue una mostruosità artificiale. Ricorderò io le *esostosi*? Parlerò io delle corna, che sono nate sopra diversi luoghi del corpo umano? Io devo schifare queste particolarità, che mi allontanerebbono dal mio principale oggetto. Se parti così poco analoghe, come uno sprone, ed una cresta, s'innestano, v'ha egli luogo di maravigliarsi, che questo accada alle porzioni del polipo? L'Autore della natura non ha dato maggior potenza allo sprone, per essere innestato, di quella, che ha data al polipo per esser rovesciato; ma egli ha dato loro una struttura, che corrisponde a diversi casi possibili. Egli ha provveduto alle più rare circostanze, siccome alle più comuni; e le condizioni relative alle prime, abbracciano delle circostanze più rare ancora.

272. *Tentativi per render ragioni de' diversi fenomeni, che presentano i polipi raddrizzati in parte.*

Un polipo raddrizzato (1) in parte, s'innesta sopra

---

(1) Vedi l' Articolo 205.

pra le medesimo in parte; almeno le due pelli si applicano elleno immediatamente l'una all'altra, e sembrano unirsi. Questo fatto dunque entra nella teoria degl'innesti, e non è cosa più singolare, che due pelli si uniscano, di quello sia; che due teste s'innestino. Ma perchè si ferra ella l'estremità anteriore? Perchè una, o più bocche si formano elleno sopra la metà del corpo presso all'antiche labbra? Perchè queste forme bizzarre, che i polipi raddrizzati in parte prendono successivamente? Perchè . . . perchè non v'ha luogo al perchè. Io potrei rispondere a tutte queste quistioni, ed a molte altre con dire, che *io non ne so nulla*. Quante cognizioni ci mancano ancora sopra il polipo! Quante circostanze particolari, quanti piccoli fatti istruttivi, che sono scappati alla penetrazione del Sig. Tremblé; e che scapperanno per conseguenza a molti altri! Quello che io vedo chiaramente, e l'esperienza me lo insegna, si è, che non v'è alcun punto nel polipo, che non possa fare delle produzioni; che non v'è alcun punto, nel quale non possa formarsi una testa, una bocca, delle branche. Una moltitudine di altri fatti m'insegnano, che non v'è alcuna generazione propriamente detta; ma tutto ciò, che sembra generato, era preformato molto avanti. Le nuove teste, le nuove bocche che compariscono sopra il polipo raddrizzato in parte, dunque preesistevano avanti questa apparizione. Rimane da assegnare le cause del loro sviluppamento; io non attenderò a indovinarle; io mi contenterò di richiamare due fatti; l'uno, che la minima rottura basta per fare sviluppare una nuova testa; (1) l'altro, che nel polipo raddrizzato in parte, l'estremità anteriore forma una specie di cordone (2); le antiche labbra

---

(1) *Memorie sopra i Polipi a branche* Tom. II. pag. 224. e 225. in ottavo.

(2) *Ibid.* 236.

bra sono adunque stese; possono farvisi delle rotture invisibili all'Osservatore, e noi abbiamo veduto, quanto favoriscano i *cordoni* l'eruzione de' germi. Che una bocca sia formata in parte dall'antiche labbra, ed in parte dalle nuove, che nascono, che questa bocca sia fornita da una parte dell'antiche branche, e che dall'altra ne nascano di nuove, è un fatto, il quale suppone, che uno sviluppamento, che farebbe fatto totale in un polipo-trafversalmente reciso, non si fa che per metà in un polipo raddrizzato in parte. La nuova bocca, o le nuove bocche prendono del nutrimento, questo nutrimento spandesi da per tutto; l'estremità interiore dunque si prolunga, ed ecco una coda soprannumeraria. Io non so perchè si ferri l'estremità anteriore; io non so nè pure perchè l'innesto si pieghi; io veggio solamente, che i movimenti della nuova parte anteriore possono contribuire a questa piegatura. Ma non m'importa niente di sapere la ragione di tutte le bizzarrie del polipo, probabilmente elleno non sono che apparenti, ed uno che conoscesse la natura intima dell'insetto, le ripeterebbe, forse dalle leggi costanti.

273. *Spiegazione del polipo tagliato, rovesciato, tagliato di nuovo, ec. Riflessione sopra le nostre idee di animalità.*

Io non riprendo qui, che i fatti essenziali, e relativi al piano, che io mi sono proposto in quest'Opera: io suppongo sempre, che il mio Lettore non siasi scordato del compendio, che io ho fatto della storia de' polipi nel Capitolo XI. del Tomo primo di quest'Opera. Un polipo tagliato, rovesciato, di nuovo tagliato, e rovesciato di nuovo non presenta, che una ripetizione della medesima maraviglia, se al presente non è che una agli occhi del volgo. Ezzo non è che una specie di budello, che si rovescia, e che si ritaglia: egli è vero, che questo budello ha una testa, una bocca, delle branche; ch'egli è un vero animale,

ma l'interiore di questo animale è come l'esteriore, le sue viscere sono collocate nella densità della sua pelle, ed egli riacquista facilmente ciò che ha perduto. Egli è dunque dopo l'operazione quello medesimo ch'era avanti: tutto questo segue naturalmente dalla sua organizzazione; la destrezza dell'Osservatore fa il resto. Il più singolare dunque per noi è, ch'esista un animale fatto in questa maniera; nessuno di questo Mondo avea supposta la sua esistenza, e quando egli è comparso non ha trovato nel nostro cervello idea alcuna analoga al regno animale. Noi non giudichiamo delle cose che per comparazione; noi abbiamo prese le nostre idee di *animalità* da grossi animali, ed un animale che si tagli, che si rovesci, che si ritagli, e che seguiti a fare le sue funzioni, è una cosa drittamente contraria a queste nostre idee. Quanti fatti ancora ignorati, e che verranno un giorno a disordinare le nostre idee sopra i soggetti, che noi crediamo conoscere! Noi ne sappiamo molto poco, per pretendere, che niente ci sorprenda. La sorpresa occupa poco il Filosofo; ciò che l'occupa è l'osservare, e il ricordarsi della sua ignoranza, e guardarli da tutto.

274. *Spiegazione della moltiplicazione del polipo per germogli. Argomento in favore della precontinenza, o incastramento.*

Negli animali, la struttura de' quali ci è più familiare, la natura ha assegnato un luogo particolare per lo sviluppamento degl'embrioni, e per la loro uscita. Ma in un animale, il di cui corpo, come quello di un albero, è pieno di germi prolifici, egli è naturale, che i figli nascano come i rami. Il polipo dunque moltiplica *per germogli*: egli mette alla luce i suoi figli, come un albero vi mette i suoi rami (1).

La

(1) Vedi l'articolo 185.  
TOM. II.

La madre, ed i figli non formano che un medesimo tutto, e si nutriscono scambievolmente: un albero nutrice i suoi rami, ed egli è nutrito da essi; le foglie medesime si nutriscono scambievolmente. Il polipo aggravato della sua numerosa posterità, compone insieme con essa una specie di albero genealogico, che sembra favorevole al sistema della *precontinenza*. Egli ci fa vedere molte generazioni unite ancora l'une all'altre, e tutte unite alla prima. La molteplicità di tutti questi esseri organizzati, che sono uniti ad un tronco comune, sembra dirci, ch'erano tutti contenuti originalmente in questo tronco. L'esempio è nuovo nel regno animale, il vegetale ne mostra un simile agli occhi anche meno attenti. E' cosa poco filosofica l'opporci a questa riflessione di calcoli senza fine, ed empierie delle pagine di zeri, per provare, che la *precontinenza* è assurda. Noi non sappiamo precisamente in qual proporzione si degradino i diversi ordini della generazione. Noi non abbiamo una maggior cognizione del rapporto, de' tempi, e de' loro incrementi. Noi calcoliamo sopra supposti più, o meno incerti: e lo ripeterò io ancora? Tutti questi calcoli spaventosi non convincono, che l'immaginazione, e la ragione trova sempre un sicuro rifugio nella divisione infinita della materia. Noi non siamo fatti per conoscere gli ultimi termini di questa divisione: il nostro occhio ottuso non scopre, che le più dozzinali delle infinitamente piccole, e quando ricorriamo alle nostre migliori osservazioni, noi non veggiamo che le meno dozzinali, che alcuni credonfi di prendere per belle osservazioni; che dico io! Per monti di terra fatti dalle talpe.

275. *Come semplici porzioni del polipo facciano di per se medesime delle nuove produzioni. Effetto delle derivazioni.*

Se semplici divisioni del polipo, io voglio dire, porzioni, che non hanno ancora nè testa, nè bran-  
che,

che, germogliano de' polloni, ch'esse contengono, siccome le divisioni delle piante, tutto ciò, che loro è necessario per vegetare a parte, e per fare delle nuove produzioni. Io l' ho spiegato nel Capit. IV. Articolo 47. del primo Tomo, e nel Capitolo XII. Articolo 240. Se un polipo stando rovesciato, o che si raddirizzi in parte, germoglia nella medesima maniera de' figli, segno è che l' operazione singolare, che gli si è fatto patire, non disordina punto l' economia vitale, e ch'egli è sempre in perfetta vegetazione. Finalmente se la buttata de' polloni è parso, che qualche volta ritardi quella delle branche della divisione (1), ciò è avvenuto perchè i polloni tirano a se una parte de' sughi ec. Tutto questo è al presente tanto semplice, e chiaro, che non v'ha più bisogno che io mi vi arresti.

276. *Nuove considerazioni sopra la quistione, se la moltiplicazione naturale per polloni, e quella per divisione, si operino dai germi identici.*

I germi, che danno nascita a' polloni sono eglino i medesimi, che operano la riproduzione per divisione? Io ho squittinata questa quistione nel Capitolo precedente, al quale vi rimetto, e vi mando particolarmente all' articolo 256. dove ho dimostrato, che la decisione di questo punto oscuro, è indifferente al principio dell' *evoluzione*. Il polipo mi somministrò colà delle nuove osservazioni, le quali accennerò. Allorchè si paragona quello, che accade nella moltiplicazione per divisione, con quello, che accade nella moltiplicazione per polloni, farebbesi tentato di sospettare, che queste due maniere di moltiplicare, non dipendino da germi *identici*. Per giudicarne, io non devo fare che riportare i proprj termini del Sig. Trembley: ecco com'egli de-

---

(1) *Memorie sopra i polipi*, Tomo 2. p. 167. in ottavo.

descrive la riproduzione per divisione. (1) „ La  
 „ seconda parte, dopo essersi un poco estesa, e aper-  
 „ ta, per l'ordinario della sua estremità anteriore,  
 „ l'estremità dell'apertura sporgono un poco in fuo-  
 „ ri. Esse si ripiegano dopo in dentro; e la piega-  
 „ tura ch'esse formano, serve a ferrare l'apertura,  
 „ di cui parlo. L'estremità anteriore sembra allo-  
 „ ra semplicemente gonfia; ed è ordinariamente  
 „ più, o meno, fintantochè la riproduzione che vi  
 „ si deve fare, sia compiuta. Le branche che ger-  
 „ mogliano dall'estremità anteriore della seconda  
 „ parte, crescono precisamente come quelle dei  
 „ piccoli polipi. Vedonsi da principio le punte di  
 „ tre, o quattro che spuntano dall'estremità di  
 „ questa estremità; e mentrechè queste prime cre-  
 „ scono, ne appariscono dell'altre negli spazj che  
 „ esse lasciano tra loro“. Ecco adesso come si spie-  
 „ ga l'Autore sopra la moltiplicazione *per polloni*.  
 „ (2) „Allorachè un piccolo polipo incomincia a na-  
 „ scere, non si vede da principio che una piccola  
 „ escrescenza, che ordinariamente si termina in  
 „ punta. Ella ha presso a poco la figura di un co-  
 „ no, ma di un cono, la di cui base è grande a  
 „ proporzione della sua altezza. Il colore di que-  
 „ sta escrescenza di questo piccolo bottone, è d'or-  
 „ dinario più oscuro di quello del corpo della ma-  
 „ dre. Appoco appoco questo bottone si alza mag-  
 „ giornemente, ed a misura ch'egli si allunga, for-  
 „ ma un cono, la cui base diventa più piccola a  
 „ misura ch'esso cresce in altezza. Questo cono so-  
 „ venti volte è mal formato, la sua punta è rotonda,  
 „ ovvero sembra troncata. Alcuni gradi di accresci-  
 „ mento di più, fanno finalmente perdere al piccolo  
 „ polipo la forma conica: egli diventa presso a po-  
 „ co

(1) Ibid. pag. 164. 165.

(2) Ibid. pag. 9. 10.

„ co cilindrico, allora è, o intorno a questotempo,  
„ che le branche incominciano a germogliare dalla  
„ sua estremità anteriore. Questo piccolo polipo non  
„ conserva lungo tempo la figura cilindrica, la sua  
„ estremità posteriore, per la quale si unisce a sua  
„ madre, si ristrigne appoco appoco, si ferra, e fi-  
„ nalmente non sembra toccarla che in un punto.  
„ Il piccolo polipo, che ne' suoi principj era molto  
„ largo dalla sua estremità posteriore, dappoich'egli  
„ è formato nessuna parte è tanto sottile quanto  
„ questa “. Le carni dell'estremità anteriore di  
una seconda parte si piegano dunque in fuori, dipoi  
in dentro, e serrano l'apertura. Questa estremità  
figonfia; noi l'abbiamo veduta gonfiarsi ne'miei ver-  
mi. Si forma una nuova bocca; germogliano delle  
branche all'intorno della medesima, ed ecco il po-  
lipo in istato di mangiare. Sembra dunque che sia  
di queste branche come delle zampe del gambero,  
che vi sieno altrettanti germi appropriati alla loro  
produzione. Almeno si vede qualche volta una sola  
branca germogliare fuori del suo luogo naturale, e  
questa branca è un corpo organizzatissimo. Così la  
nuova testa della divisione, non si mostra sotto la forma  
di una papilla: perchè il gonfio non è un solo. Il pol-  
lone al contrario comparisce da principio sotto questa  
forma; si vede un piccolo bottone conico alzarfi sopra  
la madre, questo bottone si allunga; la sua base si  
diminuisce; egli diventa cilindrico; la sua estremità  
ingrossa un poco, ne germogliano delle piccole bran-  
che; ed ecco i progressi di un piccolo polipo. La dif-  
ferenza di queste due produzioni è sensibile. Dall'  
altra parte si osservano dell' idre, le teste, e le  
code delle quali si staccano di per se medesime dal  
loro tronco, e diventano polipi perfetti (1). Si son  
vedu-

---

(1) Ibid. pag. 197.

vedute formarsi nel medesimo tempo due teste sopra un piccolo polipo, allungarsi insensibilmente, e trovarsi dopo all'estremità di una branca. Ciascheduna branca si riuniva al resto del corpo, che gli era comune (1). Io cito le parole medesime del Signor Trembley. Egli aggiugne, che se queste due teste fossero state due piccoli polipi, che incominciassero a nascere, avrebbero dovuto finalmente separarsi uno dall'altro, lo che non è accaduto per rispetto a molti (2). Si vede ancora la testa di un piccolo polipo prendere il luogo di quella, che farebbe dovuta venire alla divisione (3). Finalmente io ho parlato nell'articolo 205. di un pollone di polipo di nuovo rovesciato in parte, che innestossi con questo, e non compose più che un medesimo tutto. Questi fatti non sembrano eglino indicare, che le teste hanno la medesima origine, che i polloni; poichè in certi casi, elleno affettano tutte le apparenze de' polloni, e questi sembrano qualche volta prendere il luogo di quelli? Io lascio dunque questa questione indecisa, e sosponderò senza pena il mio giudizio, fintantochè la natura medesima voglia pronunziare per bocca di un altro Trembley; ma essa non è prodiga di tali uomini.

277. *Mostruosità. Qual idea si può fare della moltiplicazione naturale per divisione.*

Io tralascio alcune *mostruosità* del polipo: le mostruosità non abbattano punto i germi; elleno sono scarti della natura, che hanno le loro leggi a noi incognite. La moltiplicazione naturale per divisione potrebbe non essere altro, che l'effetto di una  
ma-

(1) Ibid. pag. 108.

(2) Ibid. pag. 109.

(3) Vedi l'art. 190.

malattia , che cagiona delle profonde contrazioni (1). Io chiamo questa moltiplicazione *naturale*, per opposizione a quella, che produce la sezione. Ma vi ha luogo di presumere, che la prima sia altresì *accidentale*; il Sig. Trembley sembra insinuarlo allora, che egli osserva, (2), *che questo è accaduto troppo di rado, per poter dire, che questa maniera di moltiplicarsi sia ordinaria, e naturale a' polipi*. Ciò che sembrerebbe confermare, che questa sorta di moltiplicazione sia l'effetto di qualche malattia, o di qualche fregolamento straordinario, che soppravviene nell'intiere del polipo, è quello, che aggiugne l'Autore (3): *che la riproduzione, che doveasi fare nelle porzioni; che si erano divise di per se medesime, non ha avuto luogo nè pure nell'innesto, che al fine di quindici giorni, o di tre settimane.*

178. *Conclusione. Ragione della gran fecondità del polipo.*

Ecco quello, che io doveva esporre per procurare di render ragione de' principali fenomeni de' polipi a *branche*. Se noi non vogliamo ricorrere a delle spiegazioni puramente meccaniche, che l'esperienza non giustifica, e la buona Filosofia riprova, noi penseremo, che il polipo è, per così dire, formato dalla ripetizione di un' infinità di piccoli polipi, i quali non aspettano, che favorevoli circostanze per venire alla luce. Questo insetto è voracissimo: le parti animali somministrano più sughi nutritivi, che tutte l'altre; elleno sono più analoghe all'animale, e si *assomigliano* meglio. Il polipo dunque si rigenera prontissimamente, e si moltiplica prodigiosamente. Tanto più moltiplica, quan-

(1) Vedi l'art. 197.

(2) *Memorie sopra i polipi a branche*, Tom. 2. pag. 147. e 148.

(3) Ibid. pag. 95.

quanto più consuma. I miei vermi acquatici, che si nutrono specialmente di terra, non sono tanto fecondi: io non ho veduto ordinariamente, che un solo pollone sopra il loro corpo.

279. *Come si possa render ragione della moltiplicazione naturale per divisione di una specie di millepiedi.*

Come si sviluppa una testa all'estremità anteriore di un verme, o di un polipo, così se ne sviluppa una presso l'estremità posteriore del millepiedi *a dardo*; ma dovèchè ne' primi questo sviluppamento è cagionato dalla sezione, o da qualche accidente analogo, nel secondo al contrario questo sviluppamento è d'istituzione della natura, che si è compiaciuta di variare i mezzi della moltiplicazione, siccome i caratteri, le forme, ed i colori. Si forma egli dunque una testa nuova verso l'estremità posteriore del millepiedi: si vede un nuovo dardo alzar si appoco appoco sopra il dorso dell'insetto: incominciano a divenir sensibili alcuni organi, che non sembravano esistere in nessun modo. A misura ch'essi si sviluppano, i vasi, che univano l'estremità posteriore al resto dell'animale, si nascondono, e si scancellano: la nuova testa li comprime in apparenza, ed intercetta i succhi nutritivi; questo è almeno ciò, che si può conghietturare di più verisimile. Dappoichè sono rotti tutti i legamenti, l'estremità posteriore provvista della nuova testa, si separa dal millepiedi, e già essa medesima è un piccolo millepiedi, che non ha bisogno d'altro, se non di crescere. Questo insetto particolare non ci è ancora molto noto: il poco, che io ne ho riportato nell'articolo 198. dietro la scorta del Sig. Trembley, (1) non basta punto per soddisfare sopra la maniera, con cui opera questa moltiplicazione naturale *per divisione*. Il Sig. Trembley si pro-

pone

---

(1) *Memorie sopra i polipi a branche*, Tom. 2. pag. 152. 153. in 8.

pone di esaminare con esattezza tutto ciò, che concerne questo soggetto interessante, e quanta abilità non possiamo noi prometterci dall'Autore de' polipi.

280. *Analogia tralla moltiplicazione del polipo fatto a imbuto, e quella del millepiedi fatto a dardo.*

Vi ha una specie di analogia tralla moltiplicazione de' polipi *a imbuto*, e quella del millepiedi *a dardo*. Si può dire, che il polipo *a imbuto* moltiplica naturalmente *per divisione*. Egli si divide di per se medesimo, e di un solo polipo se ne formano due. Una nuova testa, delle nuove labbra si sviluppano sopra la metà del corpo dell'antico polipo, e questo sviluppo segue prestissimo, prepara la separazione delle due metà dell'insetto; in poco tempo non sono più due metà, ma due *tutti* completissimi, e più piccoli del primo. Se l'accrescimento è pronto ne' polipi *a branche*, egli deve esserlo molto più ne' polipi *a imbuto*, molto più delicati, e gelatinosi ancora. Li progressi del feto sono altresì più rapidi di quelli della prole, e dell'adulto. Così in questi atomi organizzati, che non sono se non quasi una gocciola di liquore condensato, segue tanto presto l'*evoluzione*, che crederebbesi vedere una *creazione*, tanto il raziocinio oscura il segno della natura.

281. *Difficoltà di spiegare la moltiplicazione per divisione naturale, del polipo fatto a bulbo. Motivo del silenzio, che l'Autore s'impone riguardo a questo.*

I polipi fatti *a campana* si dividono altresì di per se medesimi, ma differentemente dai polipi fatti *a imbuto* come l'ho spiegato in un altro luogo (1). I polipi *a campana*, che devono la loro nascita a dei bottoni in forma di *galle*, (2) moltiplicano d'una maniera ancora più straordinaria. Qui incomincia un nuovo ordine di cose; l'analogia ci abbandona, e

l'Of-

(1) Articolo 199.

(2) Articolo 201.

l'Osservatore non ha nè pure de' termini proprj per rappresentare quello, ch'egli intende. Io tacerò dunque sopra questo polipo; perchè è più ragionevole il tacere, che l'arrisicare delle proposizioni vaghe, sopra oggetti, che si traspirano appena, e che differiscono da tutti gli oggetti conosciuti. I partigiani più zelanti dell'*epigenesi* non si prevarranno contra di me del silenzio, che io m'impongo; l'ignoranza sopra un oggetto non può divenire un titolo in favore di qualsivoglia sistema; e se io volessi procurare di tirare dalle scoperte in quistione le conseguenze, che più naturalmente ne seguono, io farei abbastanza vedere, che non sono niente contrarie all'*evoluzione*.

292. *Perchè gl' insetti, che si trasformano, non sembrano proprj ad essere moltiplicati per divisione. Riflessione sopra questo soggetto.*

Del rimanente, tutti gl' insetti, conosciuti fino a qui, che possono esser moltiplicati per divisione, appartengono alla classe di quelli, che non si trasformano. Io ho dati nel Capitolo X. del Tomo I. i principj generali di queste metamorfosi, da' quali potrebbe inferire, che gl' insetti destinati dalla natura a patirla, non sono proprj ad esser moltiplicati per divisione. Eglino hanno maggiori parti *disfilarari*, e quelle, delle quali essi sono provvisti, hanno per ultimo fine lo sviluppo di un altro tutto organico collocato in un luogo particolare: questo tutto costituisce propriamente la *specie*, ed è destinato a conservarla. Ma siccome tutti gl' insetti, che non si trasformano, non moltiplicano per divisione; nella medesima maniera altresì tra quelli, che si trasformano, potrebbe trovarsene di quelli che moltiplicassero per questa via. Non ci sforziamo di fare delle regole generali; i gorgoglioni, ed i polipi ci hanno insegnato a non fidarsene.

## CAPITOLO III.

*Idee sopra la metafisica degl' insetti , che possono essere moltiplicati per divisione ec.*

283. *Che il polipo non è più favorevole al Materialista , che al Cartesiano . False idee , che si sono fatte sopra questo soggetto , per non averlo meditato abbastanza . Scopo dell' Autore .*

DESCARTES avrebbe trionfato alla veduta del polipo: un animale che si moltiplica tagliandolo a pezzi somministrava un bell'argomento in favore del sistema ingegnoso di questo Filosofo. Io non sofferrò perciò questo sistema, quantunque ci strighi da molte difficoltà: esso è dall' altra parte troppo contrario all' analogia, che noi osserviamo tralla nostra organizzazione, e quella de' grossi animali; e se è probabile almeno, che questi animali abbiano un' anima, non lo è meno, che tutto ciò ch'è animale, ne abbia altresì una. Io non risguardo dunque l' esistenza dell' anima delle bestie, che come probabile, poichè ella non è fondata, che sopra l' analogia. Il volgo condotto dal sentimento va più lungi; egli decide sopra la realtà di questa esistenza, ed il Filosofo medesimo ha molto che fare a non seguirlo. Ma accordando un' anima al polipo, il mio Lettore teme apparentemente, che io non mi prepari de' tormenti. Quasi tutti gli uomini hanno nello spirito certe idee metafisiche, sopra le quali essi ragionano: quasi tutti fanno presso appoco, che l' anima è un essere *semplice*, donde essi concludono facilmente, ch'ella non può esser divisa. Come dunque per un colpo di scalpello, di un solo verme, o di un solo polipo, si fanno molti animali? Ciò che mi reca maraviglia maggiore si è, che i Filosofi, come il volgo, sieno in qualche maniera contentati di

di sentire la difficoltà, e che non abbiano fatto dei felici sforzi per iscioglierla. Sembrami, che in generale si sia risguardata come insolubile. Non v'è altresì niente, sopra cui si sia maggiormente insistito, dappoichè si è sparso la scoperta del polipo. Uno si è fatto un dovere di ammirare, e di declamare sopra l'incertezza delle nostre cognizioni in metafisica. Sarebbesi fatto meglio ad impiegare nel meditare quel tempo che si è perso a discorrere. Io non finirei mai, se volessi confutare tutti i cattivi ragionamenti, de' quali il polipo è stato il soggetto, e l'occasione: pochi fanno farsi delle idee pure sopra questa materia astratta: ed ancora tratterebbero volentieri di temerario chiunque osasse prometterne delle tali. Io non prometto niente, ma espongo semplicemente i principj somministratimi dalle mie meditazioni.

284. *Sede dell'anima. Sensazioni. Me del polipo.*

La scoperta dell'*origine* de' nervi ha dato il motivo di collocare l'anima nel cervello. Non fa di mestieri ch'io dica, che non vi risiede nella maniera di un corpo; ella non è corpo: ma vi è presente nella maniera di una sostanza semplice. Non mi si domandi, che cosa sia questa *presenza*, poichè io so professione d'ignorare profondamente la natura intima di quest'anima, e non la conosco se non per alcune delle sue facoltà. Io suppongo dunque un'anima nella testa del polipo. Quest'anima ha delle sensazioni, che le procurano gli organi, di cui è dotato l'insetto. Ella ha un *sentimento* della *presenza* delle sue sensazioni; perchè un'anima non può avere una sensazione, ch'essa non *senta* nel medesimo tempo, che l'ha. Io non posso dire quello che sia questo *sentimento*; la mia anima non è fatta per sentire nella maniera di quella del polipo: ma io vedo a sufficienza ch'ella non è precisamente ciò che noi chiamiamo in noi *coscienza*, o percezione. La *coscienza* suppone sempre un poco di riflessione, e non si accorderà la  
ri-

riflessione ad un insetto . Tutto quello , che gli si può ragionevolmente accordare è una specie di *reminiscenza* . Il polipo sente , che s' impadronisce di una preda , e che la divora , egli sente ancora , che ha avuto piacere ad impadronirsene , e a divorarla : e' ne conserva unacerta *memoria* , che unisce le sensazioni sopravvenienti alle precedenti . Questa memoria costituisce una specie di *personalità* nell' insetto . Egli non può dire *me* ; ma possiede nella sua maniera un *me* . Questo *me* si appropria tutte le sensazioni ; ei s' identifica con tutte . Egli è il *me* che s' impadronisce di un gorgoglio , che lo divora , che sen' è impadronito , e che l' ha divorato .

285. *Dove risiede il me nell' insetto , che si divide in due trasversalmente ? Dei movimenti , che sembrano spontanei , e non sono che macchinali . Principj propri per ispiegarli tratti dalla dottrina dell' irritabilità .*

Io divido l' insetto pel mezzo secondo la sua larghezza : egli è evidente , che la porzione dove tiene la testa , è la sola , che conserva il *me* , o la *personalità* . Non vi ha dunque più il *me* nell' altra porzione ; perchè noi abbiamo ammesso , che l' anima risiede nella testa , ma questa porzione contuttociò sembra *sentire* ; ella fa varj movimenti , ed io ho veduto una metà di un verme di terra , ( 1 ) ed alcuni tronchi de' miei vermi acquatici , strisciare , come lo avrebbe fatto un verme completo ; di più , essi sembravano conservare ancora tutte le inclinazioni proprie della loro specie . Io non voglio dissimular niente ; io dunque argenterò la difficoltà nel trascrivere quì un passo rimarcabilissimo del mio *Trattato dell' Insettologia* , Parte 2. pag. 93. e 94. Osservaz. XIV. „ Nel conto , che io „ ho reso ( Osservaz. II. ) della mia prima espe- „ rienza sopra questi vermi , io mi sono arrestato per „ qual-

---

( 1 ) Vedi l' Articolo 244.

„ qualche tempo a descrivere i movimenti di ciasche-  
 „ duna metà per lo spazio de' primi giorni dopo l'  
 „ operazione. Io ho fatto osservare, che la seconda,  
 „ quella che non avea la testa, strisciava all'innanzi  
 „ presso appoco come se l'avesse avuta; sembrava  
 „ cercare di nascondersi, ella sapea tornare indietro  
 „ all'incontro di qualche ostacolo ec. Tutto questo,  
 „ benchè osservabilissimo, contuttociò non è di tanto  
 „ valore, quanto quello, che ho osservato sopra si-  
 „ mili vermi; poco tempo dopo aver tagliata loro la  
 „ testa. Io gli ho veduti, con mia gran maraviglia,  
 „ immergersi nel loto, servendosi della loro estre-  
 „ mità anteriore, come di una testa, per farvisi una  
 „ strada. Io ho osservato il verme, num. II. Tavola  
 „ II. strisciare lungo le pareti di un vaso di vetro,  
 „ dove lo tenevo serrato, e fare degli sforzi per  
 „ uscirne, quantunque non avesse nè testa, nè coda“. *Coloro de' miei leggitori, che hanno lette le belle*  
*memorie del Sig. de Haller sopra l'irritabilità ve-*  
*dono già ciò, che si può dire per isforzarsi a scioglie-*  
*re la difficoltà di cui quì si tratta. Si sa, che l'irri-*  
*tabilità è quella proprietà della fibra muscolare, in*  
*virtù della quale essa fibra si contrae di per se mede-*  
*sima, al tatto di qualunque corpo o solido, o fluido.*  
 Per essa il cuore staccato dal petto continua a battere  
 per qualche spazio di tempo. Per essa gl'intestini se-  
 parati dal basso ventre, e divisi in molte porzioni,  
 come i nostri vermi, continuano per qualche tempo  
 ad esercitare il loro moto *peristaltico*. Per essa final-  
 mente le membra di molti animali continuano a muo-  
 versì, dopo essere state separate dal loro tronco. Si  
 dirà forse, che queste porzioni d'intestini, che si  
 vedono strisciare sopra una tavola come i vermi, so-  
 no messe in moto da un'anima, che risiede nelle loro  
 membrane? Si ammetterà altresì un'anima nella co-  
 da della lucertola, per render ragione de' movimenti  
 tanto vivi, ed durevoli, che vi si osservano dopo ta-  
 gli-

glia-

gliata? Si vorrà ancora, che un'anima sia collocata nell'ago della vespa, che è il dardo al di fuori, dopo lungo tempo che il ventre è stato separato dal petto? Veramente questi fatti sono molto singolari, e imbarazzano molto, siccome quelli, che ho riportati nel passo citato di sopra: e non si vede frattanto, che gli uni, e gli altri non sono che risultati di una meccanica segreta? Il Sig. de Haller ha provato, che il cuore separato dal petto, cessa di battere, dappoi- ché si purgano i ventricoli di quel poco di sangue, che contenevano ancora: l'*irritabilità*, quella forza, la cui natura non conosciamo, allora non opera più, perchè niente l'eccita. Mediante dunque le contrazioni, che il tatto di un corpo estraneo produce nelle fibre muscolari de' nostri vermi, in quelle delle porzioni degl'intestini, in quelle della coda della lucertola, ec. si operano que' movimenti, che ci sembrano *volontarij*; e che nientedimeno non sono, che puramente macchinali. La macchina è montata per eseguirgli, e li eseguisce dacchè ella è messa in opera.

286. *Nuovo me, che si produce, e come.*

Quella porzione del polipo, che non avea nè testa, nè branche, non tarda a germogliarne delle nuove, ed è già un polipo perfetto, che s'impadronisce delle prede, e le divora. Se non segue una nuova *creazione* ne' corpi, perchè la supporremo noi nelle anime? Se l'Autore della natura ha giudicato cosa convenevole di mettere da principio tutti i corpi organizzati ne' *germi*, non è egli probabile, che v'abbia messo altresì da principio le anime, che vi diventeranno un giorno la sorgente del sentimento, e de' moti *volontarij*? Si penserà, che ad ogni nuovo colpo di scalpello, Iddio crei un'anima pel germe, che si sviluppa? Questo sarebbe certamente poco filosofico, soprattutto se si ammettessero delle volontà *successive* nella suprema ragione. Come supporre una successione di atti in questa volontà, che ha potuto crear tutto  
con

con un *solo* atto? Dunque il polipo, che nasce sotto i nostri occhi, è una *nuova persona*, (mi si permettano queste espressioni: ) egli non ha potuto conservare alcuna *memoria* delle sensazioni, che aveano toccato il polipo, di cui egli per l'avanti era parte. Questa memoria è rimasta nel cervello dell'antico polipo: nel polipo, che noi consideriamo si è sviluppato un nuovo cervello; e le prime impressioni, che toccano il polipo nascente, sono il fondamento di una nuova *personalità*: accade precisamente di questo polipo come del *feto* di qualsivoglia animale: l'anima della madre non si divide tra essa ed il feto; ma questi possedeva già nello stato di germe un'anima, che gli era propria, e che incomincia a *sentire*, dacchè alcuni organi si sono sviluppati fino a un certo segno.

287. *Che le idre sono persone composte. Spiegazione del verme da due teste, e da due volontà. Osservazione sopra il fenomeno metafisico che presentano le idre.*

Un' *idra* è un composto di molte *persone* unite sopra un tronco comune. Quando si divide un polipo secondo la sua lunghezza cominciando dalla testa, non si divide l'anima; ma essa resta in quella delle due metà, dove rimane la sua sede. L'operazione può cagionare nulladimeno un tale fregolamento in quest'organo, che la personalità può rimanere interamente distrutta. Dunque se ne formerà una nuova, dappoicchè l'organo avrà acquistato quello, che gli mancava per trasmettere all'anima delle nuove sensazioni. Sarebbe inutile, che io m'intertenessi a provare, che la memoria non appartiene all'anima, ma al corpo: coloro de' miei lettori, che averanno meditato i principj, che io ho esposti nel mio *Saggio Analitico*, (1) non avran-

no

---

(1) *Saggio Analitico sopra le facoltà dell'anima*: a Coppenhagen, ed a Ginevra, presso i Fratelli Filibert. 1760. in quarto. Cap. VIII. par. 57. e cap. XXII. par. 626. e segg.

no difficoltà a convenire . Quel verme da due teste , e da due volontà , di cui si è parlato per l'addietro , (1) conteneva in fattidue *personalità* . Due teste si erano sviluppate sopra il medesimo busto , e ciascuna testa avendo la sua anima propria , non è maraviglia , che questo verme sembrasse avere due volontà . Se si ha a credere al Sig. Boezel , questa *moltiplicità* di volontà è molto più maravigliosa nell'*idre* . Io non ho letto questo Autore ; ma ecco ciò , che ne scrisse il Sig. de Haller . *Egli ha vedute delle teste di polipi tagliate , e diventate idre , farsi la guerra , ed una testa del medesimo animale divorare un'altra testa , ch'era stata parte di essa medesima alcuni giorni avanti . Questo fenomeno ha della difficoltà : tagliare le volontà ! Farne due d'una sola colle cesoje !* La maniera semplice , colla quale io spiego questo fenomeno , toglie la difficoltà , che recava fastidio al Signor de Haller . Non si fendono le volontà ; ma di una sola volontà se ne fanno due , e nel germe di ciascheduna testa risiedeva originariamente un'anima .

288. *Del me ne' polipi innestati .*

Quando s'innesta la testa di un polipo sopra il busto di un altro polipo , egli è ben chiaro , che la *personalità* non si muta ; poichè questa operazione non interessa niente il cervello . Quando si mettono a filo molte porzioni di polipi , s'innestano l'une all'altre , e non formano dopo che un solo animale . La testa , che si sviluppa nella prima porzione , diventa la sede di una nuova *personalità* . Io non sò cosa accada al cervello de' due polipi , che s'inferisce l'uno nell'altro , e le teste de' quali s'innestano . Ma io credo , che possa sopravvenirvi l'una , e l'altra di queste tre cose . Primo , o li due cervelli sussistono senz'alterazione , ed allora vi sono due *personalità* distin-

(1) Articolo 140.

distinte. Secondo; o l'uno de' due cervelli si scancelia dalla pressione dell'altro, ed allora non v'ha che una sola *personalità*. Terzo, o li due cervelli si distruggono, ed allora si forma una nuova *personalità*, per lo sviluppamento di un nuovo cervello. Potrebbe darfi un quarto caso più raro, e di maggiore imbarazzo; e sarebbe quello, se li due cervelli si confondessero l'uno nell'altro senza distruggerfi. Allora vi sarebbero due *me* nel medesimo cervello. Ma non è possibile, che i due *me* potessero avere la medesima sensazione nel medesimo istante indivisibile; poichè è impossibile, che la confusione riescisse tanto perfetta, che tutte le fibre de' due cervelli andassero a riunirsi in un punto comune, e non formassero così, che un solo *sensorium*.

289. *Del me ne' polloni.*

Se la produzione di una nuova testa suppone la preesistenza di un *germe*, la suppone altresì la produzione di un pollone. Io ho stabiliti i fondamenti dell'uno, e dell'altro supposto. Dunque nel germe del pollone sta collocata un'anima, che incomincia a *sentire*, dacchè il germe ha preso un certo accrescimento. Un polipo, che sia madre, aggravato della sua numerosa posterità, compone con essa un solo tutto *fisico*, ma non una sola *persona*. Ogni pollone ha il suo *me*, poichè ha il suo cervello proprio, e si osserva, che provvede di per se medesimo alla sua sussistenza, prendendo delle piccole prede, e divorandole come farebbe ogni altro polipo. La stretta unione della madre, e de' suoi parti, e dei parti tra loro, stabilisce in questo tutto singolare, una specie di comunità di sentimenti, e di bisogne. Lo stato della madre influisce sopra quello de' parti e lo stato de' parti sopra quello della madre ec.

290. *Del me ne' insetti, che si trasformano.*

L'insetto, che da principio è *bruco* dipoi *crisalide*, e finalmente *farfalla*, non prende altrettanto

per-

*personalità differenti, quante forme; o per ispiegarmi più chiaramente, nel bruco non vi sono tre me. Si è veduto nel Capitolo X. del Tomo I. a che si riducono queste metamorfosi. I lumi, che noi abbiamo acquistati sopra la fisica del fenomeno, c'illuminano sopra la Psicologia. Il bruco non è che il maschio della farfalla: è dunque sempre il medesimo individuo, il medesimo me; ma ch'è chiamato a sentire, e ad operare per differenti periodi della sua vita. Io rimando al mio Saggio Analitico sopra le facoltà dell'anima. (1)*

## CAPITOLO IV.

*Della fecondazione, e della generazione degli animali. Varietà, che vi si osservano. Osservazioni sopra alcuni luoghi della Storia Naturale del Sig. di Buffon.*

291. *Disegno di questo Capitolo.*

Io non voglio, che scorrere rapidamente le particolarità più rimarcabili, che contiene questa materia. Io accennerò le analogie, e le eccezioni, insisterò un poco più sopra queste, elleno sono buoni preservativi contro le conseguenze troppo generali. Se io volessi scrivere tutto, farei una Storia Naturale, e mi scorderei, che compongo uno scritto sopra la generazione.

292. *Le nostre cognizioni sopra il sistema generale sono molto limitate. Conseguenza pratica.*

Noi non sappiamo, perchè l'Autore della natura abbia stabilito, che la maggior parte degli animali perpetuerebbonfi pel concorso de' due individui. Io ho arrischiato di sopra alcune riflessioni alla fine del Capitolo.

---

(1) Cap. XXIV. parag. 714. e segg.

Capitolo V. del Tomo I. Era giovine ancora quando facevo queste riflessioni; adesso che la mia ragione è matura non ne arrischierò alcuna. Per avere sopra questo punto, siccome sopra un'infinità di altri, maggiori conghietture, e supposti, bisognerebbe, che noi potessimo abbracciare in una sola veduta, tutti gli esseri. Dalla connessione di essi ne risulta il *sistema generale*, e nel sistema generale è la *ragione* de' sistemi *particolari*. Noi non scorgiamo ancora, che alcuni di questi sistemi, e la loro *connessione* col gran tutto ci scappa. Noi vediamo molti *rapporti*, e *fini*, per giudicare, che la causa prima è *intelligente*, ma non ne scopriamo nissun per giudicare del suo *piano*. Perchè il tale, o tale animale non può perpetuare la sua specie senza congiugnersi ad un suo simile? Perchè un'altro animale è gli ermafrodito, senza potere nulladimanco secondar se medesimo? Perchè v'è egli un'altra specie, nella quale si osserva la distinzione del sesso, ed un accoppiamento, e che moltiplica nientemeno senza il concorso de' sessi? Questi sono altrettanti enigmi, i quali noi non spiegheremo, se non allorchè avremo acquistati altri occhi, e un'intelligenza superiore a quella dello stato presente. Frattanto osserviamo con attenzione tuttocìò, ch'è a nostra portata. Quanto più le nostre osservazioni si moltiplicheranno, tanto più le nostre cognizioni si estenderanno, e si perfezioneranno. Se non ci è permesso ancora di leggere da un'estremità all'altra il libro della natura, almeno procuriamoci di tirare il miglior partito possibile dal piccol numero di pagine, ch'ella offerisce al nostro esame. L'unico mezzo di arrivarvi, è il ricordarsi, che noi non abbiamo l'*indice* di questo libro, e che noi siamo ridotti, per non errare, a considerare ciascun oggetto in se medesimo, e ne' suoi rapporti agli oggetti più vicini. La luce, che si riflette di vicino invicino, accresce la chiarezza della luce diretta.

293. *Maniera, con cui si opera la fecondazione nella maggior parte degli animali.*

Nell'uomo, ne' quadrupedi, ne' grossi pesci, conosciuti sotto il nome generale di *cetacei*, in diverse specie di uccelli, di testacei, di rettili, d'insetti ec. il *maschio* è provvisto di una parte, ch'egli introduce in quella della *femmina*, destinata a riceverla, e che opera la *fecondazione*. In molte specie di uccelli, per esempio nella gallina, nella passera, nel piccione, l'intromissione è equivoca. Il gallo provvisto di due membri, sembra non fare altro, che comprimere fortemente la femmina, (1) e questo accoppiamento sempre istantaneo, basta per mettere la gallina in istato di partorire delle uova feconde, almeno per molte settimane. (2)

294. *Maniera singolare con cui si opera la fecondazione ne' pesci a squamme.*

Li pesci sembrano più casti ancora ne' loro amori. Egli è certo, che non si accoppiano in nessun modo, perchè il maschio è sprovvisto della parte necessaria alla copula. Qualche volta si raggira sopra il dorso, per riscontrare il ventre della femmina, e non fa questo, che per isperdere i suoi *lati* sopra le uova, ch'essa partorisce. Esse sole l'eccitano, egli le innaffia; allorchè ondeggiando a livello delle acque, e ch'egli non può scoprire la femmina, che le ha partorite. (3)

295. *Eccezione rimarcabile alla regola dell'intromissione. Mosche di case.*

Nelle specie, nelle quali si osserva una vera *intromissione*, il maschio è quello, che introduce. La specie delle *mosche* la più comune nelle nostre case, forma un eccezione rimarcabilissima a questa regola stabilita gene-

(1) *Storia Nat. Gen. ec. Tom. II. pag. 311. in quarto.*

(2) *Arte di far nascere i pulcini ec. seconda Edizione 1757. Parigi, Tom. 2. pag. 328.*

(3) *Storia Nat. Gen. ec. Tom. 2. pag. 311. ec.*

generale. In questa specie la femmina *introduce*, ed il maschio *riceve*. A questo effetto il maschio è provvisto di una parte analoga a quella delle femmine, e la femmina di una parte analoga a quella de' maschi: (1) così è piaciuto all' Autore della natura di variare i mezzi, che conducono al medesimo fine.

296. *Altra eccezione rimarcabile nella situazione degli organi della generazione. Amori delle cavallette, e quelli degli aragni.*

Vi è ancora un'altra regola, che si giudica generale, che nelle specie, gl'individui delle quali sono distinti di *sezzo*, la parte, che caratterizza il *sezzo*, sia collocata all'estremità del corpo. Le mosche chiamate *cavallette* ci offeriscono una eccezione a questa regola. La parte propria della femmina è collocata nel luogo ordinario; ma quella, ch'è propria del maschio, è collocata molto vicino al suo petto, ed in una distanza grande dall'estremità del corpo: questa situazione sembra poco favorevole alla copula: il maschio è stato altresì istruito a forzare la femmina, acciocchè venga a collocare l'estremità delle sue parti di dietro dove deve esserlo, perchè sia fecondata. Con due uncini, de' quali l'estremità del suo corpo è armata, afferra il collo della femmina, e la porta in aria. Allettata dalle sue carezze, vinta dalla sua lunga costanza, animata finalmente dal medesimo desio, cessa di resistere, e diventa seconda. (2) L'aragno ci offerisce un'altra eccezione ancora più singolare, e che un valente Osservatore (3) *assicura aver veduto più d'una volta*. Si conoscono in generale le *antenne* degl'insetti: si sa, che sono quelle due piccole corna mobili,

(1) *Memorie per servire alla Stor. degl'Insetti*. Tomo IV. pag. 384. 385. in quarto.

(2) *Ibid.* Tom. 6. pag. 426. ec.

(3) Il Sig. Lyonet *Teol. degl'Insetti*, de'Lesser Tom. I. pag. 184. Tom. 2. pag. 48, à la Haye 1742. in ottavo.

li, che portano sopra la parte anteriore della testa, e delle quali s'ignora l'uso. Sovente elleno sono formate di una successione di vertebre, o di nodi: tali sono in particolare quelle dell'aragno. Ma quello, ch'è strano si è, che le parti della generazione del maschio sono nelle sue antenne; mentrechè quelle della femmina sono poste sotto il ventre, molto vicine al petto. Il maschio, e la femmina sembra, che temano l'accostarsi: gli aragni si divorano gli uni cogli altri, ed il loro naturale feroce, e crudele non è ammansito, che dall'amore. Dopo essersi dati reciprocamente molti segni di diffidenza, i due aragni si accostano appoco appoco fino a toccarsi, e come se li sorprendesse uno istantaneo timore, si lasciano cadere, e restano qualche tempo attaccati a loro fili, risalgono dopo su per la tela, si ritoccano: e si accostano di nuovo, e finalmente si congiungono. *Uno dei nodi delle antenne del maschio si apre ad un tratto, e come per ordigno; egli fa vedere un corpo bianco, l'antenna si piega mediante un movimento tortuoso, questo corpo si congiunge al ventre della femmina, e in questa maniera segue l'accoppiamento.*

297. *Facondazione, e parto dell'ape regina.*

Sembra, che sia stato generalmente stabilito, che il maschio faccia tutti i progressi; ma nella repubblica delle api, repubblica tanto celebre al mondo filosofico, la femmina obbliga il maschio a condiscendere a' suoi desiderj. Si fa, che quasi per tutto l'anno, non vi è in ogni alveare, che una sola femmina: quest'ape tanto amata dalle altre, che si chiama la *vezina*, e che gli antichi poco strutti aveano chiamata il *re*. Io sono stato testimonia mille volte dell'amore singolare delle api per la loro regina, e posso assicurare, che tutto quello, che ne ha raccontato il Sig. di Reaumur non è esagerazione. (1) Ma questa re-

(1) *Memorie per servire alla Stor. degl' Insetti. Mem. 5. del Tomo 5.*

gina, oggetto continuo delle attenzioni, delle diligenze, e delle carezze delle api, è prodiga delle sue al maschio, che vuol eccitare, il quale vi sta molto tempo insensibile. Posta in faccia ad esso lo lecca colla sua tromba, gli presenta del miele, lo accarezza colle sue zampe, gira intorno ad esso, e sempre raddoppiando i suoi vezzi; finalmente ridotta a prendere la positura, che dovrebbe prendere esso, essa sale sopra il suo dorso, e procura di applicare l'estremità delle sue parti di dietro contro quella del maschio, ed ella vel'applica. Questo accoppiamento è singolare, nè dura come quello del gallo, che un istante, ei si rinnova molte volte. Si sono veduti de' maschi morire immediatamente, dappoichè l'aveano sofferto, e la regina raddoppiare le sue carezze per risuscitarli; e la sembrava ancora indifferente rispetto a' maschi viventi, che sostituiva ad esso. (1) Il Sig. di Reaumur non ha potuto assicurarsi, se vi segua una vera copula. L'apparecchio prodigioso delle parti proprie del maschio, i loro sorprendenti raggiri, la loro apparizione al di fuori sotto la forma di due corna assai lunghe, e carnose, in mezzo alle quali si trova collocato un corpo incurvato in alto, un liquore bianco un poco viscoso, che si rende a queste parti; (2) tutto in una parola, sembra indicare, che l'accoppiamento delle pecchie non si riduce a ciò, che io riporto, dopo il nostro illustre Autore: d'altronde i *calabroni* realmente si accoppiano, ed i *calabroni* appartengono al genere delle pecchie, colle quali hanno grandi rapporti. (3) Checchè ne sia, l'ape regina ci offerisce un'altra singolarità, dacchè è stata fecondata una volta: (io suppongo, che segua a primavera;) ella non cessa  
di

(1) Ibid. pag. 503. e segg.

(2) Ibid. pag. 486. e segg.

(3) Ibid. Tom. 6. pag. 20. 21.

di partorire delle uova feconde , almeno fino alla seguente primavera. Una esperienza decisiva prova , che vi sono degli alvearij , ne' quali non v'è nè pure un maschio per tutto questo lungo intervallo di tempo , (1) e la regina non esce dal alveare. La sua fecondità sorpassa ancora la sua incontinenza; al fine di un anno la repubblica può contare 20, 30 , o 40. mila cittadini , che riconoscono da essa la loro nascita. Ella è , in somma la madre , la sola madre di tutto questo gran popolo.

298. *Continuazione del medesimo soggetto. Individui privi di sesso. Principio della politica delle pecchie. Idee sopra il loro istinto. Osservazione sopra il sentimento del Sig. di Buffon intorno alla fabbrica degli alveoli.*

La Repubblica , ovvero la Monarchia delle pecchie mi dà luogo di parlare di una eccezione rimarcabilissima. Quasi in tutte le specie degli animali gl'individui sono maschi , e femmine , ed hanno i due sessi alla volta. Appresso le api , e le vespe il numero maggiore degl'individui è assolutamente sprovvisto di sesso. Essi non hanno alcuna parte relativa alla generazione ; ma sono provvisti di organi , e di strumenti relativi alla fabbrica delle cellule , ed a molte altre funzioni , alle quali la natura gli ha destinati. Si sono chiamati *muli* , o *bastardi* , ma impropriamente , poichè il *mulo* ha un sesso : sono stati meglio designati per l'epiteto di *neutri*. Dunque le ovaje della madre ape contengono tre spezie d'uova , dalle quali nascono tre specie d'individui , di *regine* , di *maschi* , o *falsi bordini* , e di *neutri* . I maschi sono ordinariamente 5. o 600. e spessissime fiate mille . La regina dunque ha un, ferraglio di maschi : il loro gran numero ci fa conoscere , perchè la natura gli ha fatti così freddi ; se fossero stati tanto ardenti , quanto quelli della maggior par-

(1) Ibid. Tom. 6. pag. 20. 21.

(2) Ibid. Memoria 10. del Tom. V.

parte degli animali , la regina non avrebbe avuto tempo di partorire. Il numero delle regine , che nascono in ogni alveare , è sempre picciolissimo ; queste giovani regine conservano la specie , e fondano , per così dire delle nuove colonie . Poco tempo dopo esser nate , e state fecondate escono dall'alveare , accompagnate da molte migliaja di neutri , che compongono quello che si chiama *sciame*. Ogni *sciame* ha la sua regina , e fintantochè non ne possiede una , i neutri non si mettono all'opera . Lo *sciame* il più laborioso , che resti privo della sua regina , lascia tutto il travaglio , e non lo riprende , se non allorchè gli è refa ; sembra ancora , che proporzioni il travaglio alla fecondità di questa : quanto più ella è feconda , tanto più i neutri fabbricano delle cellule . In queste cellule la madre va a depositare le sue uova , ed elle servono di cuna ai parti , che ne nascono . Ma siccome la madre mette alla luce tre sorte d'individui , di figura differente , li neutri fabbricano tre sorte di cellule di diverse dimensioni in un rapporto determinato , e costante alla diversità della figura delle tre spezie d'individui . La madre , struita dalla natura , sa precisamente quale spezie d'uova partorisce , e non isbaglia niente nella scelta della cellula . Li neutri , non solamente hanno l'incarco di raccogliere il miele , e la cera , e metterla in opera ; ma appartiene ancora ad essi l'allevare i parti , provvedere loro il necessario , siccome quello di tutta la comunità . E' inarrivabile l'amore de' neutri per questi parti , che non hanno fatti , e non hanno saputo fare . La regina non era chiamata a dividere queste cure ; dovea occuparla assai il parto , ed i servizj , che prestano i maschi , o falsi bordonj , si restringono alla sola fecondazione . Non vi è dunque , che un tempo , nel quale sieno utili , e questo tempo è assai corto ; dacchè cessano d'esserlo , i neutri gli uccidono , ed in pochi giorni non resta nell'alveare nè pure un maschio . Le

gio-

giovani regine, non arrivano tutte ad uscire alla testa di uno *sciame*, molte rimangono nel alveare, e vi muojono. In qualunque modo che la cosa passi, egli è certo, che tutte le regine soprannumerarie sono sacrificate; e non vi resta mai nell'alveare, che una sola regina. (1) Non cerchiamo nelle pecchie una maraviglia, che non vi sia, anzi ci è piaciuto l'accrescervela; ma ci è piaciuto altresì il ridurvi tutto alla pura meccanica. Tenghiamo una cosa di mezzo: noi abbiamo accordato un'anima al polipo, ch'è quasi una pianta; ne concederemo una anche all'industriosa pecchia. Noi le accorderemo del sentimento, ma non dell'intelligenza, molto meno poi della geometria. La regina forse alletta l'odorato, o qualche altro senso de' neutri, di una maniera analoga a quella, di cui l'*andare in amore* alletta i maschi della maggior parte degli animali: io voglio dire, che l'impressione, che fa la regina sopra i neutri, è puramente *fisica*, e tale com'ella gli eccita al travaglio. I parti fanno apparentemente sopra essi qualche impressione simile, e che li determina a porre nelle loro cellule una specie di pappa, ch'è il nutrimento proprio di questa tenera età. La diversa grossezza delle uova può far conoscere alla madre, quale sia quello, ch'è vicino ad uscire dal suo ventre, e questo sentimento può essere associato a qualche altro sentimento, che determina una specie di scelta della cellula. Se i maschi sono sacrificati, questo accade forse in un tempo, nel quale essi esalano un odore insopportabile a' neutri, o che i maschi fanno sopra essi qualche impressione irritante, e provocante. Le regine possono liberarsi da' combattimenti singolari; elleno sono armate di un forte ago, e quella che vince può restare una regina dell'alveare. Finalmente si concepisce, che la fabbrica sì dotta, e  
geo-

---

(1) Ibid. mem. 5.

geometrica delle cellule, può non essere, che il semplice risultato dell'organizzazione della pecchia, e del piacere unito a certi esercizi de' suoi organi. Io sono obbligato all'eloquente Autore della *Storia Naturale* dell'esserfi tenuto in guardia contro l'ammirazione, che ispirano le api, e di aver procurato di farsi dell'idee filosofiche del travaglio. Ma se egli l'avesse più studiato, non l'avrebbe affomigliato a quello, che accade ne' piselli, che si fanno bollire in un vaso ben ferrato, e che prendono naturalmente una forma esagona. (1) Questa comparazione, ed ogni altra del medesimo genere, non corrispondono a tutte le condizioni del problema. Le sei facciate delle cellule non sono eguali, ve ne sono due opposte, che sono costantemente più piccole dell'altre. (2) Le dimensioni delle cellule variano in un determinato rapporto alla figura de' vermi, che devono crescervi: e nientemeno sono le medesime pecchie, che fabbricano l'une, e l'altre. Come dunque potrebbe si dire col Sig. di Buffon, *che ogni ape attendendo, come i piselli, ad occupare maggiore spazio possibile in un dato spazio, egli è necessario altresì, poichè il corpo delle pecchie è cilindrico, che le loro cellule sieno esagone, per la medesima ragione degli ostacoli reciproci*? Di più, il fondo di ciascuna cellula è piramidale; egli è formato di tre rombi eguali, e simili: i neutri incominciano a fabbricare questi rombi, e sopra essi innalzano appoco appoco le facciate. (3) Questa opera sovente l'interrompono, e la riprendono; alcuni la sbizzano, altri la digrossano, altri la terminano. Che dirò io di più! Le cellule, che servono di cuna alle regine, hanno una forma, una positura, ed una grandezza diverse.

(1) *Stor. Naturale Gen. ec.* Tom. 4. pag. 99.

(2) *Memorie per servire alla Storia degl' Insetti.* Tom. V. p. 398.

(3) *Ibid.* pag. 395.

verissima da quelle dell'altre cellule. (1) Tutto questo dimostra a sufficienza, che la fabbrica delle fiale delle pecchie non è risultato di una meccanica tanto grossolana, come lo ha pensato il Sig. di Buffon, e che queste mosche .... Ma io mi avvedo, che il piacere di parlare delle api mi ha di già troppo allontanato dal mio soggetto; io mi affretto di ritornarvi.

299. *Diversità notabili tra il maschio, e la femmina in alcune specie. Le farfalle sprovviste di ali. Il verme rilucente. Altro scarafaggio singolare. Li gallinsetti.*

Ordinariamente non vi ha una sproporzione notabile di statura, e di forma tra il maschio, e la femmina: tra' grossi animali una delle diversità più notabili, è quella, che presentano le corna, le zanne, le corna di cervio, la cresta ec. di cui la testa de' maschi è guernita, e che mancano in tutto, o in parte, a quella delle femmine. Negl'insetti, al contrario, non è cosa rara il vedere de' maschi, che differiscono altrettanto dalle loro femmine, quanto possono differire da' generi degli animali; ed ancora dalle classi lontane. Io non parlo delle farfalle, le di cui femmine sono sprovviste di ali, mentrechè i maschi ne hanno di amplissime: (2) nulladimeno vi è già una differenza, che giudicherebbesi molto essenziale, come quella di essere *alato*, o *non alato*. Ma supporrebbe, che un verme condannato a strisciare sopra la terra per tutta la sua vita, dovesse essere fecondato da un animale alato della specie degli scarafaggi? Si comprende, che qui si tratta del *verme rilucente*; la specie di fosforo, che brilla dalla sua parte di dietro, allatta il maschio; egli corre volando, e si unisce a questa femmina straniera con una vera  
copu-

(1) Ibid. memoria 9.

(2) Ibid. Tom. I. memoria 7.

*copula*. Io nomino gli *scarafaggi*; si designano per questa parola tutti gl' *insetti*, che hanno quattro *ali*, due delle quali servono di coperta all'altre, questa coperta è sempre scagliosa. Ve n'è una specie, la di cui femmina tutta carnosa, non ha il minimo segno di ali, e questa femmina ha per maschio un vero scarafaggio, il quale è sì piccolo per rapporto ad essa, che il loro accoppiamento deve sembrare altrettanto singolare, quanto lo sembrerebbe quello di un montone, o di una lepre colla più grossa vacca. (1) Ecoci pertanto un assortimento molto più bizzarro. Si vede nella primavera sopra i rami di molti alberi, e arbusti, e principalmente sopra quelli del *pesco*, delle specie di *galle*, simili a quelle, che crescono comunemente sopra le piante. Il loro esteriore è liscio, e imita perfettamente quello della maggior parte delle galle. Qualche volta ancora egli è leggermente impolverato di un *fiore* simile a quello delle *fusine*, e che dà alla galla l'apparenza di un frutto. Alcune sono sferiche, altre emisferiche, ed altre ellittiche ec. Ve ne sono della grossezza di una piccola ciliegia, altre sono grosse quanto un pisello, ovvero quanto un granello di pepe. Molte sembrano stare attaccate al ramo per un corto picciuolo, come vi stanno tante altre galle. Suppone egli il mio Lettore, che io digrossi la descrizione di un vero animale? Non è così, ma sì ben finto, ch'egli è stato incognito a' bravi Naturalisti. Il Sig. di Reaumur, che ha saputo osservarlo in tutti i suoi stati, gli ha dato il nome di *gallinsetto*, e questo nome è propriissimo a spiegare la sua forma, e la sua natura. (1) Crederebbesi adesso, che questo animale, che si confonde colle galle per la sua forma, e per la sua immobilità,

---

(1) Ibid. Tom. IV. pag. 30.

(1) *Memorie per servire alla Storia degl' Insetti*. Tom. IV, mem. I.

lità, sia fecondato da un piccolissimo, e leggiadriissimo moscherino da due ali bianche, bordate di un bel rosso di carmino, e che si spassa sopra la femmina, come sopra un terreno spazioso? La sua vivezza, e la sua agilità estrema contrastano sì prodigiosamente coll'apparente immobilità, ed insensibilità della femmina, che farebbesi tentato di prenderlo per uno *sehneumone*, che cerchi di depositare le sue uova nella galla. Un piccolo ago, che porta di dietro, e che egli inclina continuamente verso la galla, rinforza ancora il sospetto. Ma questo preteso ago è la parte, che caratterizza il maschio; egli non vuole, che introdurlo in una piccola fessura posta nell'estremità posteriore della femmina, e dopo lunghe passeggiate sopra il dorso di questa, egli arriva a introdurvelo, e ad unirsi a questa massa insensata colla più intima unione. (1) Il parto segue dopo l'accoppiamento, perchè il gallinsetto è *oviparo*, e in quel tempo, ch'egli meno si rassomiglia all'animale, allora è precisamente, che compie le funzioni più essenziali dell'animale, vale a dire, ch'egli si accoppia, e che mette alla luce una numerosa posterità. Non si può dire, che le uova dell'gallinsetto vengano alla luce; appena incominciano a uscire da quella fessura di cui ho parlato, che passano sotto il ventre, dove si mettono in fila. A misura, che il gallinsetto si vota, la pelle del suo ventre si accosta a quella del dorso, e quando il parto è terminato, le due pelli riunite compongono una specie di guscio, che contiene 2., o 3. mila uova. (2) Già il gallinsetto non vive più, e quantunque morto, si prenderebbe per un gallinsetto vivente, tanto poca apparenza di vita vi ha in questo stranio animale. I parti non tardano a nascere per la medesima fessura che aveva dato

---

(1) Ibid. pag. 37. e seg.

(2) Ibid. pag. 14. e 15.

dato il passo alle uova. Questi non sono piccole galle come si vedeva allora; sono piccole membrane ovali, leggermente scanellate, guernite di due antenne, portate sopra sei gambe, e che corrono con una vivezza grande. (1) Eglino si spandono da principio sopra le foglie più sugose della scorza de' rami; ma verso la fine dell'autunno si ritirano sopra la scorza. (2) Vi si fissano, e perdono la facoltà di camminare. Appoco appoco diventano tonde, e rivestono finalmente la forma di una galla. Il corto picciuolo, pel quale questa galla sembra stare attaccata alla scorza, è la tromba, che pone l'insetto in istato di poppare il sugo dell'albero. Tralle piccole membrane ovali ve ne sono alcune, che non arrivano ad acquistare la grossezza delle altre, ed a diventare ritonde. Elle non v'erano chiamate: queste sono quelle, che devono dare i maschi. Si trasformano in *ninfe*, e n'escono dipoi a primavera sotto la forma di *mosca*. (3) Questa mosca non ha nè bocca, nè denti, nè tromba; due occhi sembrano occupare il luogo della bocca. Ella dunque non prende nutrimento alcuno, (4) e tutta la sua vita è consacrata all'amore. Così il maschio del gallinsetto non differisce solamente per la sua forma, e per la sua agilità dalla femmina; egli ne differisce ancora per le sue *metamorfosi*; ma vi è forse un'altrettanto grande metamorfosi come quella, che cangia un insetto piatto, ed agile, in una massa ritonda senza movimento, e quasi senza vita. Per finire di far conoscere i *gallinsetti* a' miei Lettori, aggiugnerò, che quell'insetto tanto formidabile all'*arancio*, e che si chiama *cimice*, è un vero *gallinsetto*. Il *chermes*, che  
la

(1) Ibid. pag. 16. 17.

(2) Ibid. pag. 19. 20. 24.

(3) Ibid. pag. 33.

(4) Ibid. pag. 47.

la medicina, e le arti fanno impiegare utilmente; è ancora esso un gallinsetto, che nasce sopra una piccola quercia verde comune nella Provenza / (1)

300. *Amori del rospo, e parto della femmina. Fecondazione, e parto delle ranochie. Scoperte del Svammerdam, e de' Signori de Mours, e Roefel.*

Passerò io sotto silenzio gli amori del rospo, quell' animale orrido, e che può nulladimanco interessarci per la sua costanza, per la sua pazienza, e per la sua destrezza nel servire di *levatore* alla femmina? Ella è *ovipara*, le sue uova formate di un guscio membranoso sodissimo, sono legate l'une coll'altre da un sodo cordone, come i grani di un rosario. Il serbatojo, che le contiene, o sia l'ovaja, sbocca nel *rectum*, o sia il grosso budello: elle escono dunque per l'ano, mentrechè nelle femmine di quasi tutti gli animali, vi è un'apertura propria del parto delle uova, o della prole. Prova un gran travaglio la femmina del rospo a mandar fuori il primo uovo; ma una volta che sia fatto questo, il restante appartiene al maschio, ed egli incomincia subito le sue funzioni di *levatore*. Salito sopra il dorso della femmina l'abbraccia colle zampe d'avanti, ch'egli tiene applicate sì fortemente sul petto della femmina, che qualche volta vi si forma una infiammazione. Con una delle sue zampe di dietro prende il primo uovo, e l'estremità del cordone; li fa passare tralle sue dita; perchè ha le dita articolate come noi. Egli allunga la zampa, e si sforza per estrarre il secondo uovo. Egli vi riesce, e bentoſto può prendere coll'altra zampa una parte più alta del cordone, e tira fuori un terzo uovo. Si comprende abbastanza, che in ripetendo questo piccolo maneggio, arriva ad estrarre finalmente tutta la filza. Durante l'operazione la femmina sta immobile;

pro-

---

(1) Ibid. pag. 46. e segg.  
TOM. II.

proverà senza dubbio nel suo intero de' movimenti, che ajutano il parto. La presenza dell'osservatore li turba, e gl'inquieta un poco; il maschio getta sopra esso delle occhiate, che provano il suo imbarazzo, e il suo timore. Egli interrompe di tempo in tempo il suo lavoro, e lo riprende dopo con un nuovo ardore. Esso è tanto attaccato alla sua opera che l'Osservatore può azzardare di mettere i due amanti sopra la sua mano: egli ne osserverà meglio tutte le loro procedure, e l'operazione non sarà interrotta, che per alcuni momenti. Il Sig. de Mours, (1) a cui siamo debitori di questa storia interessante, non ha trascurato niente per assicurarsi, se il maschio innaffiava l'uova col suo *sperma*, nel tempo che l'estraeva, ma l'idea del Svammerdam non ha confermato alcuna delle sue osservazioni. Questo grande Osservatore pensava, che la fecondazione si operasse nelle *ranocchie*, della medesima maniera, che si opera ne' *pesci*. Secondo esso, (2) i vasi *deferenti* sboccano nel *rectum*, e il maschio fa uscire per l'ano il liquore, che spande sopra le uova, e che le feconda. Le uova si staccano dall'*ovaja*, posta sopra la *matrice*; elle si spandono nel basso ventre; entrano dopo nelle *trombe*, che sono come raggomitolate, e la lunghezza delle quali è di due piedi. Esse scorrono tutto questo spazio, ed arrivano finalmente nella matrice. Questa sbocca nel grosso budello, e l'uova escono per l'ano. Il maschio ajuta il parto, ed in comprimendo fortemente il ventre della femmina, e ricorrendo ad altre opere. Ma egli mostra minor destrezza assai del rospo. Invero una maggior destrezza quì sarebbe superflua; poichè la ranocchia prontissimamente si sgrava di tutte le sue uova. Nel tempo ch'escono, il maschio avviticchiato

(1) Storia dell'Accademia Reale delle Scienze. Anno 1741.

(2) Biblia Naturæ pag. 789.

chiato sopra la femmina, le innaffia col suo liquore; ed esso non abbandona la femmina se non dopo terminato il parto, e dopo averla tenuta abbracciata 40. giorni continui. Ecco un leggiero dettaglio delle osservazioni del Svammerdam. Il Sig. Roesel, che ha date prove della sua sagacità, e de' suoi rari talenti nella sua magnifica storia delle ranocchie: (1) ha pescate le sue ricerche molto più al fondo dell'Osservatore Olandese. Quest'ultimo avea scoperto nel maschio de' testicoli situati presso a' reni delle vescicole *feminali*, e de' vasi *deferenti*, che esso credeva, come ho detto sboccate nel *rectum*; ma non avea scoperta nessuna parte esterna della generazione. Questa scoperta era riservata al Sig. Roesel: (2) portando egli la sua attenzione sopra le vescicole *feminali*, restò sorpreso per non trovar loro alcuna uscita, e considerandole con maggiore attenzione, osservò, che comunicavano con un piccolo corpo lunghetto, e carnosò, collocato al basso, e al di fuori del *rectum*, e fatto in forma di *papilla*. Avendo dopo introdotta dell'aria nelle vescicole, vide alzarsi questa *papilla*, ed allora gli fu facile inserire nella sua estremità una setola di porco, che penetrando nella vescicula gli dimostrò la comunicazione, che cercava. Bisogna consultare nel luogo citato la Figura Prima della Tavola VI., che mette tutto questo in una chiarezza grande. Il Sig. Roesel non dubita dunque, che la *papilla*, di cui si tratta, non sia la parte, che caratterizza il maschio. Io posso confermare il testimonio di questo Autore, con quello del mio illustre confratello il Sig. de Haller, che ha studiato molto sopra le ranocchie, e con que' medesimi occhi, a' quali noi siamo debitori di tante cose  
inte-

(1) *Historia Naturalis Ranarum*, ec. Norimbergæ 1758. Arricchita di bellissime figure colorate, in foglio.

(2) Ibid. pag. 26. *Rana fusca terrestris*.

interessanti sopra il pollo, egli mi scrivea, che il maschio della ranocchia ha un pene visibilissimo, e che egli l'avea veduto soventi volte. Sarebbe desiderabile, che il Sig. Roesel avesse veduta questa parte in funzione: ma confessa egli medesimo di non esservi potuto arrivare. Egli riporta d'altronde molte osservazioni sopra la fecondazione, che sono appoggiate all'idea del Svammerdam. Trattando della ranocchia verde acquatica, il Sig. Roesel dice espressamente, (1) che il maschio sale sopra il dorso della femmina, spande il suo liquore sopra le uova, ed aggiunge, ch'egli ha osservato questo fatto più d'una volta. Egli l'ha mirabilmente espresso nella Figura 2. della Tavola XIII. Le uova del rospo sono fecondate nella medesima maniera. Il rospo acquatico, (2) avviticchiato sopra la sua femmina, ritiene le uova tralle sue zampe di dietro, fintantochè le abbia innaffiate col suo liquore seminale, e nel tempo, che le innaffia fa i medesimi movimenti, che fa il cane nel coito. Le uova formano una filza di due piedi di lunghezza incirca. Dappoichè il maschio ha fecondate le uova comprese nella estensione di un pollice, lascia questa porzione della filza, e ne prende un'altra colle sue zampe, la quale similmente innaffia. Consultate le Figure 1. 2. della Tavola XVII. Il rospo terrestre (3) fa i medesimi movimenti nel coito, che il rospo acquatico. Sembra, ch'esso voglia estrarre a forza l'uova dal corpo della femmina: egli non fa questo, ma le raduna, e le mette in un monte, come se fosse sua intenzione d'innaffiarle tutte più facilmente, e più presto. L'Autore ha veduto aprirsi l'anotrasversalmente,

(1) Ibid. pag. 56. 57. *Rana viridis aquatica*.

(2) Ibid. pag. 75. *Bufo aquaticus alium vedolens*.

(3) Ibid. pag. 90. *Bufo terrestris, dorso tuberculis exasperato, oculis rubris*.

te, e lasciare uscire una goccia di liquore torbido, che si spandeva sopra le uova. Accade soventi volte, che non tutte le uova sono innaffiate dal liquore, che somministra il maschio, e quelle che non lo sono rimangono sterili, elle *colano*, come dice il Sig. Roefel, (1) e si corrompono, senza produrre altra cosa, che una fermentazione, che nuoce a'feti contenuti nelle uova feconde.

301. *Gli animali ermafroditi. Il verme di terra. La lumaca. Alcune specie di conchiglie. Scoperte del Sig. Adanson.*

I vermi di terra, le lumache, le chiocciolè, molte specie di conchiglie hanno i due sessi nel medesimo tempo, e quello, che confonde tutti i nostri raziocinj, è che l'individuo non può niente meno fecondare se medesimo. Bisogna, che due individui, che sono nel medesimo tempo, e maschi, e femmine, si congiungano per produrre altri individui della loro specie. Nella testa, e nella parte anteriore dell'animale, sono gli organi della generazione. Nella *chiocciola* terrestre, bisogna cercarli tra le due *corna* dalla parte destra. Allorchè li due individui vogliono congiungersi, si accostano l'uno all'altro la testa, ed il collo, e s'intralciano subito con due *cordoni* lunghi carnosì, che essi fanno uscire dal loro interiore. Io lascio dipingere i loro amori all'Autore voluttuoso della *Venere Fisica*, e di trarne delle conseguenze proporzionate a queste pitture. (2) Nessuno avanti Il Sig. Adanson, dell'Accademia Reale delle Scienze, avea studiate le *conchiglie*, come richiedevano essere studiate. Noi siamo debitori al suo coraggio quasi eroico, alla sua sagacità, a' suoi talenti, di un'eccellente Storia

(1) Ibid. pag. 93.

(2) *Venere Fisica*. Cap. XI. pag. 78. e segg.

ria Naturale di Senega , ( 1 ) ch'egli pubblicò nel 1757., e nella quale si trova una descrizione minuta di un grandissimo numero di *conchiglie*, disegnate con esattezza , o con gusto , e distribuite secondo un nuovo metodo, frutto delle replicate osservazioni di uno spirito veramente filosofico. Considerando le *conchiglie* relativamente al  *Sesso* , il Sig. Adanson le divide in quattro classi . ( 2 ) Pone nella prima quelle , il sesso delle quali è *diviso* , e tralle quali si trovano degl'individui *maschi* , e degl'individui *femmine* ; la *porpora* n'è un esempio. Il maschio lascia uscire di tempo in tempo, dalla parte destra , una linguetta triangolare , e piana , che costituisce il sesso . ( 3 ) La seconda classe contiene le *conchiglie*, che l'Autore crede *secondarsi di per se medesime* , o *nella quale non si vede* , dic'egli *alcuna delle parti della generazione, nè alcuno accoppiamento*. ( 4 ) Tali sono le *conche* , delle quali l'*ostrica* è una specie ; io farò nientedimeno osservare , che l'Autore non ha nessuna esperienza diretta sopra questo soggetto ; per l'unica via del raziocinio egli ne inferisce , che l'*ostriche* si *secondino di per se medesime* . E necessario, che io porti le sue proprie parole . „ Al-  
 „ cuni moderni , dic'egli , hanno assicurato , che si  
 „ distinguono l'*ostriche* maschi dalle *femmine* : nul-  
 „ ladimeno è certo , che la maggior parte di questi  
 „ animali , che vivono lontani gli uni dagli altri ,  
 „ e nell'impotenza di congiungersi per la copula ,  
 „ generano loro simili : donde si può concludere ,  
 „ che

---

( 1 ) *Storia Naturale di Senega . Conchiglie , colla compendiosa relazione di un viaggio fatto in quel paese negli anni 1749. 50. 51. 52. e 53. Opera adornata di figure . A Parigi presso Claudio Giambattista Rauche , Quai des Aug. 1757. in quarto.*

( 2 ) Ibid. pag. 57. *Della definizione delle parti.*

( 3 ) Ibid. pag. 103. *Della descrizione delle conchiglie.*

( 4 ) Ibid. pag. 57. *Della def. delle parti.*

„ che non hanno bisogno di sesso alcuno per ripro-  
 „ dursi, o che ogn'individuo gli ha tutti e due. „  
 (1) La terza classe comprende le conchiglie, che  
 hanno i due sessi insieme, ma che non possono fe-  
 condarsi di per se medesime. La *chiocciola* comune  
 n'è un esempio. (2) La quarta classe ci offerisce  
 un tratto nuovo, e molto sorprendente della diver-  
 sità de' mezzi scelti dalla Sapienza Divina per la  
 propagazione della specie. Le conchiglie, che ap-  
 partengono a questa classe, hanno i due sessi insie-  
 me; ma due individui non possono reciprocamente  
 fecondarsi, e nel medesimo tempo, come le chioc-  
 cioline. La situazione svantaggiosa delle parti sensuali  
 vi si oppone. Ciascuna parte ha la sua apertura pro-  
 pria; una è posta all'origine delle corna, l'altra è  
 molto di sotto. (3) Ma questo fatto è sì nuovo, e  
 sì particolare, che temendo di non riportarlo con  
 tutta l'esattezza, trascriverò qui tutto il passo; ec-  
 co com'egli si spiega, (4) „ La quarta classe è di  
 „ quelli, che hanno i due sessi insieme; hanno bi-  
 „ sogno di salire, gli uni sopra gli altri per l'accop-  
 „ piamento, a ragione della svantaggiosa situazio-  
 „ ne de' loro organi. Tale è l'ermafroditismo del  
 „ *bulino*; e del *coret*: se un individuo fa, rispetto  
 „ all'altro, la funzione del maschio, questo maschio  
 „ non si può essere fecondato nel medesimo tempo  
 „ dalla sua femmina, quantunque ermafrodita; egli  
 „ non lo può essere se non da un terzo individuo,  
 „ che si metta sopra esso verso la parte, in qua-  
 „ lità di maschio. Per questo si vede spesso un  
 „ gran numero di questi animali accoppiati in fila,  
 „ gli uni alla coda degli altri. Il solo vantaggio „  
 „ che

(1) Ibid. pag. 199. *Della descriz. delle conchiglie.*

(2) Ibid. pag. 57. *Della def. delle parti.*

(3) Ibid. pag. 58.

(4) Ibid. pag. 57.

„ che questa specie di ermafroditi ha sopra le chio-  
 „ ciole , il sesso delle quali è diviso , è di poter  
 „ fecondare come un maschio un secondo indivi-  
 „ duo , e di esser fecondato nel medesimo tempo  
 „ come femmina da un terzo individuo . „ Così ,  
 „ come l'osserva (1) benissimo il nostro dotto Natu-  
 „ ralista ; „ non mancherebbe altro alle conchiglie ,  
 „ per riunire tutte le specie dell'ermafroditismo ,  
 „ che di potersi accoppiare a loro medesime , ed  
 „ essere nel medesimo tempo il padre , e la ma-  
 „ dre del medesimo animale . La cosa , aggiugne  
 „ egli non ha dell'impossibile , poichè molte sono  
 „ provviste de' due organi necessarj , e forse qual-  
 „ che Osservatore vi scoprirà un giorno questa spe-  
 „ cie di generazione .

302. *Che gli ermafroditi , che non possono fecon-  
 dare se medesimi , rendono più dubbiosa l'esistenza de'  
 veri androgini . Nuova ragione di dubitarne . Pro-  
 blema fisico .*

La scoperta di diversi animali , provisti di due  
 sessi alla volta , e che nientemeno non possono fe-  
 condare se medesimi , era molto propria a maggiormen-  
 te persuadere la necessità del concorso de' due indi-  
 vidui per operare la generazione . L'universalità di  
 questa legge ha dovuto sembrare dimostrata , dacchè  
 si è potuto assicurare , che i veri ermafroditi vi erano  
 compresi . In una parola , dice il Sig. di Réaumur ,  
 (2) non è stato accordato a queste specie di ermafro-  
 diti di fecondare se medesimi : de' fatti senza numero  
 hanno confermato una regola , che fino a' nostri giorni non  
 era stata smentita da fatto alcuno assai positivo . Era  
 dunque naturale , che i fisici si rendessero difficilissimi  
 sopra le prove , colle quali si sarebbe tentato di stabi-  
 lire , che vi sono degli animali , che fecondano se mede-  
 simi .

(1) Ibid. pag. 57. e 58.

(2) *Mémoires pour servir à l'Hist. des Insectes*. T. IV. p. 525.

fimi. Celebri Osservatori aveano amMESSA l'esistenza di simili animali, fondati sopra presunzioni molto plausibili, ma tralle specie, ch'essi aveano poste nella classe di questi ermafroditi singolari, se ne sono trovate alcune, nelle quali un Osservatore più esatto avea dopo scoperto de' maschi, e delle femmine, ch'egli avea veduti accoppiarsi. Li *gallinsetti*, de' quali io ho parlato in questo Capitolo, n'erano un esempio rimarcabile. Gl' insetti, che non possono mutar luogo, e che sembrano far colpo colla pianta, dove sono fissati, erano in un caso, che li rassomigliava molto all'*ostriche*, che si credono moltiplicarsi senza accoppiamento. Era dunque ancora una nuova ragione, per dubitare dell'esistenza degli animali, che fecondano se medesimi, ed era un nuovo motivo, per non rendersi, che sopra l'esperienze le più dirette, e le più dimostrative. Simili considerazioni indussero nel 1733. un dotto Naturalista, il Sig. Breynius, a proporre a' Fisici il seguente problema. (1)

### PROBLEMA PHYSICUM.

„ An indubitate demonstrari possit, in rerum natura, genus aliquod animalium verè androgynum, „ idest, quod sine adminiculo maris sui generis, „ ova in, & a se ipso foecundata parere, adeoque „ solum ex, & a se ipso genus suum propagare, „ possit? “

..... *Genus animalium ejusmodi androgynum*, aggiunge il Sig. Breynius, *licet a multis, iisque primi ordinis naturæ consultis statuatur, a nemine tamen, (quod equidem sciam) ita demonstratum fuit, ut non multa, eaque haud levia, ei possint objici dubia.*

303.

---

(1) *Atti dei curiosi della natura*, per l'anno 1733. pag. 18. dell'Appendice.

303. Scoperte dell' Autore sopra i gorgogli. Soluzione del problema fisico. Seguito di generazioni nate da un individuo solo, e loro risultato.

Tal era lo stato della Storia naturale relativamente alla quistione degli *androgini* tanto spesso agitata; e tal era in generale la disposizione degli spiriti, allorchè intrapresi, 21. anni sono, nel Maggio del 1740. la mia prima esperienza sopra i *gorgogli*. Questi insetti tanto fecondi, e le specie de' quali sono tanto numerose, erano dopo lungo tempo nel rangodi quegli animali, che si avea avuto fretta a mettere nella classe de' veri *androgini*, de' quali parla il Sig. Brey-nius: e questa conclusione precipitata non provava altra cosa, se non che i buoni Osservatori possono qualche volta mancare nella Logica. Perchè non aveano mai trovati de' gorgogli accoppiati, con troppa fretta ne aveano concluso, che i gorgogli moltiplicavano senz'accoppiamento. Ciò non era pertanto, che un dubbio, o al più un semplice sospetto; ma questo sospetto, adottandolo il Sig. di Reaumur l'avea accreditato, e nel corredarlo di alcune osservazioni, che gli erano proprie, e che lasciavano sempre la quistione indecisa. (1) La mia prima esperienza la decise, e mi fece vedere, che i gorgogli eranoveri *androgini*. Si è veduto nel Tomo VI. delle *Memorie* del Sig. di Reaumur, (2) e nella Prima parte del mio *Trattato dell' Infettologia*, (3) quali furono le cure, e le precauzioni, con cui tentai questa importante esperienza. Presi un gorgoglio nel momento stesso della sua nascita, e serrato subito nella più perfetta solitudine, vi meste alla luce sotto i miei occhj 95. parti. Io mi affrettai di far parte delle cir-

co-

(1) *Memorie per servire alla Stor. degli Insetti*. Tom. III. Mem. 3. Tom. VI. pag. 532. e segg.

(2) Pag. 530. e segg.

(3) Pag. 26. e segg.

coftanze, e particolarità di quefta efperienza al mio Illuftre amico il Sig. di Reaumur, che la giudicò degna di effer comunicata alla dotta compagnia di cui egli era uno de' primi ornamenti. „ Sicuro, dic' „ egli, (1) del piacere, che le offervazioni del „ Sig. Bonnet apporterebbono all' Accademia, tardai „ poco a leggere ad effa la fua lettera del 13. Lu- „ glio, nella quale erano defcritte, parve a tutta „ l' Accademia, che il Sig. Bonnet aveffe ufate le „ precauzioni, e le diligenze oltre ancora il defi- „ derabile: e benchè ella foffe certa, ch'egli non „ aveffe trascurato niente, per ben offervare tutti „ gli andamenti del fuo gorgoglio, e che egli foffe „ ftato un argo più difficile ad effer ingannato di „ quello della favola, ella giudicava nulladimeno, „ che una fola efperienza, quantunque beniffimo „ fatta, non baftava per levare ogni dubbio, rif- „ guardo ad un fatto contrario ad una legge, la cui „ generalità fembrava ftabilita dall' unanime concor- „ fodi tutti i fatti fin d'allora veduti. Non fi han- „ no, che troppi efempj di circonftanze, che fono „ fcappate a degli occhj perfpicaci, ed attenti. L' „ Accademia non potette dunque difpenfarfi dal defi- „ derare, che la medefima efperienza foffe ripetuta „ dal Sig. Bonnet molte volte, e fopra più gor- „ gogli di diverfe fpecie, che gli foffe poffibile; „ io fui incaricato di pregarnelo da fua parte, e lo „ feci. „ Io non potendo dunque mancare di corris- „ pondere al defiderio dell' Accademia, ripetei la mia „ prima efperienza fopra la medefima fpezie di gorgo- „ gli, e l'eftefi nel medefimo tempo a molte altre fpe- „ zie, (2) fempres col medefimo fucceffo; tutti i gor- „ gogli nati in folitudine, dopo l'iftante della loro  
na-

---

(1) Ibid. Tom. VI. pag. 537.

(2) *Trattato dell' Infeftologia ec.* Prima parte. Offervazio-  
ne II. III.

nascitura, divennero madri, e messero alla luce sotto i miei occhj una numerosa posterità. Io arrivai tanto avanti colla mia esattezza, fino a notare nelle Tavole i giorni, e l'ore de' parti di ogni solitario, ed io mi farei dispensato dal pubblicare queste Tavole, se il soggetto, che io trattava, fosse stato meno nuovo, e se io non avessi avute ragioni di presumere, ch'elleno potessero servire ad utili comparazioni. Queste nuove esperienze, fatte con un'attenzione veramente scrupolosa soddisfecero pienamente l'Accademia Reale delle Scienze, e il Sig. de Reaumur; e l'approvazione di cui le onorano, non lasciava luogo di dubitare, che il problema del Sig. Breynius non fosse stato sciolto a sufficienza. Io pensava dunque a lasciare riposare i miei occhj, stanchi dalla sostenuta attenzione, che avevo data a sì piccoli insetti, allorchè un sospetto improvviso, e stranissimo, che mi comunicò il Sig. Trembley, mi obbligò in un seguito di ricerche più penose ancora delle prime. In una lettera, che questo celebre osservatore mi scrisse di Haye il 27. Gennajo 1741. egli si esprimeva così. *Io ho formato il disegno dopo il mese di Novembre di far nascere molte generazioni di seguito di gorgogli solitarij, per vedere, se essi facessero sempre de' figli egualmente. Ne' casi tanto lontani dalle circostanze ordinarie è permesso di tentare tutto. Io tra me dicea, ch'io sa, che un solo accoppiamento non serva a molte generazioni?* Bisogna confessare, che quel *chi sa* era ben gratuito; ma il partito del Sig. Trembley e' fu sufficiente, per persuadermi, che non avessi presa abbastanza da lungi la dimostrazione. L'approvazione di una compagnia rispettabile mi avea reso geloso delle mie prime esperienze, ed essendo io molto giovine ancora, non potevo soffrire, che fossero in qualunque maniera snervate da qualsivoglia, benchè leggierissimo sospetto. Questo sospetto eccitando il mio amor proprio, io mi messi a far nascere in solitudine molte

gene-

generazioni consecutive di gorgogli di diverse specie. Feci nascere così quattro generazioni di una specie, cinque di un'altra, e sei di una terza. (1) Egli era dunque rigorosamente dimostrato con queste nuove esperienze, che se la fecondazione de' gorgogli era dovuta all'accoppiamento segreto, di cui mi parlava il Sig. Trembley, questo accoppiamento serviva almeno per cinque generazioni consecutive. Vi era già un gran prodigio da digerire, che i pronipoti fossero fecondati dal loro quintavolo, ovvero dal loro trisavolo, ed io vedo, che il mio Lettore non esita di ammettere, che i gorgogli si propaghino senza nessuna specie di copula. Io contuttociò non credetti aver fatto assai, per distruggere un semplice sospetto: farebbe stato meglio per gli miei occhj, che non avessi dato loro tanta fatica, non avrei adesso a pentirmi di averli troppo affaticati, e la tenera amicizia del Sig. Trembley non avrebbe a divider meco questi giusti pentimenti. Feci dunque nascere fino alla decima generazione de' gorgogli solitarj, ed ebbi la pazienza, dovrei dire, la follia, di registrare nelle tavole i giorni, e l'ore de' parti di ogni generazione. (2) Mentre scrivo questo ho sotto gli occhj la VI. Osservazione della prima parte del mio *Trattato*, e confesso di non potervi leggere senza maraviglia quello che segue. (3) „ Se malgrado l'esperienze fatte di tanto lontano, come quelle, delle quali attualmente rendo „ conto, non si credeva che si fosse ancora dimostrata la falsità del sospetto indicato nella Osservazione III. farebbe uno sempre forzato a convenire, che l'ammetter meco, che i gorgogli perpetuano la loro specie assolutamente senza accoppiamento „ pia-

---

(1) *Trattato dell'Infestologia*. Prima parte, Osservazione III. IV. V.

(2) *Ibid.* Osserv. VI.

(3) *Ibid.* pag. 100. e 102.

„ piamento , o l'ammettere , che un accoppiamen-  
 „ to serve almeno a nove generazioni consecutive ,  
 „ ciò farebbe l'ammettere una cosa egualmente lon-  
 „ tana dalle regole ordinarie ; se ancora l'ultima  
 „ non lo fosse molto più . Non si creda frattanto ,  
 „ che io dica questo per dispensarmi dal rifare que-  
 „ ste esperienze , e di estenderle a un maggior nu-  
 „ mero di generazioni : chi credesse questo s'ingan-  
 „ narebbe ; poichè il mio disegno è al contrario , di  
 „ approfittarmi delle cognizioni , che ho acquistate  
 „ sopra questa materia , e di maggiormente diluci-  
 „ darla ; io non dispero ancora di arrivare almeno  
 „ a far nascere in solitudine fino alla trentesima ge-  
 „ nerazione di questi piccoli insetti . “ Così ragio-  
 „ nava 18. anni sono , e che animato da questa spe-  
 „ cie di entusiasmo , che suppone ordinatamente ogni  
 „ intrapresa lunga , e difficile , io mi preparava ad  
 „ accumulare prove sopra prove . Mi sembrava non  
 „ aver veduto , che preludj , e stimava quasi niente  
 „ tutto quello , che avea fatto . Riderei adesso di que-  
 „ sto entusiasmo , se le conseguenze fossero state me-  
 „ no moleste , ma io sono debitore ad esse delle *ri-*  
*cerche* sopra le foglie delle piante , e dell'*analisi*  
 delle facoltà dell'anima nostra .

304. *Distinzione reale di sesso tralli gorgogli , e  
 loro accoppiamenti . Osservazione sopra un passo del  
 Sig. di Buffon , relativo a questo soggetto .*

Dopo avere stabilito , sopra tante esperienze ri-  
 petute molte volte colla maggior diligenza possibi-  
 le , che i gorgogli moltiplicavano senza commercio  
 alcuno co' loro simili , io non mi sarei mai aspettato  
 di dover scoprire tra questi insetti , de' maschi , e  
 delle femmine , e di vederle accoppiarsi . La novità ,  
 e la singolarità di questo fatto esigevano necessaria-  
 mente , ch'io entrassi ne' dettagli , che avrei brama-  
 to risparmiar a' miei leggitori . Sono stato dunque ob-  
 bligato ad estendermi sopra gli amori di una specie di  
 gor-

gorgogli. (1) Ne ho descritte le parti *sessuali*, ho raccontate le differenti operazioni del maschio, e della femmina. Io ho provato con molte osservazioni, che il maschio è forse uno de' più ardenti, che vi sia nella natura. Finalmente ho dimostrato, che la medesima specie, nella quale aveo osservata una distinzione reale di sesso, ed un vero accoppiamento, moltiplicavaniente meno senza copula. (2) La maniera, colla quale il Sig. di Buffon accenna tutti questi fatti, è tanto oscura, ed equivoca, che lascerebbe da dubitare a coloro, che non hanno letto il mio libro, se questi fatti sieno stati bene osservati. „ Altri animali, li, dic'egli, (3) come i gorgogli non hanno niente „ di sesso, sono padre, e madre, e generano di per „ se medesimi, e senza copula, quantunque si accop- „ pino altresì quando loro piace, senza poter sapere „ il perchè, o per meglio dire, senza poter sapere, se „ quest'accoppiamento sia una unione di sessi, poichè „ ne sembrano tutti egualmente privi, od egualmente „ provvisti; almeno non si vuol supporre, che la na- „ tura abbia voluto porre nell'individuo di questa pic- „ cola bestia più facoltà per la generazione, che in „ alcun'altra specie di animale, e ch'essa gli avrà ac- „ cordato non solamente la potenza di riprodursi da se „ solo, ma ancora il mezzo di potere altresì moltiplicarsi coll'unione di un altro individuo. “ Se quest'bravo uomo avesse voluto dare maggiore attenzione alla mia opera, egli si sarebbe espresso con maggior chiarezza, ed esattezza. Egli dice da principio, che i gorgogli non hanno nissuno de' sessi, e che generano senza copula. Dopo dice, che si accoppiano, senza poter sapere se questo accoppiamento sia una con-  
giun-

---

(1) Ibid. Osserv. VII.

(2) Ibid. Osserv. XIII. XIV.

(3) Storia Naturale ec. Tom. II. pag. 311. 313.

giunzione de' sessi, poichè ne sembrano tutti egualmente privi, o egualmente provveduti. Finalmente aggiugne, che si accoppiano quando loro piace; questo significa, che possono accoppiarsi in tutti i tempi, ed io farò vedere, che non vi ha che un solo tempo nell'anno, nel quale si possano osservare di questi accoppiamenti. I dotti Autori del Giornale di Trevoux, facendo l'estratto del mio *Trattato dell'Insettologia* mi hanno fatto un rimprovero, che non mi farei mai aspettato; si trattava degli amori de' gorgogli: la descrizione, dicono essi, (1) nella quale egli entra sopra questo, è da uomo istruito. Potrebbe ancora deplorare che riguardo a questo, egli non ha risparmiata abbastanza la saggia delicatezza di molti lettori. Questi miei Signori non avrebbero sospettato, che malgrado questa descrizione di un uomo istruito, si metterebbe un giorno in quistione, se i gorgogli abbiano un sesso, o no; e non sarebbemi mai caduto in pensiero, che scrivendo da Naturalista gli amori di così piccoli insetti, io dovessi offendere la saggia delicatezza di molti de' lettori; molto più dunque l'offendono li scrittori di Notomia, e di Fisiologia.

305. Differenze rimarcabili tra gl'individui della medesima specie nei gorgogli.

Io ho fatta menzione in questo Capitolo di alcune specie d'insetti, il maschio delle quali è alato, mentrechè la femmina non è alata. I gorgogli hanno molto da offerirci in questo genere. Vi sono altresì tra essi de' maschi *alati*, e delle femmine *non alate*; ma vi si trovano ancora de' maschi *non alati*, e delle femmine *alate*. Per togliere ogni equivoco io devo aggiugnere, che i maschi, e le femmine *non alate*, di cui parlo, sono essenzialmente tali, e mai prendono le ali. Fin quì questi maschi *non alati*, non si sono osservati,

---

(1) Marzo 1746, pag. 413.

vati, che tra' nostri gorgogli, ed io non ne ho scoperti, che in una sola specie di questi insetti (1). Vi è ancora una cosa rimarcabile, cioè la grande sproporzione del taglio, ch'è tra' maschi, e le femmine: i primi, e particolarmente i *non alati*, sono piccini, che passeggiano sopra il dorso della femmina, come ho raccontato de' maschi de' *gallinsetti*. Soventi volte, duranti questi spassi, che seguitano del tempo, la femmina sta tanto immobile, come un gallinsetto. Altrettanto ella mostra d'insensibilità, e di freddezza, quanto il maschio mostra di ardore, e di agilità. Egli passa le intere giornate senza prendere nutrimento, tutto è appresso di lui in azione, e tutto occupato nella sua femmina, egli non fa che passeggiare intorno ad essa, e sopra di essa, e non si ferma se non allorchè è stanco.

306. *Che i gorgogli sono vivipari nella primavera, e ovipari verso il finire dell'autunno. Conghietture sopra l'uso de' loro accoppiamenti. Esperienza da tentarsi, per verificare queste conghietture.*

Il mio Leggitore domanda con impazienza, a che serva l'accoppiamento negli insetti, che secondando loro medesimi possono propagarsi senza il suo soccorso? Avanti di rispondere a questo quesito, io richiamerò alla memoria un fatto, che appena ho toccato nell'Articolo 149. ed è una delle maggiori singolarità, che contiene la Storia degl'Insetti. Durante la bella stagione le femmine de' gorgogli mettono alla luce de' parti viventi; elle dunque sono allora *vivipare*: verso la metà dell'autunno, partoriscono delle vere uova; dunque allora elle cessano di essere *vivipare*, e diventano *ovipare*. Io feci questa scoperta nell'autunno del 1740. (2) ch'è stata confermata dopo

(1) *Trattato dell'Insettologia*. Osserv. XV.

(2) *Trattato dell'Insettologia*, I. parte pag. 125. 139. e seguenti.

dopo da eccellenti Osservatori. Io ho dimostrato nel mio Libro, (1) che le femmine fanno variare la loro condotta allorchè hanno da mettere alla luce de' parti viventi, e che hanno a fare delle uova. Ho descritte queste uova, (2) le precauzioni, colle quali sono depositate, ciò che precede, accompagna, e segue dopo il parto. Finalmente dopo avere risguardate queste uova come feti venuti alla luce avanti il tempo, accennai le ragioni, che dopo mi persuasero, che fossero vere uova (3). Io comunicai tutto questo al Sig. de Reaumur, il quale s'ingegnò di renderne conto al Pubblico nel Tomo VI. delle sue *Memorie* pag. 556. e seguenti. Egli preferì di adottare la prima mia conghiettura: egli credette dover prendere per semplici feti que' piccoli corpi lunghi, che avevo veduti depositare con tante precauzioni, e l'esteriore de' quali era tanto simile a quello di un uovo d'insetto. Troppo pieno di questa idea il nostro illustre Accademico, formò una conghiettura sopra l'uso dell'accoppiamento, ch'è dovuta sembrare molto strana, e ch'egli espone alla pag. 552. Egli pensò, che l'accoppiamento non servisse forse, che ad ajutare le madri a sgravarsi da questi pretesi aborti, che le farebbono morire nell'inverno, corrompendosi nella loro matrice. Ma una osservazione interessante, che ancora non era stata fatta, allorchè il Sig. de Reaumur componeva il VI. volume delle sue *Memorie*, mi dispensa dal rifiutare la sua conghiettura. Io non avevo potuto cessare di risguardare questi corpi lunghi, che come vere uova, come infatti sono, poichè il Sig. Lyonnet avea veduto nascere da essi nel mese di Aprile del 1743. de' piccoli gorgogli viventi. E dacchè il Sig. Trembley

---

(1) Ibid. pag. 141. e segg.

(2) Ibid. pag. 139. 148. 152. 158.

(3) Ibid. Osserv. IX.

bley ha Istruito il Pubblico nella Prefazione della sua Storia de' Polipi: egli aggiunge ancora, *che il Sig. Lyonnet gli ha fatto vedere un pulcino, che usciva dall'uovo.* Se il testimonio di simili Osservatori esigesse di esser confermato, io direi di avere altresì osservato de' piccoli gorgogli, che erano usciti dalle uova, le quali aveo ferrate in una scatola alla fine di Novembre del 1743. (1). Del resto, questi gorgogli erano molto più piccoli di quelli, che nascono viventi, e la piccolezza delle uova me l'avea di già annunziato. Il Sig. de Geer dell' Accademia di Svezia, la di cui sagacità ed esattezza brilla nelle sue belle Memorie, ch'egli ci ha date sopra gl' insetti, ha verificata una parte di questi fatti, ed io riporterò qui l'estratto di una lettera, ch'egli mi scrisse di Stokolm li 24. di Agosto del 1759. *Tutte le specie di gorgogli, che io ho osservate, siano d'alberi, o sieno di erbe, mi hanno fatto vedere de' maschi, e degli accoppiamenti; le femmine hanno sempre partorite delle uova, destinate a conservare la specie nell'inverno. Io dunque oso credere, che sia così di tutti i gorgogli. Nell'avvicinarsi l'inverno le femmine de' gorgogli partoriscono delle uova, e verso questo tempo presso appoco i maschi incominciano a comparire. Vi ha dunque un rapporto segreto tra l'apparizione de' maschi, ed il parto. Questo rapporto noi cerchiamo, e deve contenere la ragione dell'accoppiamento. In qualunque stagione, che si apra il ventre di una femmina, vi si trovano delle uova, e de' parti vicini a nascere. I parti de' vivipari nascono nel ventre della loro madre, i parti degli ovipari nascono dopo esserne usciti. I parti de' vivipari prendono dunque nel ventre della loro madre, un accrescimento, che non vi prendono quelli degli ovipari. I gorgogli, che nascono viventi, si sviluppano dunque fino ad un certo*  

pun-

---

(1) Ibid. Osser. XIX.

punto, avanti di venire alla luce; quelli, che nascono ferrati nelle uova non devono svilupparsi tanto presto. Eglino erano destinati a conservare la spezie nell'inverno, e non doveano nascere, che al ritorno della stagione propria a procurar loro il nutrimento. Ma lo sviluppamento suppone la nutrizione; i gorgogli, che nascono viventi, hanno dunque ricevuto nel ventre della loro madre un nutrimento, che non hanno potuto ricevervi quelli, che restano ferrati nelle uova: questo nutrimento ha operato ne' primi uno sviluppamento, che non ha potuto operarfi ne' secondi. L'accoppiamento non avrebb' egli per fine principale di supplire in questi, a sì fatto difetto di nutrimento? Il liquor seminale, che somministra il maschio non sarebb' egli destinato a rimpiazzare i succhi, che il germe non ha potuti trarre dalla madre? Questa non è, che una semplice conghietura, ma non è destituita di verisimiglianza. Sarebbe facile il verificarla, privando di maschi un certo numero di femmine: uno si assicurerebbe con questa esperienza, se le uova, che esse partorissero, fossero feconde (1). Così malgrado tutta l'attenzione, che si è data a' gorgogli, non sono stati ancora studiati abbastanza, e la loro storia ci presenta de' fatti interessanti, che restano da schiarirsi. Quelli, sopra i quali adesso non v' ha più dubbio, perchè sono stati contestati con un lungo seguito di esperienze, e di osservazioni, sono molto proprj, come lo dice il Sig. di Reaumur, (2) a giustificare il tempo impiegato nell'osservare i più piccoli insetti.

307. *Che i polipi non hanno distinzione di sessi, e che sono veri androgini.*

In un tronco di verme, in un tronco di polipo, la

(1) Vedi ciò, che ho detto nella prima parte dell' *Insettologia* pag. 175. e segg. e pag. 202. 203.

(2) *Memorie sopra gli Insetti* Tom. VI. pag. 524.

la produzione di una nuova testa, di una nuova coda, non sembra dipendere da una fecondazione per accoppiamento; siccome le diverse produzioni di un insetto non sembrano dipendere dal concorso della terra degli stami. Così la produzione de' polloni di un polipo, siccome quella de' rami di un albero, non sembrano maggiormente supporre questa specie di fecondazione. Era dunque molto naturale il presumere, che i *polipi* d'acqua dolce moltiplicavano senz'accoppiamento; il Sig. Trembley, che gli ha osservati con tanta diligenza, ed attenzione, assicura altresì di non averli veduti giammai accoppiarsi, e per molte ricerche, ch'egli abbia fatte, non ha scoperto niente, che indicasse tra essi alcuna specie di *copula*. Ci dà egli medesimo, in poche parole, il risultato di tutte le sue ricerche, che io non posso dispensarmi dal metterle qui sotto gli occhi del mio Leggitore.

„ Si può concludere, dic'egli, (1) dalle mie esperienze sopra il principio della fecondità de' polipi:

„ Primo: che un piccolo polipo dappoichè è separato da sua madre, non ha bisogno della compagnia di un altro polipo per moltiplicarsi. Secondo: che ancora avanti di separarsene, egli ha il principio della fecondità, poichè da lì in poi moltiplica. Terzo: che se è la madre che gli comunica questo principio nel tempo, che è ad essa unito, questo non prova, che non v'abbia alcuna comunicazione tralla testa, e le branche di questa madre, ovvero tralla testa, e le branche di un piccolo polipo. Quarto: che non è maggiormente fecondato in questa maniera da un altro piccolo, ch'esce dalla stessa madre nel medesimo tempo ch'esce esso. Quinto: che se esso si feconda di per se medesimo, è molto verisimile, „ che

---

(1) *Memorie sopra i polipi*, Tom. 2, in 8. pag. 91. 92.

„ che ciò segua di una maniera impercettibile “. Non solamente i polipi sembrano essere veri *androgini*, ma sembrano ancora assolutamente privi de' sessi. Coll' ajuto de' migliori microscopj non si è scoperto niente, che si rassomigliasse in nessuna maniera alle parti *sessuali*. Io l'ho detto, e ripetuto molte volte: tutto il corpo del polipo è una specie di budello; le cui pareti sono guernite interiormente di una moltitudine di piccoli grani. Questo budello tiene da una delle sue estremità una testa, e delle branche; l'estremità opposta, che termina in punta, è del tutto ferrata, e l'insetto non se ne serve, che per fermarsi a qualche appoggio. Se dunque i polipi sono veri *androgini*; e come dubitarne? Questi però sono *androgini* molto differenti da quelli, che ci hanno fatti vedere i gorgogli; poichè io ho provato, che i gorgogli sono distinti di sesso; che si accoppiano, e che nientemeno possono fecondare se medesimi.

308. *Insetti privi di sesso per una gran parte della loro vita.*

Vi ha una classe numerosissima di animali, che sono onninamente sprovvisti de' sessi per la maggior parte della loro vita; tali sono tutti gl'insetti, che si trasformano. Mentrecchè l'insetto è sotto la forma di *verme*, o sotto quella di bruco, egli allora non è, a propriamente parlare, nè maschio, nè femmina; ma farà maschio, o femmina allorchè avrà prela la sua ultima forma, vale a dire, quella di *mosca*, o di *farfalla*. Sotto questa ultima forma l'insetto è chiamato a perpetuare la specie. Io ho provato nel Capit. X. del Tomo I. che le parti proprie della *farfalla*, sono contenute originalmente in quelle, che costituiscono lo stato del *bruco*. Aggiugnerò quì, che la farfalla prende tutto il suo accrescimento sotto la forma di bruco. Vi sono ancora delle specie, che non prendono, e non possono prendere sorta alcuna di nutrimento se non sotto la loro prima forma: dacchè

chè l'insetto è divenuto mosca, o farfalla, egli non ha più bisogno di nutrirsi; egli ha fatto, per così dire, la sua provvisione di alimenti nel tempo, ch'egli era verme, o bruco; e questo tanto è vero, quanto egli è destituito, sotto la sua ultima forma, di tutti gli organi esteriori spettanti alla nutrizione.

309. *Confutazione del sentimento del Sig. de Buffon sopra le metamorfosi degli insetti.*

Nel secondo Volume della Storia Naturale, il Sig. de Buffon ha inserito un Capitolo, il quale è molto simile a questo, e ch'egli ha intitolato *Varietà nella generazione degli animali*. Egli vi fa menzione degli insetti, che non hanno sesso nissuno per una gran parte della loro vita, e la sua maniera di ragionare sopra questo soggetto è tanto lontana dalle idee ricevute, che il mio Lettore mi perdonerà, se io trascrivo qui tutto il passo. „ Io voglio parlare, dice egli, (1) degl' insetti, e delle loro metamorfosi. „ Mi pare, che questo cangiamento, questa specie di „ trasformazione, che loro accade, non sia, che una „ nuova produzione, che dà loro la potenza di generare; mediante questa produzione gli organi della generazione si sviluppano, e si mettono in istato di potere operare, poichè avanti, che l'anima le si trasformi, già è cresciuto abbastanza; egli cessa allora di prendere del nutrimento, ed il corpo sotto questa prima forma non possiede organo alcuno per la generazione, nè alcun mezzo di trasformare questo nutrimento, di cui questi animali hanno una quantità abbondevolissima in uova, ed in liquore seminale; e dappoichè questa quantità soprabbondante di nutrimento, ch'è maggiore, negl' insetti, che in qualunque altro animale, si forma, e si unisce tutta insieme, da primo sotto „ una

(1) Pag. 315. 316.

„ una forma, che dipende molto da quella dell'ani-  
„ male medesimo, e che vi si rassomiglia in parte,  
„ il bruco diventa farfalla; poichè non avendo al-  
„ cun organo, nissuna viscera capace di contenere il  
„ superfluo del nutrimento, e non potendo per con-  
„ seguenza produrre de' piccoli esseri organizzati si-  
„ mili al grande, questo nutrimento organico, sem-  
„ pre attivo prende un'altra forma, congiungendosi  
„ del tutto secondo le combinazioni, che risultano  
„ dalla figura del bruco, ed esso forma una farfal-  
„ la, la cui figura corrisponde in parte, ed anco-  
„ ra per la costituzione essenziale, a quella del  
„ bruco; ma in essa gli organi della generazione  
„ sono sviluppati, e possono ricevere, e trasmet-  
„ tere le parti organiche del nutrimento, che for-  
„ mano le uova, e gl'individui della specie, che  
„ devono in una parola operare la generazione; e  
„ gl'individui, che procedono dalla farfalla non de-  
„ vono essere farfalle, ma bruchi; poichè infatti il  
„ bruco è quegli, che ha preso il nutrimento, e che  
„ le parti organiche di questo nutrimento si sono  
„ assomigliate alla forma del bruco, e non a quella  
„ della farfalla, che non è, se non una produzione  
„ accidentale di questo medesimo nutrimento so-  
„ prabbondante, che precede la real produzione de-  
„ gli animali di questa specie, e che non è, se non  
„ un mezzo, del quale si serve la natura per ar-  
„ rivarvi “. Con dispiacere correggo questo Auto-  
„ re, di cui ammiro il gusto, e i talenti: ma io devo  
„ premunire i miei Lettori contro l'impressione troppo  
„ ordinaria di una gran celebrità. Egli medesimo con-  
„ fessa in parte, (1) che la sua teoria ha precedute le  
„ sue esperienze, e s'isa, quanto la maniera di vedere  
„ dipenda dal modo di pensare. Si vede nel passo, che  
„ io

---

(1) *Stor. Naturale*, Tom. 2. pag. 168.

lo ho citato, il principio favorito dell'Autore; onde mi sia permesso di farne una breve confutazione, opponendo semplicemente la natura al suo Storico, e questi a se medesimo. *Mi pare, dice'egli, che questa trasformazione, che accade agl'insetti, non sia, che una nuova produzione, che dà loro la potenza di generare.* Le osservazioni del Svammerdam, sopra la preesistenza della farfalla nel bruco, (1) e quelle del Sig. de Haller, sopra la formazione del pollo nell'uovo, (2) dimostrano abbastanza, che non si fa nessuna produzione nuova; ma quello che ci sembra prodotto già esisteva, e non ha fatto, che svilupparsi. Tutto questo libro è pieno di fatti, che concorrono a stabilire questa verità. *Il bruco diventa farfalla, perchè non avendo alcun organo, nessuna viscera capace di contenere il superfluo del nutrimento, e non potendo per conseguenza produrre de' piccoli esseri organizzati simili al grande, questo nutrimento organico, sempre attivo, prende un'altra forma, congiungendosi del tutto secondo le combinazioni risultanti dalla figura del bruco, ed essa forma una farfalla, la cui figura corrisponde in parte, ed ancora per la costituzione essenziale, a quella del bruco.* Il nostro Autore ammette dunque espressamente, che le molecole organiche del bruco, combinandosi sotto certi rapporti, formino la farfalla. Ma secondo i principj di questo Autore, le molecole organiche non formano un tutto organizzato, se non allorchè elleno sono state disegnate nel corpo, dove questo tutto deve formarsi, e crescere. Io non attendo quì a confutare l'esistenza, più che dubbiosa de' modelli interiori; anzi suppongo ch'esistano. Il corpo del bruco è dunque il modello, secondo il quale si formano le diverse parti proprie della farfalla. Adesso io domando quali  
siano

---

(1) Vedi il Cap. X. del Tom. I.

(2) Vedi il Cap. IX. Tom. I.

fiano le parti del bruco, che possono disegnare le quattro ali della farfalla, le sue migliaja d'occhi, la sua tromba, e soprattutto gli organi della generazione? Egli è certissimo, che il bruco è privo del tutto della maggior parte di questi organi, e che i suoi sei occhi non si rassomigliano punto a quelli della farfalla. Il Sig. de Buffon sembra voler prevenire questa obbiezione, quando aggiugne che la *figura della farfalla corrisponde in parte e ancora per la costituzione essenziale a quella del bruco*; questo è un ricondurre i fatti a forza sotto un sistema prediletto. Se si paragona la struttura del bruco a quella della farfalla, io oso assicurare, che vi si troverà maggior dissimilitudine, di quel che sia la similitudine. Ma quando non vi fosse nella farfalla, che un solo organo, il quale non esisteva nel bruco, non sarebbe a sufficienza per distruggere il mal fondato sistema dell' Autore. Sarebbesi sempre in diritto di domandare dove risedesse il modello di quest'organo? *Gl'individui, che nascono dalla farfalla non devono essere farfalle, ma bruchi, poichè infatti è il bruco, che ha preso il nutrimento, e le parti organiche di questo nutrimento si sono assimilate alla forma del bruco, e non a quella della farfalla.* Un momento fa l'Autore avea bisogno di ammettere, che la forma del bruco non differisce quasi niente da quella della farfalla; adesso che si tratta di spiegare perchè la farfalla non faccia delle farfalle, egli ne apporta per ragione; *che il bruco, che ha preso il nutrimento, e che le parti organiche di questo nutrimento si sono assimilate alla forma del bruco, e non a quella della farfalla.* Qui l'Autore è d' accordo co' suoi principj; è il bruco che modifica; egli non può dunque modificare, che de' bruchi: intanto egli faceva modificare una farfalla. Io direi qualche cosa di più: vi sono delle spezie di farfalle, che prendono nutrimento; elleno poppano il sugo de' fiori; questo nutrimento è abbondante, secondo il Sig. de Buffon, in mole-

molecole organiche: il corpo della farfalla se le assimila, ed il superfluo lo manda agli organi della generazione, serbatojo comune di tutte queste molecole. Come dunque può essere ch' elleno vi rappresentino in piccolode' bruchi, e non delle farfalle? *La farfalla non è, che una produzione accidentale di questo medesimo nutrimento soprabbondante, che precede la produzione reale degli animali di questa spezie, e che non è se non un mezzo, che la natura impiega per arrivarvi.* La cosa più costante, la più invariabile del Mondo, è ella una cosa *accidentale*? Lo stato della farfalla succederà sempre a quello del bruco. Il primo è il termine . . . . ma mi avvedo, che l'Autore distingue quì due sorti di produzioni; una *accidentale*, ch'è quella della farfalla nel bruco, e l'altra *reale*, ch'è quella, che si opera mediante le uova, che partorisce la farfalla. Io lascio al Lettore il giudicare se questa distinzione sia Filosofica. Prego, che si rilegga quello, che ho detto sopra le *metamorfosi* nel Capitolo X. del Tomo I., e si ammetterà con preferenza, che il bruco, e la farfalla non sono realmente, che il medesimo animale, chiamato a rivestire diverse forme. Il bruco è in qualche maniera rispetto alla farfalla, ciò ch'è l'uovo rispetto al pollo. La farfalla partorisce delle uova, ed ogni uovo contiene un piccolo bruco, che contiene esso medesimo tutti gli organi proprj alla farfalla, e di cui egli procurerà un giorno lo sviluppo. Ecco ciò che un esame attento, e imparziale de' fatti, ci scuopre, e ciò che avrebbe scoperto il Sig. de Buffon, s'egli avesse consultata più la natura, che la sua immaginazione. Ella è bella, e ricca, ma lo è molto più la natura.

310. *Confutazione dell'opinione del medesimo Autore sopra la generazione de' bachi ne' bambini, e sopra le generazioni equivoehe.*

Del resto, io non ho detto niente dell'oscurità, e dell'imbarazzo, che regnano in tutto questo passo:

io mi sono limitato ad esaminarlo, e a procurare d' intenderlo. Questo passo non è il solo, nel quale l' Autore abbia offeso la buona fisica; eccone un' altro sopra la generazione de' bachi ne' bambini; che io non ho potuto leggere senza sorpresa. „ Il latte, dic' „ egli, (1) è una specie di chilo, un nutrimento de- „ purato, che contiene per conseguenza maggior nu- „ trimento reale, maggior quantità di quella materia „ organica, e produttiva, di cui noi abbiamo parla- „ to, e la quale allorchè non è digerita dallo sto- „ maco del bambino per servire di suo nutrimento, „ e all' accrescimento del suo corpo, prende per l' „ attività che gli è essenziale, altre forme, e pro- „ duce degli esseri animati, de' bachi in quantità sì „ grande, che il bambino si riduce spesso in pericolo „ della vita “. Osservate che il Sig. de Buffon, non dice, che il latte non digerito cagioni lo sviluppa- mento de' bachi; ma che questa materia *prende per l' attività, che gli è essenziale dell' altre forme, e produce degli esseri animati, de' vermi*. Io opporrò di nuo- vo il nostro Autore a se medesimo. Ne' suoi princi- pj, le molecole organiche, viventi, attive, sono co- muni al vegetale, e all' animale. Elleno possono egual- mente produrre una pianta, o un animale, etale o tal pianta, tale, o tale animale. Allorchè elleno dunque producono una certa, e determinata specie di animale più tosto, che ogn' altra, ch' elleno potreb- bono egualmente produrre, bisogna assegnare una ra- gione. Questa ragione non può essere nell' *attività delle molecole*, poichè secondo l' Autore, quest' at- tività si estende indifferentemente a tutte le specie, o vegetabili, o animali. Qual è dunque la ragione che determina le molecole organiche a formare un verme, e non una pianta, un verme *rotondo*, e non un

---

(1) *Storia Naturale* Tom. II. pag. 469. e 470.

un verme piatto? Per ragionare conseguentemente al sistema dell'Autore, bisognerebbe rispondere, che sono i *modelli interiori*, che determinano l'*attività* delle molecole a prendere una determinata forma, più tosto che un'altra. Ma dove farà nel bambino il modello di un verme *rotondo*, o quello di un verme *piatto*? Io ho dimostrato nella mia Dissertazione sopra la *tenia* quanto la struttura di questo verme sia regolare, e costante: quella degl'altri vermi del corpo umano non lo è meno. Un Fifico, che non sapesse la vera origine de' vermi del naso de' montoni, gli si concederebbe forse, s'egli asserisse, che sono prodotti dalle molecole della pituita? Gli si farebbe vedere la mosca, che passa pe' condotti del naso, e va a partorire le uova ne' suoi frontali, donde escono questi vermi (1). Noi dobbiamo perdonare agli antichi la loro dottrina delle *generazioni equivoche*, perchè essi non erano istruiti; ma che giudizio dobbiamo noi formare di un dotto del decimottavo secolo, che la risuscita? E non credasi, che io carichi troppo le idee del Sig. de Buffon: egli si spiega più chiaramente di per se medesimo nel passo seguente. „ La generazione degli animali, e de' vegetali, dic'egli, „ (2) non è univoca; vi sono forse altrettanti esseri „ o viventi, o vegetanti, che produconsi mediante „ una fortuita unione di molecole organiche; vi sono „ degli animali, o de' vegetali, che possono riprodursi per una costante non interrotta successione „ di generazioni; questa è la generazione di quelle „ specie di esseri, a cui si deve applicare l'assioma „ degl'antichi: *corruptio unius, generatio alterius* “. Quando un Fifico ha la disgrazia di partire da simili principj non v'ha più luogo di maravigliarsi, ch'

(1.) Il Sig. de Reaumur, *Mem. per servire alla Storia degli Insetti* Tom. IV.

(2.) *Storia Naturale* Tom. II. pag. 310.

ch'egli intraprenda a spiegare *meccanicamente* la formazione di certe *anguille*, e quella di diversi animali della medesima classe. Le *molecole organiche* nelle sue mani sono, ciò che era la *materia sottile* in quelle di Cartesio. „ Le anguille, che si formano nella „ colla fatta colla farina, aggiugne il Sig. di Buffon, (1) non hanno altra origine, che la riunione delle molecole organiche della parte più sostanziale del grano; le prime Anguille che nascono, „ non sono certamente prodotte da altre anguille, „ frattanto quantunque elleno non siano state generate, esse non lasciano di generare dell'altre anguille viventi; si può vedere, tagliandole colla „ punta di una lancetta, uscire le piccole anguille dal „ loro corpo, e ancora in grandissimo numero“. Un Autore, che avanza formalmente, che una specie di animale *non è generata*, deve, senza dubbio, darne una rigorosa dimostrazione. Io posso nulladimeno assicurare di non averne trovata prova alcuna in tutto il libro. Io invito il giudizioso, ed illuminato lettore a fare il medesimo esame. Parlando in generale, il Sig. de Buffon, pare che non possedesse lo spirito di analisi, o se lo possedeva, la sua immaginazione non gli permise di farne una felice applicazione. Troppo prevenuto da una teoria, che il suo genio secondo avea saputo inventare; non ha osservato, che essa ne' fenomeni, e la natura ch'egli amava gli è scappata. Egli medesimo sarebbe convinto dell'insufficienza de' suoi principj, se avesse avuto l'attenzione di unirli insieme, e formarne una catena; egli avrebbe ben presto conosciuta l'incoerenza degli anelli, e la sua ragione avrebbe trionfato dello spirito di sistema. Io potrei applicare al Sig. de Buffon, quello che disse egli medesimo di Aristotele. „ Io osserverò (1), „ che

---

(1) Ibid. pag. 322.

(2) *Storia Naturale* Tom. II. pag. 37. 38.

„ che mi è sembrato , che questo grand' uomo cer-  
 „ casse espressamente i mezzi di allontanarsi da' sen-  
 „ timenti de' Filosofi , che l' aveano preceduto ; ed  
 „ io sono persuaso che chiunque leggerà il suo trat-  
 „ tato della generazione attentamente , conoscerà  
 „ che il formato disegno di dare un nuovo sistema ,  
 „ e diverso da quello degli antichi , l' obbliga a  
 „ preferire sempre , ed in tutti li casi le ragioni  
 „ meno probabili , e ad eludere quanto può la for-  
 „ za delle prove , allorchè elleno sono contrarie  
 „ a' suoi principj generali di Filosofia .

## C A P I T O L O V.

*Serie di varietà , che si osservano nella fecondazione ,  
 e nella generazione degli animali .*

## 311. Introduzione .

IO non ho terminato di delineare l' abbozzo delle varietà , che ci offeriscono la fecondazione , e la generazione degli animali . Questo soggetto è tanto abbondante , che io sono più occupato a scartare , che a radunare . Io continuerò ad insistere sopra le eccezioni , poichè sono un ramo interessante della Logica del Fisico . Gli esseri , che urtano le nostre regole generali , non urtano certamente il sistema generale . Eglino appartengono ad altri esseri , e questi ad altri per rapporti , che noi non conosciamo . Osserviamo dunque , e paragoniamo ; ma dubitiamo sempre delle asserzioni generali . Non ci scordiamo , che noi non abbiamo che delle premesse particolari sopra la maggior parte de' soggetti della Fisica , e della Storia Naturale .

## 312. Varietà nel tempo della copula .

Gli animali hanno generalmente parlando , de' determinati tempi per la generazione : questi tempi

pi sono quelli dell'*andare in amore*. Questo era apparentemente necessario per l'accrescimento de' ferri, e per l'educazione della prole. La primavera è la stagione degli amori degli uccelli, e di quelli di molte spezie di pesci, come de' lucci, de' barbi ec. Altre specie di pesci, come le reine, vanno in amore nell'estate, i gatti nel mese di Gennajo, Maggio, e Settembre; i capriuoli nel mese di Dicembre; i lupi, e le volpi nel mese di Gennajo; i cervi nel mese di Settembre, e Ottobre; i cavalli nell'estate<sup>(1)</sup>. Tragl' insetti, la maggior parte delle spezie si congiungono nella primavera, e nell'estate.

313. *Varietà negli effetti, che produce l'accoppiamento negl' individui generatori.*

Quasi tutti gl' insetti s' indeboliscono in maniera nell'atto della generazione, che subito muojono. Tutto il Mondo ha potuto osservarlo ne' scarafaggi, e nelle farfalle de' vermi da seta. I maschi delle api ce ne hanno offerto, poco fa, un esempio molto più sorprendente. Per questo la maggior parte degl' insetti non si accoppiano, che una sola volta nel tempo della loro vita, e le femmine mettono alla luce il parto in pochissimo tempo. Quelle di alcune specie si sgravano in una volta di tutte le loro uova: tal'è il caso di quella mosca singolare, che la sua corta vita l'ha fatta chiamare *effemeride*, e questo nome non spiega, che imperfettamente la brevità estrema della sua vita. L'*effemeride* di cui io parlo<sup>(2)</sup> non vive più di quattro, o cinque ore, e nessuna mosca di questa specie non ha veduto giammai alzarfi il Sole; ma io aggiugnerò ch'ella vive due anni incirca sotto la forma di un verme acquatico. Una mosca di vita tanto breve non ha tempo da perdere; appena ella è  
nata

(1) *Storia Natur.* Tom. II. pag. 318.

(2) *Memorie per servire alla Stor. degl' Insetti* Tom. VI. pag. 475. e segg.

nata che si sgrava di due grappoli, contengono più di trecento uova per ciascheduno: ella partorisce dunque in un istante più di seicento uova. Ancora non si sa come sia fecondata questa mosca: *Svvanmerdam* ha preteso, che il maschio sparga i suoi latti sopra le uova: il Sig. de *Reaumur* non ha osservato niente di simile; ma *egli ha creduto vedere de' brevi accoppiamenti*. Il numero delle effemeridi, ch' escono dall' acqua nel medesimo tempo per volteggiare nell' aria, è sì prodigioso, che non può essere assomigliato, che a quello del più denso fiocco di neve, ne resta oscurata l' aria. In mezzo ad una tal confusione, come assicurarsi della realtà dell' accoppiamento? Tutto nientemeno concorre a persuadere, che queste effemeridi si accoppino: i maschi, e le femmine sono provisti di organi, che suppongono una vera copula. (1) Alcune spezie d' insetti non si spossano per un solo atto: i maschi, e le femmine si accoppiano molte volte, e queste partoriscono in più volte. L'ape regina, ed i gorgogli ce ne hanno somministrati degli esempi. Una specie di mosca, che deposita le sue uova negli escrementi del porco, ce ne somministra un altro, sopra il quale il Sig. de *Reaumur* ha creduto dovere insistere. (2) Il parto di questa mosca si rassomiglia più a quello degli uccelli, che a quello della maggior parte delle altre mosche, e delle farfalle. Li grossi animali si accoppiano molte volte nella loro vita, e le femmine fanno molti parti, o molte portate. Alcuni quadrupedi, come il cervio, non si spossano fino alla morte, ma diventano magri in estremo, e loro bisogna un tempo considerabile per rimettersi. Altri quadrupedi come il cavallo, il toro, il cane ec' non si spossano quasi mai, e sono in istato di gene-

(1) Ibid. pag. 501.

(2) Ibid. Tom. IV. pag. 380.

generare soventemente. Accade il medesimo, rispetto a diversi uccelli, come al gallo, all'anitra ec.

314. *Varietà nel tempo del parto, o della covatura.*

Se l'andare in amore ha i suoi tempi, il parto ha altresì li suoi. La giumenta porta undici in dodici mesi, la vacca, la cerva nove mesi; la lupa, la volpe cinque mesi; la cagna nove settimane; la gatta sei settimane, la coniglia trentun giorno. La maggior parte degli uccelli nascono alla fine di tre settimane; alcuni, come il cardellino nascono alla fine di tredici giorni. (1)

315. *Specie vivipare. Specie ovipare. Specie, che sembrano essere egualmente vivipare, e ovipare. Specie vivipare, e specie ovipare nella medesima classe, e nel medesimo genere. Matrice singolare di una mosca vivipara.*

Tutti i quadrupedi coperti di pelo sono vivipari: i grossi pesci nomati cetacei, come la balena, il delfino ec. sono altresì vivipari. I quadrupedi ricoperti di squamme, come il cocodrillo, la testuggine, se si vuole ancora la lucertola, e tutti gli uccelli, sono ovipari. La salamandra terrestre, specie di piccolo quadrupede, che si rassomiglia pel suo corpo, per la sua coda alla lucertola, per la sua testa, per le sue zampe al rospo, non è propriamente ovipara. Il Sig. di Maupertuis, che amava i piccoli animali, e che sapeva osservarli, ci ha lasciate delle osservazioni curiose sopra questa salamandra. (2) Egli ha trovato nel medesimo tempo nella sua matrice delle uova, e de' parti viventi. Le uova formavano due grappoli simili alle ovaje degli uccelli, ma più lunghe; ed i parti più snelli delle salamandre grandi, erano contenuti in due lunghi tubi tanto trasparenti, che si vedeano a traverso distintamen-

(1) *Stor. Nat. Gen., e Particolare.* Tom. 1. pag. 319.

(2) *Memorie dell'Accademia* an. 1727. p. 27. e segg. in quarto.

tamente. Il celebre Accademico contò quarantadue parti in una salamandra, e cinquantaquattro in un'altra. Egli ha avuto ragione di aggiugnere, *che questo animale pareva molto proprio a schiarire il mistero della generazione.* (1) Almeno somministra un nuovo argomento in favore del sentimento de' Fisici, che pensano, che i parti de' vivipari siano contenuti originalmente nella uova. Questo si vede cogli occhi nella salamandra: basta aprirla per riscontrarvi delle vere uova. Dacchè i parti sono nati, sembra, che passino in que' lunghi tubi, di cui ho parlato. Sarebbe da desiderarsi, che il nostro Autore avesse maggiormente approfondata questa parte della storia della salamandra; ma è assai chiaro, ch'essa appartiene più alla classe de' vivipari, che a quella degli ovipari. I pesci ricoperti di squamme, le ranocchie, ed i rettili, come i serpi, sono ovipari. Ma la vipera, come l'indica il suo nome, e vivipara. Gli si trovano altresì delle vere uova, ed i parti della vipera, come quelli della salamandra, nascono nel ventre della loro madre. (2) La classe numerosa delle conchiglie ci fa vedere delle specie vivipare, ed ovipare. La maggior parte delle conche sono vivipare; lo sono ancora alcune *chiocciolate* come il *jet*. (3) Le *chiocciolate terrestri*, le *porpore*, e molte altre conchiglie sono ovipare. (4) Generalmente parlando sembra, che il numero delle conchiglie ovipare superi quello delle vivipari. Eli è il medesimo della classe più numerosa degl' insetti, la maggior parte sono ovipari, ma gli scorpioni, i progallinsetti, le cocciniglie, e le scoloprende sono vivipare. Gli animalletti de' liquori accrescono senza dubbio, e molto questa corta lista.

Io

(1) Ibid. pag. 32.

(2) *Storia Naturale Generale ec.* Tom. II. pag. 311.(3) *Storia Naturale di Senega.* p. 58. della Definizione delle parti.

(4) Ibid.

Io nomino i progallinfetti; questi sono falsi *gallinfetti*, e si distinguono da' veri per le incisioni annulari, ch'essi sempre conservano, e che si cancellano del tutto ne' *gallinfetti* propriamente detti. (1) La *cocciniglia*, ch'è diventata un sì gran capo di commercio, e la di cui vera natura non si era per lungo tempo conosciuta, è un *progallinfetto*. (2) I vermi di terra, le sanguisughe, gli aragni, i pidocchi, le pulci, i grilli, e le farfalle, gli scarafaggi, la maggior parte delle mosche da due ale, quasi tutte le mosche da quattro ale ec. partoriscono delle uova. Ma è molto osservabile, che nel medesimo genere d'insetti vi sono delle specie vivipare, e delle specie ovipare. Il Sig. de Reaumur fa menzione di sei, o sette specie di mosche da due ali, che mettono alla luce de' parti viventi; (3) questi sono vermi, che si trasformano coll'andar del tempo in mosche simili alla loro madre. La matrice di queste mosche è una piccola curiosità: ella è formata di una lama attorta spiralmemente, lunga incirca due pollici e mezzo, vale a dire, sette, o otto volte più lunga del corpo, e tutta composta di vermi posti gli uni accosto agli altri con molta simetria, ed oltrepassano il numero di ventimila. (4)

316. *Specie vivipare, e ovipare nel medesimo tempo. Li gorgogli, ed i polipi fatti a spennacchio.*

Noi abbiamo veduto, che i gorgogli sono egualmente vivipari, ed ovipari, ma in diversi tempi dell'anno. Vi sono nelle acque dolci de' polipi fatti a *spennacchio*, che moltiplicano per polloni, come quelli fatti a branche, ed i polloni de' quali sono posti nelle canne analoghe a quelle de' polipi di mare,

(1) *Mém. pour servir à l'Hist. Nat. des Insectes*. T. IV. pag. 81.

(2) *Ibid.* pag. 37. e segg.

(3) *Ibid.* pag. 406.

(4) *Ibid.* pag. 415. e segg.

re , de' quali ho parlato nell' Articolo 188. Il Sig. Trembley ha descritti questi polipi a *spennacchio*, ed il loro modo di moltiplicarsi , nella terza Memoria della sua Storia de' Polipi . Questa specie di polipo ha fatto conoscere , che diverse produzioni marine , che credevansi piante , non sono che *polipaje* , o ammassi di tubi , in ciascheduno de' quali si conserva un polipo . Li Sigg. de Reaumur , e B. de Jussieu si sono assicurati , che i polipi fatti a *spennacchio* , *allorchè sono già vecchi , e forse vicini a morire* , partoriscono delle uova brune , un poco piane . Essi da queste uova hanno veduto nascere de' parti . (1) Così questi polipi sono realmente vivipari , e ovipari nel medesimo tempo , poichè i *polloni* ch'essi germogliano da' differenti punti del loro corpo , sono parti viventi . Se i *femi* possono essere paragonati alle uova di questi polipi , se i *rami* si rassomigliano ai polloni di questi ultimi , si potrebbe dire , che sono vivipari , ed ovipari nella maniera de' vegetali .

317. *Nuova osservazione del Sig. Trembley sopra una specie di polipo fatto a spennacchio , le di cui uova possono essere conservate all' asciutto per molti mesi .*

Il Signor Trembley , a cui era stato riservato di scoprirci un nuovo mondo ne' polipi , mi ha comunicata una osservazione interessante fatta sopra una specie di polipi fatti a *spennacchio* , diversa da quella ch'egli ha descritta nelle sue Memorie . Io riporterò questa osservazione con altrettanto piacere , poichè tutto quello , che viene da questo eccellente Osservatore è prezioso , e perchè daltronde egli non l' ha ancora pubblicata : eccola dunque ne' suoi proprj termini . „ La specie de' polipi fatti a *spennacchio* , le cui  
„ can-

(1) *Memorie per servire alla Stor. degl' Insetti* . Tom. VI. Prefazione , pag. 76.

„ canne si ramificano molto , è quella le cui uova  
 „ sono state le più osservate . Esse si trovano nel voto  
 „ di queste canne . Vi compariscono circa il mese di  
 „ Agosto . Da principio sono bianche , poi diventa-  
 „ ro brune . Sono presso a poco ritonde , un poco  
 „ piatte , e sono guernite all'intorno di una specie  
 „ di cordone , pochissimo rilevato . Nel mese di Set-  
 „ tembre si trovano de' monti di polipaje di polipi  
 „ fatti a spennacchio , che contengono un numero  
 „ prodigioso di uova . Le polipaje si guastano , e la  
 „ maggior parte appoco appoco muojono . Le uova  
 „ escono a misura , che si guastano le canne , e sono  
 „ innalzate per la loro leggerezza sopra la superfi-  
 „ cie dell'acqua . Io ne radunai una grandissima quan-  
 „ tità nell'Inghilterra nel 1745 . Le feci seccare all'  
 „ ombra . Io trasportai queste uova in una carta  
 „ nell'Olanda , come ayrei fatto del seme de' vermi  
 „ da seta . Io le conservai all'asciutto nel mese di  
 „ Settembre , fino al seguente Gennajo ; le messial-  
 „ lora sopra la superficie dell'acqua che tenevo in  
 „ vasi grandi nel mio gabinetto . Nella Primavera  
 „ ho vedute aprirsi molte di queste uova , e com-  
 „ parire sopra una materia albiccia i principj di un  
 „ polipo a spennacchio ; ho veduto appoco appoco  
 „ estendersi questa materia , e ramificarsi . A misu-  
 „ ra ch'essa si ramificava , o vegetava , nascevano  
 „ da queste ramificazioni de' nuovi polipi .

318. *Ragioni che provano , che i polipi fatti a  
 branche , sono vivipari , ed ovipari . Perchè alcune spe-  
 cie sieno nel medesimo tempo vivipare , ed ovipare . Come  
 le uova de' pesci possan rinascere negli stagni disseccati .  
 Esperienza da tentarsi sopra questo soggetto .*

I polipi fatti a branche in forma di corna , de' quali  
 ho parlato tanto , moltiplicano per polloni , come noi  
 lo abbiamo veduto nel Articolo 185 . Questi polloni  
 sono veri polipi nascenti ch'escono dal corpo del-  
 la loro madre , come un ramo esce dal tronco di un

albe-

albero. Questi polipi dunque sono *vivipari*, ma sono vivipari molto diversi da tutti quelli, che non conosceavamo avanti. Se si volesse caratterizzarli, bisognerebbe inventare un nuovo termine, e chiamarli *ramipari*; poichè è chiarissimo, che questi insetti sono vivipari piuttosto nella maniera degli alberi, che in quella de' quadrupedi, e degli altri animali, che mettono alla luce de' parti viventi. Ancora non è dimostrato, che i polipi *a branche in forma di corna* sieno altresì *ovipari*, e questo è un punto dalla loro storia, che rimane a schiarirsi. Il Sig. Trembley ha veduto sopra il loro corpo delle piccole escrescenze steriche, che vi stavano attaccate per un corto picciuolo. Egli ha osservato, che queste escrescenze dopo qualche tempo si staccavano dal polipo, e cadevano al fondo del vaso. Tutte si riducono in niente; ma egli ne ha veduta una, che non ha osato assicurare esser divenuta un polipo; perchè non avea potuto seguirarla senza interrompimento, e perchè vi erano nel medesimo vaso de' piccioli polipi. Quando tornò ad esaminare questa escrescenza, la ritrovò nel luogo medesimo, dove l'avea lasciata due giorni avanti, *un polipo informe che pareva realmente venire da un corpo sferico, che si allungava dalla parte, per la quale toccava il fondo del vetro. La parte opposta era ancora rotonda, e vi si vedevano i bottoni di tre branche, che incominciavano a spuntare: Questo polipo appoco appoco allungossi, e prese la forma ordinaria di questi animali.* (1) Vi ha tanto rapporto tra i polipi *a branche*, ed i polipi *a spennacchio*, che non si può dubitare, che l'escrescenze, di cui io parlo, non sieno specie di uova, e che i primi siccome gli ultimi, sieno nel medesimo tempo *vivipari ed ovipari*. Vi sono de' tempi, e delle circostanze, nelle quali la specie può conservarsi pel  
mez-

(1) *Mem. sopra i polipi ec.* Tom. II. pag. 97. e 98.

mezzo de' *polloni*, e ve ne sono delle altre, nelle quali non potrebbe apparentemente perpetuarsi, che pe' mezzo delle *uova*. Li gorgogli ce ne hanno già dato un esempio. Li parti, che nascessero nell' Autunno non potrebbero sussistere sopra gli alberi durante l' Inverno; eglino sono allora nascosti nelle uova, e non nascono, che al ritorno della Primavera. Noi abbiamo veduto poco fa, che il Sig. Trembley ha conservato quattro, o cinque mesi *all' asciutto*, le uova di una specie di polipi *a spennacchio*, ch' egli le ha seminate dopo sopra l' acqua, come semi di piante acquatiche, e che questi semi animali hanno prodotti de' polipi della medesima specie. Così uno stagno, che fosse stato ripieno di questi polipi, e che si seccasse per alcuni mesi, potrebbe ancora ritrovarsi ripienissimo al ritorno delle pioggie: le uova, che si fossero conservate nel vaso, farebbono nascere delle nuove generazioni di polipi. Questo è quanto l' esperienza ha confermato al Sig. Trembley, o sia risguardo de' polipi *a spennacchio*, o sia a risguardo de' polipi *a branchie in forma di corna*: egli ha veduti de' polipi di questa seconda specie, ricomparire ne' luoghi, ch' erano stati qualche tempo asciutti. Si potrebbe conghietturare con verisimiglianza, che le uova de' pesci si conservino nella medesima maniera nel fondo degli stagni asciutti, e che rinascano quando questi stagni di nuovo si riempiono. Almeno questo è ciò, che si è osservato con sorpresa in uno stagno seccato, e dopo ripieno de' medesimi pesci, de' quali non si poteva scoprire l' origine. Si supponeva, che le cicogne avendo portati nel loro becco di questi pesci, fossero loro caduti a caso nello stagno ripieno di nuovo, e che ad esse fosse dovuta la nuova generazione di questi pesci. Ella era forse dovuta alle uova rimaste nel vaso, e che si erano conservate sane. Questo sarebbe una curiosa esperienza da tentarsi, siccome quella di conservare *all' asciutto* le uova di diverse specie di pesci, e poi seminarle

narle in luoghi convenienti, e proprj. Assicureres-  
bensi con questo mezzo semplicissimo, se possano ser-  
vire così a perpetuare la specie. La natura non è stata  
soggettata ad una estrema precisione; ella ha nel suo  
modo di operare una certa latitudine, che il Fisico  
deè studiare, e che gli scopre l'esperienza. Non ci  
scordiamo di ciò, che io ho riportato nel Capitolo X.  
del Tomo I. sopra la maniera di abbreviare, e di pro-  
lungare, come si vuole, la durata della vita di diversi  
animali. Conservando all'asciutto per quattro, o cin-  
que mesi, delle uova di polipi, si prolunga realmente  
altrettanto la durata della vita de' germi posti in que-  
ste uova. Quante generazioni di polipi sarebbonfi  
succedute durante questo intervallo di tempo, se le  
uova fossero state nel loro elemento naturale?

319. *Specie, che non sono propriamente nè vivi-  
pare, nè ovipare. Polipi, che moltiplicano per divi-  
sioni, e suddivisioni naturali. Come si possa concepire  
la generazione de' polipi fatti a bulbo. Riflessioni so-  
pra la struttura de' polipi, e sopra l'animalità.*

Li parti degli ovipari escono dal ventre della lo-  
ro madre ferrati dentro un guscio molle, e crosta-  
ceo. Noi chiamiamo questo guscio un uovo, e diciam-  
mo che i parti nascono quando escono dall'uovo.  
Le scoperte del Sig. Trembley sopra diverse specie di  
polipi d'acqua dolce, ci hanno fatto vedere, che vi  
sono degli animali, i quali sembra, che non appar-  
tengono propriamente nè alla classe de' vivipari, nè  
a quella degli ovipari, e che richiedono di esser col-  
locati in una classe particolare, per la quale ancora  
non abbiamo il nome. Io ho dato nel Capitolo XI. del  
Tomo I. un saggio della storia de' polipi fatti a maz-  
zetto: io vi ho riportata, dietro la scorta del Sig.  
Trembley, la maniera singolare, per cui essi mol-  
tiplicano. Io ho detto, ch'egli ne ha osservate due spe-  
zie, delle quali io ho indicati i caratteri: i polipi dell'  
una, e dell'altra hanno la figura di una campana ro-

vesciata. Si è veduto, che allorchè i polipi della prima specie sono vicini a moltiplicare, perdono la loro figura di campana, e prendono quella di un corpo ritondo, che si divide secondo la sua lunghezza in due corpi ritondi più piccoli, i quali prendono subito la figura di campana. Questi sono due polipi perfetti attaccati al medesimo tronco mediante un proprio picciuolo. Eglino subitamente divengono ritondi, e si dividono come il primo in due, secondo la loro lunghezza. Il mazzo allora è composto di quattro campane. Egli continua ad accrescersi, mediante simili divisioni, e suddivisioni. Tutte le campane sono attaccate, come altrettanti fiori ad uno stelo comune, e compongono in questa maniera un mazzetto molto ammirabile al microscopio, e che colla semplice veduta prenderebbesi per una macchia di *muffa*. I polipi a mazzetto della seconda specie, non devono la loro prima origine alla divisione di una campana, ma abbiamo noi veduto, che nascono quà, e là sopra i rami del mazzetto, de' piccoli bottoni, de' piccoli bulbi, simili in qualche modo alle *galle* delle piante, ed ingrossano appoco appoco. Pervenuti finalmente al loro ultimo termine di accrescimento, questi corpi ritondi, queste specie di bulbi si staccano dal mazzetto, e vanno nuotando a fermarsi sopra qualche appoggio, e vi si attaccano mediante un corto picciuolo, che in poco tempo si allunga. Ogni bulbo perde la sua figura sferica, e diventa ellittico. Questa specie di bulbo, è molto più grosso di un polipo a *campana*. Egli si divide pe'l mezzo secondo la sua lunghezza, e le divisioni, e suddivisioni continuano nel medesimo modo in tutti i bottoni, fintantochè non sieno tutti arrivati ad avere la grossezza propria delle campane. Allora si aprono, e si fanno vedere sotto la figura di campane. Tutte queste campane sono veri polipi, e tutti sono attaccati ad un tronco comune mediante un picciuolo particolare. Il *mazzetto*, che  
risul-

risulta dalla loro unione, dopo produce delle nuove branche, e de' nuovi rami, mediante la stessa divisione delle campane. Questa breve recapitolazione della storia de' polipi *fatti a mazzetto*, fa abbastanza conoscere, che il loro modo di moltiplicare non ha niente di comune con quello de' *vivipari*, nè con quello degli *ovipari*. Bisognerebbe inventare de' termini per ispiegare la generazione di questi polipi, e chiamarli, se si può, quelli della prima specie *gemmipari*, e quelli della seconda *bulbipari*. Ma le parole non accrescono le nostre cognizioni sopra le cose, ch'ellenò rappresentano. Quando si saranno trovati de' termini propri a fissare le nostre idee sopra questa nuova classe di corpi organizzati, non penetreremo meglio il segreto della loro moltiplicazione. Questi polipi sono tanto piccoli, che il microscopio non può scoprirci che la loro forma esteriore, e tutto quello, che accade nel loro interiore avanti, nell'atto, e dopo la divisione, ci rimane occulto. Quanti fatti interessanti si offerirebbono quì al nostro esame, se il meccanismo di questi corpi fosse esposto a' nostri sguardi! La loro organizzazione è senza dubbio semplicissima; noi ne possiamo giudicare da quella del polipo *a branche*. Io ho rassomigliato nel Capitolo X. del Tomo I. il bruco ad un uovo; egli almeno ne fa le sue veci riguardo alla farfalla; ma quest'uovo mangia, cresce, si muove ec. Il *bruco*, ch'è il principio di un polipo *a mazzetto* della seconda specie, farebb'egli una specie di *ovaja* animata, che contenesse attualmente tutti i polipi, tutte le piccole campane, che nascerebbono dalla sua divisione, o dalla sua scomposizione graduale, e successiva? Il finger questo, e cento cose simili, è un volere indovinare la natura, e non si corre mai maggior rischio d'ingannarsi tentando d'indovinarla, se non allorchè uno non può nè pure ajutarsi coll'*analogia*. La semplicità estrema della struttura de' polipi

de' quali noi abbiamo maggior cognizione, indica bastantemente, che tutti gli animali di questa classe non sono quasi formati, che di parti *similari*. Da questo avviene, che ne' polipi a *branche* ogni frammento, e per dire di più, ogni molecola può rappresentare un polipo in piccolo. Ora i risultati naturali di una simile struttura devono molto differire da quelli di una struttura compostissima, e dove ha luogo un gran numero di parti *dissimilari*. Li polipi sembrano occupare il più basso della scala dell'animalità: collocati in una tanto prodigiosa distanza dall'uomo, e da' grossi animali, sarebbe cosa poco filosofica il crederli sempre in diritto di tirarne delle induzioni dagli uni agli altri. Ma noi abbiamo trovate ne' grossi animali delle idee di uova, di ovaja, di matrice, di parto delle uova, e di sgravio del feto ec. e noi trasportiamo queste idee senza riflettervi a tutto ciò, che ha il carattere di animale. Contuttociò noi non siamo ancora arrivati a fissare le nostre idee sopra l'animalità, ed i polipi ci hanno fatto apprendere, che i caratteri da noi giudicati propri pe' vegetale convengono altresì all'animale. I polipi dunque ci hanno insegnato ad usare con sobrietà dell'*induzione*. Io so, che le nostre idee si estendono per la strada della comparazione, ma so altresì, che l'*arte di comparare* ha le sue regole, sopra le quali i Logici ordinariamente non insistono abbastanza. Non paragoniamo dunque i polipi, che a loro medesimi, ed agli esseri, a' quali eglino sembrano più assomigliarsi. Questo è quello, che ho tentato di fare ne' due primi capitoli di questo volume, allorchè ho procurato di render ragione delle divisioni, e degl'innesti animali. Frattanto siccome non è sempre facile l'inventare dei termini, che rappresentino perfettamente degli oggetti, de' quali non si avea idea alcuna, qualche volta accade, che uno si serve a quest'effetto di termini già appropriati per significare oggetti molto conosciuti, e quest'

quest' uso non potrebbe tacciarsi di vizioso, allorchè si ha l'attenzione di spiegare la differenza degli oggetti rappresentati co' medesimi termini. Così allorchè io mi sono servito di questa espressione, che *il polipo è tutto un'ovaja*, non ho preteso di fare intendere, che tutto il polipo sia un'ovaja simile a quelle, che noi conosciamo, nè che contenga delle uova simili a quelle degli altri insetti; ma io ho voluto solamente, fare intendere in poche parole, che nella maggior parte degli altri animali, gli embrioni sono contenuti in un dato luogo; nel polipo sono sparsi in tutta l'estensione del suo corpo.

320. *Movimenti osservabili, che si danno il tronco ed i rami de' polipi fatti a mazzetto. Principio di questi movimenti, e ciò, che sieno i rami.*

Io non l'ho detto ancora, e devo dirlo al presente, per far meglio conoscere la difficoltà di spiegare la generazione de' polipi a mazzetto, e per giustificare il silenzio da me osservato sopra questo soggetto alla fine del Capitolo II. di questo volume. Il tronco, ed i rami non compongono colle campane, che un solo tutto organico, ed il medesimo principio di vita sembra animare gli uni, e l'altre. Il tronco, ed i rami sono suscettibili di movimenti osservabilissimi, e che si diversificano molto. In una specie di questi polipi a mazzetto, che potrebbonsi chiamare polipi fatti a fiocco, a cagione della forma di mazzetto, il tronco ed i rami si ritirano sopra loro medesimi con un'estrema prontezza, per poco che si agiti l'acqua. Egli no eseguiscano questi movimenti disponendosi in figura spirale, i di cui giri si toccano tutti, o quasi tutti. Ogni ramo può raccogliersi indipendentemente dall'altro ramo. Ma allorchè il tronco si ritira, si ritirano altresì i rami. Dappoichè vien resa la calma ai polipi, il tronco, ed i rami si stendono, o si spiegano di nuovo. Allorchè il mazzetto è già molto cresciuto, il tronco non si ritira più; direbbesi che fosse in-

du-

durito. Le campane, come ho detto, si staccano finalmente dal mazzetto: quando egli n'è molto spogliato, i rami non si ritirano più colla medesima prontezza; e quando il mazzetto è molto più spogliato di campane, e non v'ha che i rami, che ne sieno provveduti, si ritirano ancora. Finalmente allorchè il mazzetto è fornito di tutte le sue campane, i rami non si muovono più. Si può inferire da questi fatti, che il principio di quei movimenti risieda nelle campane. Elleno altresì concorrono all'accrescimento del tronco, e de' rami. Non bisogna per questo paragonare questi rami a quelli degli alberi; sono piuttosto specie di radici, che germogliano le campane, e che appoco appoco si sviluppano. Quando uno di questi piccolissimi polipi si stacca da un mazzetto, egli va nuotando a fermarsi sopra qualche appoggio. Esce dalla sua parte inferiore un corto picciuolo, che lo attacca a questo appoggio. Questo picciuolo si allunga molto, e spesso diventa il tronco di un nuovo mazzetto. Il polipo posto all'estremità del tronco, si divide in due parti ineguali; la parte più grossa rimane attaccata all'estremità di questo tronco, o gambo; l'altra si trova collocata un poco più al basso. Egli germoglia altresì un picciuolo pel quale sta attaccato al gambo. Questo picciuolo si allunga, e diventa un ramo. Il polipo posto all'estremità di questo ramo, si divide come il primo, e germoglia, com'esso, un picciuolo, ed ecco un nuovo ramo, che si pianta sopra il primo ec. Così non sono i rami, che producono le campane, come un ramo vegetale produce un bottone, o un fiore; ma le campane producono i rami, e questi cessano di crescere dacchè quelle si dividono da essi naturalmente, o per qualche accidente. I polipi fatti a *bulbo*, sono, come si è veduto, nel numero de' polipi fatti a *mazzetto*. Da un tronco comune partono otto, o nove rami principali, che formano col tronco un angolo un poco più grande di

di un retto. Da tutti questi rami escono de' rami laterali più piccoli; e all'estremità degli uni, e degli altri è una campana, o un polipo. Quando si tocca leggermente il mazzetto, e sovente senza che si tocchi, i rami si ripiegano di fuori in dentro, e nel ripiegarsi si dispongono in maniera da formare una massa rotonda. Il gambo si ritira nel medesimo tempo, e si piega nel medesimo modo, che si piega una misura, che si snoda in due, o tre luoghi.

321. *Nuova scoperta del Sig. Trembley sopra i polipi fatti a nassa. Corpi oviformi, ai quali essi devono la loro origine. Singolarità del loro modo di nascere. Osservazioni sopra questo soggetto.*

Sembra che i polipi sieno fatti per disordinare tutte le nostre idee di economia animale. Io l'ho detto, e non temo di ripeterlo qui, essi sono stati fatti sopra modelli, che differiscono sì prodigiosamente da tutto ciò, che noi avevamo conosciuto, che noi siamo imbarazzati a nominare ancora ciò, che essi ci mostrano. Noi intendiamo per un uovo, un corpo rotondo, o bislungo, il di cui guscio, o molle, o crostaceo contiene con diverse sostanze un embrione chiamato a prendervi i suoi primi accrescimenti. Vi è una specie singolarissima di polipi, che compariscono da principio sotto la forma di un piccolissimo corpo bislungo, e biancastro, che giudicherebbesi essere un uovo, e che infatti non è. Esso medesimo è animale, mascherato sotto questa ingannevole apparenza. Vi è ancora una scoperta del Sig. Trembley, ch'egli non avea pubblicata, e di cui mi ha fatto parte. Io la produco qui co' proprj termini dell'Autore. „ Ec-  
 „ co, mi scrivea egli, in qual maniera moltiplica  
 „ la specie di piccolo insetto acquatico, che io ho  
 „ chiamato polipi fatti a nasse, e de' quali non ho  
 „ descritta ancora nessuna parte. Si trovano aggrovi-  
 „ gliati in gruppi, ed attaccati sopra tutti i corpi,  
 „ che si riscontrano nelle acque. Siccome l'ani-  
 „ ma-

„ ma-

„ male è trasparente, si vede, che si forma dentro  
 „ di esso un corpo bislungo, e biancastro. Questo  
 „ corpo dopochè è formato scende appoco appoco,  
 „ ed esce dal polipo per un dato luogo, e resta attac-  
 „ cato perpendicolarmente sopra il polipo. Ogni gior-  
 „ no se ne produce un nuovo, e il gruppo, che si  
 „ forma sopra il corpo del polipo, cresce. Questi pic-  
 „ coli corpi bislungi sono specie d'uova. Essi non  
 „ hanno pelle, o guscio. Sette, o otto giorni do-  
 „ pochè sono usciti dal corpo del polipo si sviluppa-  
 „ no. Questo sviluppamento segue in pochi minuti,  
 „ dopo il quale sono tali come la loro madre. Io  
 „ conosco altre specie di piccoli polipi di acqua dol-  
 „ ce, che moltiplicano nella stessa maniera, o con  
 „ poca differenza. Io posso aggiugnere, che sono tut-  
 „ te madri. “ I piccoli bottoni, che s'innalzano quà,  
 e là sopra i corpi de' polipi a branche, (1) e che sono  
 altrettanti polipi nascenti, sembrano di una natura  
 molto analoga a quella di questi piccoli *corpi oviformi*,  
 che diventano polipi a *nasse*. Gli uni, e gli altri sono  
 piccoli *tutti* organizzati, che prendono i loro primi  
 accrescimenti allo scoperto, mentrechè i parti degli  
 ovipari prendono i loro in una specie di cassetta, o di  
 di sacco. Rappresentatevi un uccello che nascesse  
 senza involucro, ripiegato sopra se medesimo in forma  
 di palla, e che si spiegasse dopo appoco appoco, e voi  
 avreste un'immagine, imperfettissima invero, della  
 maniera di cui nascono i polipi a *nasse*. Si può con-  
 ghietturare con verisimiglianza, che mentre il po-  
 lipo è nel suo primo stato di *corpo oviforme*, tutte  
 le sue parti, o esteriori, o interiori, hanno delle  
 forme, delle proporzioni, delle situazioni, che diffe-  
 riscono molto da quelle, che avrebbono nell'animale  
 sviluppato. Se non ci fossimo scordati de' cangiamenti,  
 a' qua-

---

(1) Articolo 185.

a'quali è soggetto il polipo nell'uovo, (1) non ci maraviglieremo senza dubbio meno di quelli, a'quali è soggetto il polipo a *nasse* fuori del corpo della sua madre, se i nostri microscopj potessero attendere a quest'ordine d'infinitamente piccoli. Si fa altresì una spezie di generazione allo scoperto nelle parti che riproducono i diversi insetti, che si moltiplicano in tagliandoli a pezzi. E particolarmente ne' vermi di terra, ne'quali si possono seguitare coll'occhio i progressi di uno sviluppo tanto rimarcabile, e che non si lascia punto di riscontrare. Io mi vi sono molto occupato nel Capitolo primo di questo volume: noi non presumeremo, che quelle diverse parti che nacquero sotto i nostri occhi, fossero originalmente contenute ne' veri uovi. Noi supporremo più volentieri ch'elleno abbiano per principio de' piccoli corpi analoghi a quelli che sono il principio de' polipi a *nasse*.

322. *Specie, la cui prole nasce tanto grossa come la sua madre. La mosca-aragna. Principj sopra le metamorfosi degl'insetti in generale. Della metamorfosi in palla allungata in particolare. Nuova prova della falsità dell'epigenesi.*

Se vi è alcuna legge della natura che sembri non dover patire alcuna eccezione, ella è certamente quella, che vuole che ogni animale debba crescere dopo il suo nascimento. Una mosca che sta sopra i cavalli che trovasi altresì ne' nidi delle rondinelle, e cui la figura piatta del suo corpo l'ha fatta chiamare dal Sig. de Reaumur *mosca-aragna*, ci mostra in questo genere un prodigio che l'illustre Osservatore ci descrive, al suo solito, di una maniera molto propria a interessare la nostra curiosità. „ Se alcuno, „ dic'egli, (1) ritornando da un viaggio fatto in „ par-

(1) Articolo 146.

(2) Tom. VI. delle Mem. sopra gl'Insetti, Prefaz. pag. 48.

„ parti lontanissime , e poco frequentate , osasse  
„ raccontarci di aver veduto un grosso uccello , una  
„ gallina per esempio , di una certa specie , che  
„ fa un uovo di una grossezza smisurata , dal qua-  
„ le nasce un pollo , il quale dall'istante ch'è fuo-  
„ ri del guscio , non ha più a crescere , perch'egli  
„ è eguale alla sua madre in grossezza , o ancora  
„ al gallo dal quale egli è stato fecondato ; se al-  
„ cuno , dico io , osasse raccontarsi un simil fatto ,  
„ crederemmo noi che meritasse egli di essere as-  
„ coltato ? Benchè egli l'attribuisse all'uccello del-  
„ la più piccola specie , ad un *colibri* , o ad un uc-  
„ cello mosca , il suo racconto non ci sembrerebbe  
„ meno favoloso . L'immaginazione non potrebbe  
„ accomodarsi a concepire un animale , il quale dal  
„ momento della sua nascita avesse tutta la gran-  
„ dezza del suo padre , e della sua madre : che ci  
„ si voglia far credere di un Elefante , di un *coli-*  
„ *bri* , o di una mosca , la difficoltà sarà sempre la  
„ medesima . Egli è nientemeno verissimo , ed io  
„ non ardirei asserirlo , se per riscontrarlo bisognas-  
„ se andare all'Indie , che vi è una mosca , ed è la  
„ nostra mosca-aragna , che fa un uovo tanto gros-  
„ so , che appena si può concepire come potesse es-  
„ ser contenuto nel suo corpo . Il suo guscio è nero ,  
„ lucente , duro , ed incapace di estensione , l'uo-  
„ vo conserva altresì la forma , e il volume ch'egli  
„ avea allorchè fu partorito . Viene frattanto un  
„ tempo , nel quale n'esce una mosca , che nello  
„ istante della sua nascita è nel caso del pollo ,  
„ che nascesse pollo perfetto , o perfetto gallo “ .  
Il mio Lettore ha già formata l'idea di un uovo ,  
di un vero uovo , di un uovo simile in piccolo a  
quello di una gallina , donde ne nasce un volatile ,  
che ha nel suo nascimento tutta la grandezza del-  
la sua madre . Questa idea d'uovo non è pertanto  
esatta , ed il Sig. de Reaumur non l'ha esposta al-  
tron-

tronde (1) più particolarizzata: rendendola dopo le sue osservazioni, e dopo le mie proprie, io non farò che mutare i termini, e la maraviglia sussisterà la medesima. Ma avanti di dare al mio Lettore il vero motto di questo enigma, lo renderò inteso di una singolarissima *metamorfofi*, a cui sono soggetti i vermi che diventano mosche della classe di quella, di cui si tratta. Si fanno in generale le metamorfofi del *verme da seta*: elleno convengono precisamente con quelle, alle quali tutti i *bruchi* e molti altri insetti sono soggetti per arrivare allo stato di perfezione, a quello stato, nel quale unicamente possono propagare la loro specie. (2) Si sa, che l'insetto si spoglia della pelle di *verme*, quando prende la forma di *crisalide*, o quella di *ninfa*. Egli similmente si spoglia dell'inviluppo di *crisalide*, e di quello di *ninfa*, allorchè comparisce sotto la sua vera forma di *farfalla*, di *mosca*, o di *scarafaggio*. Io aggiugnerò, che v'ha questa differenza essenziale trallo stato di *crisalide*, e quello di *ninfa*, che nel primo, tutte le parti esteriori dell'insetto sono rivestite di un inviluppo membranoso, e sottilissimo, e *proprio* di ciascuna, e che di più elleno sono ricoperte di un inviluppogenerale e crostaceo, che le sottomette tutte al corpo. Quest'inviluppo crostaceo manca alle *ninfe* propriamente dette; siccome tutte le parti esteriori dell'animale vi sono molto più visibili che nelle *crisalidi*. Tutti i *bruchi* che ci sono noti, passano per lo stato *medio* di *crisalide* avanti di arrivare a quello di *farfalla*. Molte spezie di *vermi* passano per lo stato *medio* di *ninfa* avanti di arrivare a quello di *mosca*. Io tratterò questo soggetto più in particolare, allorchè esaminerò con maggior esattezza nel progre-

fo j

---

(1) Ibid. Memor. 14. pag. 586. e segg.

(2) Vedi l'Articolo 309.

fo di quest'opera il modo, col quale si operi l'accrescimento di diversi animali. Io darò nel medesimo tempo un *metodo*, per distribuire gl'*insetti* in classi, somministratomi dalle loro *metamorfosi*. I *vermi* che io voglio (1) far conoscere al presente, vivono nelle carni corrotte, e nelle più abiette materie. Essi non hanno nissune gambe; respirano per ispecie di bocche poste nelle loro parti di dietro. Sono biancastri, molli, e quasi trasparenti; la loro testa armata di due uncini, non è punto simile a quella degli altri animali: ella muta figura ad ogni momento: ella s'allarga, si restringe, s'allunga, si scorcia in mille maniere: l'insetto può farla rientrare nel suo ventre, e farnela uscire a suo piacere. Quando questi vermi sono vicini a trasformarsi, prendono la forma di un uovo, sotto questa forma sono assolutamente incapaci di movimento alcuno: la loro pelle diventa fragile, e facile a rompersi, e il loro colore si muta in un bruno di marrone. In una parola, non ritengono altro della loro primiera forma, che alcuni vestigj di anelli. Nel trasformarsi, l'insetto non si spoglia, come tanti altri, della pelle di verme; ma tutte le sue parti esteriori si ritirano appoco appoco, e finalmente del tutto si staccano. Elleno si trovano allora contenute in un guscio ben serrato, e questo guscio è formato della pelle medesima del verme. Così la natura, che ha negato al nostro insetto quel filo brillante che ha accordato al verme, da seta, e ad un gran numero di altri bruchi, lo ha ricompensato, insegnandogli a farsi un guscio della sua propria pelle, il di cui uso corrisponde esattamente a quello del bozzolo del baco da seta. Ella ha ancora disposto tutto perchè questo bozzolo singolare avesse il grado di consistenza necessaria alle

bi-

(1) *Memoria per servire alla Storia degli Insetti*, Tom. 4. Mem. 7. pag. 289. e segg.

bisogne del piccolo animale. Si fa, che i bruchi mutano molte volte la pelle nel corso della loro vita: si fanno le *mute*, o le malattie del baco da seta. Ma non si fa ancora tutto quello, che queste *mute* hanno di rimarcabile: non si pensa, che ad ogni muta l'insetto si spoglia del suo cranio, de' suoi occhi, de' suoi denti, delle sue gambe, in una parola, di tutte le sue parti esteriori. Si ritrovano completissime nello spoglio, e tanto complete, che queste non differiscono punto esteriormente dall'animale medesimo. Ricoperto della sua nuova pelle, egli fa vedere le medesime parti, e si conosce ch'elleno erano poste con una gran maestria in quelle della spoglia, come in altrettante guaine. I nostri vermi che devono farsi il bozzolo della loro propria pelle, non sono soggetti a nissune mute: prendono dunque tutto il loro incremento senza mutare la pelle. Quella, che li ricopriva quando nacquero ha tutto il tempo di fortificarsi, di assodarsi, e di acquistarsi il grado di consistenza, che la metterà in istato di servire un giorno di guscio all'insetto. Io ho avute molte occasioni nel corso di quest'Opera, d'insistere sopra la saviezza, colla quale si deve usare dell'*analogia*: se noi giudicassimo nel nostro insetto per questa strada, penseremmo, che immediatamente dopo che tutte le sue membrane si sono staccate dalla pelle del verme, egli rivestisse la forma di *ninfa*, o almeno quello, che avviene a tanti altri insetti, che passano per questo stato *medio*. Dacchè eglino hanno abbandonato il loro primo involuppo, sembrano vere ninfe, e ci lasciano vedere distintamente sotto questa nuova forma, tutte le parti proprie della *mosca*. Il Sig. de Reaumur c'insegna, che la natura non procede in questa maniera risguardo all'insetto, di cui noi parliamo: ella fa variare secondo la bisogna le sue procedure, ed arrivare al medesimo fine con giri molto diversi. Non attendiamo dunque ad indovinarla; ma interroghia-

mola com'ella vuol esserlo. La Storia Naturale è la miglior Logica, perchè ella ci istruisce con esempi molto luminosi. Apriamo con attenzione la specie di guscio, nel quale l'insetto è ferrato. Invece di una vera *ninfa*, che noi speriamo trovarvi, non vi troveremo che una piccola massa di carne bislunga, albiccia, e sopra la quale non scorgeremo neppure in maschera il minimo vestigio di membra e di organi. Lungi dunque dal trasformarsi in ninfa l'insetto, si è trasformato in *palla bislunga*, nome che il Sig. de Reaumur ha dato a questa specie di trasformazione. Ma almeno l'insetto si produrrà egli in *ninfa* nel momento ch'egli si spoglierà di questo sacco, che gli dà la figura di una *palla bislunga*? La maggior parte degli insetti che passano per uno stato *medio*, la rivestono tutta intera nel momento che si spogliano del primo loro inviluppo. Qui ancora bisogna abbandonare l'analogia, e ne fummo già avvertiti da ciò ch'è precèduto. Per gradi assai noti, l'insetto passa dallo stato di *palla bislunga* a quello di *ninfa* propriamente detta. Se si aprono di giorno in giorno molti di questi gusci o bozzoli, ecco ciò che vi si scoprirà. Al fine di due o tre giorni, si vedranno delle gambe cortissime, che nasceranno dalla parte anteriore della palla. Il giorno seguente incominceranno a vedersi le ali, e le gambe estendendosi di vantaggio, si accosteranno alla parte posteriore della palla. Un altro giorno si vedrà l'estremità della tromba della mosca; dopo comparirà tutta la tromba, e dipoi la seguirà la testa. Finalmente si apriranno altri gusci, dove si troverà una ninfa, tutte le parti della quale avranno la grandezza, e la situazione propria di questo stato *medio*. Un partigiano dell'*epigenesi* crederebbe veder qui una ninfa che si formi appoco appoco, che cresca *per apposizione*, come ha creduto che crescano il feto della cerva, il pulcino, e pressio a poco il feto umano. Ma rimane sempre vero, che

che l'*epigenesi* non è una legge generale della natura, poichè in questo caso medesimo che le sembra tanto favorevole, abbiamo delle prove dirette dell'*evoluzione*, e delle prove, alle quali non si attenderebbe. Mentrechè l'insetto è sotto la forma di *palla bislunga*, e che non mostra il minimo vestigio delle parti di ninfa, si possono obbligar queste parti a prodursi alla luce: si può far nascere quando piace una ninfa, che ancora sembrava non esistere. Per far questo non bisogna altro che pressare con precauzione l'estremità posteriore della palla; nel medesimo tempo si vedrà escire da una cavità, posta nella sua estremità anteriore, tutte le parti di una ninfa, che maggiormente si prolungherà a misura che si accrescerà la pressione. Elleno dunque preesistevano alla loro apparizione naturale, o forzata; elleno erano dunque contenute, e complicate nell'interno della palla, presso a poco come un fiore nel suo bottone. In una parola, segue di queste parti, per servirmi della comparazione del Sig. de Reaumur, come de' diti di un guanto, che si fossero fatti rientrare nella mano del guanto, e che dopo si ritirassero fuori. Se ci fosse possibile di usarne ancora riguardo a' piccoli bottoni e corpi *oviformi*, da quali nascono diversi polipi, vi ha luogo di presumere, che noi ne faremmo similmente uscire tutte le parti proprie di questi insetti, e che affretteremmo in questo modo il momento della pretesa loro nascita. Io riporterò adesso un'esperienza sopra le *palle bislunghe*, che metterà questa verità nella più chiara luce.

323. *Spiegazione della mosca-aragna. Nuovo argomento in favore dell'evoluzione.*

Io ritorno adesso alla produzione triforme della *mosca-aragna*, a quella specie d'uovo di una grossezza smisurata, donde nasce una mosca tanto grossa come il padre e come la madre. Io ho avvertito, questa produzione non essere un vero uovo: qual è dunque la

sua natura? Noi non possiamo saperlo, che dall'osservazione, e dall'esperienza. In uno di questi corpi *oviformi* aperto quattro giorni avanti quello, nel quale la mosca avrebbe dovuto naturalmente uscirne, il Sig. de Reaumur (1) ha trovato una *ninfa*, tutte le parti della quale erano distintissime, alle quali mancava poca consistenza. Le specie d'uovo di cui parlo, ha una delle sue estremità più appuntata dell'altra: l'estremità più appuntata, è l'anteriore: l'estremità posteriore termina in due corni mozzi. La *ninfa* facilissima a riconoscersi per una *ninfa di mosca-aragna*, era posta in maniera, che la sua testa corrispondeva all'estremità anteriore del guscio, e le sue parti deretane erano appoggiate sopra l'estremità opposta: nella estremità anteriore vi è una specie di berretta, che si leva facilmente, e che è stata provveduta per l'uscita della mosca. Noi dunque siamo certi, che vi è un tempo, nel quale il corpo *oviforme*, di cui noi ricerchiamo la natura, contiene una vera *ninfa*. Questa *ninfa* è stata senza dubbio un *verme*: questo verme si farebbe egli trasformato in *palla bislunga*? Il corpo *oviforme* farebb'egli questa *palla bislunga*, o per parlare più esattamente conterrebbe egli l'insetto sotto questa forma? Per tentare di scoprirlo, il Sig. de Reaumur ha aperte delle uova un giorno o due dopo il parto, e non vi ha trovato dentro, che un liquido albiccio quasi fluido, e nel quale non ha potuto distinguere alcuna specie di organizzazione. Quando egli ha aperti di questi gusci più tardi, ha osservato, che il detto liquido era meno fluido, e che avea ancora qualche consistenza; ma sempre senza nessuna apparenza di organizzazione. Finalmente, in qualunque tempo ch'egli abbia aperti degli altri gusci, non è mai

(1) *Memorie per servire alla Stor. degli Insetti*. Tom. VI. Mem. IV. pag. 587. e segg.

mai arrivato a scoprirvi un *verme*. Così non si trova ne' nostri gusci partoriti di fresco, che un liquido più, o meno fluido, e dove non si scorge segno alcuno di parti proprie ad un verme, o ad una mosca. Qual lume possiamo noi sperare di trarne da un simile liquido? Come la natura sviluppa ella questo piccolo caos, ne fa uscire alla luce un tutto organizzatissimo? Noi vediamo, che una vera ninfa occupa il luogo di questo liquido: pochi giorni bastano perchè questa ninfa termini di formarsi, e perchè acquisti un certo grado di consistenza. Poco avanti non era, che una sostanza lattiginosa, o caciosa: la natura dunque forma un insetto come noi forniamo un cacio? O per ricorrere ad una Fisica meno grossolana, le molecole organiche sparse nel liquido, riunendosi in virtù di certe forze di *rapporto*, producono una testa, degli occhi, una tromba, delle gambe ec.? Non v'ha che un momento, che premendo l'estremità posteriore di una *palla bislunga*, noi ne facciamo uscire tutte le parti esteriori di una *ninfa*, che parevano non esistere. Quando si apre una di queste *palle* immediatamente dopochè l'insetto ha terminato di staccarsi dalla pelle di verme, non vi si trova che un fluido onninamente simile a quello, che noi abbiamo osservato ne' gusci delle *mosche aragne*. Sembra che l'insetto si sia totalmente liquefatto, che si sia risoluto in una sostanza puramente lattiginosa; almeno egli è certo, che la lente medesima non può farvi scoprire in questo liquido indizio alcuno di organizzazione. Contuttociò ella è organizzatissima; che dico io! Ella è una vera ninfa mascherata sotto l'ingannevole apparenza di un fluido. Un mezzo semplicissimo mette sotto i nostri occhi tutte le parti di questa *ninfa*, e la ridicola *epigene*si fuga per sempre nelle tenebre delle scuole, donde un moderno Autore avea preteso di trarne a forza di gusto, e d'invenzione. Io ho parlato nell'Articolo 167. della traspirazione insensibi-

fibile, che dee farsi nella *crisalide* perchè la *farfalla* sia in istato di comparire alla luce. Io ho dimostrato come accelerando, o ritardando questa traspirazione, si abbrevia, o si prolunga a piacere la vita dell'insetto, nel tempo, ch'egli è contenuto ancora nell'inviluppo di *crisalide*. Tentiamo di affrettare molto più la traspirazione, che dee farsi altresì nelle nostre *pal- le bislunghe*: facciamole cuocere alcuni minuti nell'acqua calda, e dopo apriamole. Che vi troveremo noi? Tutto il liquido è sparito, ed una vera ninfa ha preso il suo luogo. Questa ninfa non si è formata in pochi minuti; ma le sue parti per l'avanti troppo molli, troppo adacquate, e come sciolte scappavano a' nostri occhi, e a' nostri strumenti. Diamo una simile preparazione a' nostri gusci delle *mosche-aragne*, ed avremo precisamente i medesimi risultati. Il liquido si condenserà, e noi vedremo comparire ben tosto una *ninfa* con tutte le parti, che la caratterizzano. Questo guscio smisuratamente grosso relativamente alla madre, che l'ha messo alla luce, dunque non è propriamente un *uovo*. Egli è l'insetto medesimo che ha rivestito la figura di *palla bislunga*, e che si è fatto questo guscio della sua propria pelle. Ma egli ha patita questa metamorfosi nel ventre medesimo della sua madre, e vi ha preso tutto il suo incremento, ed ecco la vera maraviglia, che io avevo a descrivere. Allorchè si sono divisi gli animali in *vivipari*, ed in *ovipari*, si è creduto, che queste due classi contenessero tutto il regno animale. I *gorgogli* sono stati i primi a dimostrarci l'insufficienza di una divisione tanto facile, e comoda. Dopo sono comparsi i polipi, e ci hanno invitati a formare una classe di *ramipari*, ed un'altra di *bulbipari*. La nostra *mosca-ragna* esige, che noi facciamo una quinta classe, la quale chiameremo col Sig. de Reaumur, la classe de' *ninfipari*. Troppi fatti ci hanno insegnato, che non v'è una sola eccezione nella natura, benchè io non possa

possa dire, che si scopriranno un giorno molti altri insetti, che dovranno collocarsi sotto la classe de' ninfipari. Bisognerà ancora creare delle nuove classi; poichè la Storia Naturale non fa, che nascere. La Storia Naturale è un paese, del quale noi appena conosciamo le frontiere, ed di cui non si ha cura di stenderne la pianta. I gusci delle mosche-aragne alcune ore dopo partoriti, hanno già una figura molto costante, ch'è quella delle uova ordinarie. Non lasciano il minimo sospetto, che non siano esse medesime veri animali. Ma quando si esaminano immediatamente dopo nate, vi si vedono de' movimenti, che scoprono la loro natura. La loro estremità più appuntata si allunga da un tempo ad un altro, e prende la figura di una papilla conica; dopo si scorta per allungarsi di nuovo: si osservano de' movimenti analoghi sopra le parti laterali del guscio, ma appoco appoco questo guscio s'indura, e cessa ogni movimento. Questi movimenti pare, che tendano a staccare l'insetto dalla sua prima pelle, da quella di *verme*. Noi non conosciamo ancora nissuno insetto che debba crescere dopo che ha rivestito una volta lo stato di ninfa, o di crisalide *propriamente dette*. Tutti gl'insetti, che si trasformano prendono il loro ultimo incremento sotto la loro prima forma di *verme*, o di *bruco*. Prima di diventare *palla bislunga*, prima di rivestire lo stato di *ninfa*, la nostra mosca-aragna è dunque passata probabilmente per lo stato di *verme*. Io ho detto, che non v'è alcun tempo nel quale si possa arrivare a scoprire un verme nel guscio partorito a tempo. Il Sig. de Reaumur prese l'affunto di cercarlo dal ventre della madre. Aprì delle mosche in diversi tempi e visitò con attenzione il loro interiore. „ In alcune; „ dic'egli, (1) ho trovato un corpo del tutto bian- „ co, che avea già la figura, che ha il guscio, che è „ nato,

„ nato, quantunque non avesse la metà della gros-  
„ fezza di quest'ultimo. Questo corpo non si rasso-  
„ miava dunque in niente per la sua figura a' ver-  
„ mi più conosciuti, e non mi è parso capace di al-  
„ cun moto progressivo. Il nome di verme non gli  
„ era forse meno dovuto. La natura, a cui è pia-  
„ ciuto molto di variare le figure degl'insetti, può  
„ aver dato ad un verme quello di un uovo; ella  
„ ne ha prodotti di quelli, che sono incapaci di mu-  
„ tare luogo; non ve n' ha alcuno a cui fosse più  
„ inutile il muoversi, quanto a quelli, che devono  
„ cessare di essere vermi, avanti di uscire fuori del  
„ corpo della loro madre “. I corpi oviformi di dif-  
„ ferenti grossezze, che il Sig. de Reaumur ha trovati  
nell'interiora delle mosche aragne, erano contenuti  
in un canale membranoso, dilatabilissimo, e che si  
può risguardare come l'*ovidutto*, e che non ha dal-  
la sua origine, che il diametro di un filo sottilissi-  
mo. A questa parte sottile del canale vanno a ter-  
minare due altri canali, in ciascuno de' quali il nostro  
illustre Osservatore ha scoperto un piccolo corpo bian-  
co, di figura cilindrica, e le due estremità di esso  
erano appuntate. Egli conghiettura con verisimiglian-  
za, che i detti corpi dovessero venire a prendere il  
luogo del guscio, che la mosca avrebbe partorito a  
suo tempo, e che essi avrebbero così somministrata  
materia a de' nuovi parti successivi. La loro figura  
indicava abbastanza ch'essi erano piccoli vermi, che  
doveano prendere il loro ultimo incremento, e tras-  
formarsi nell'*ovidutto*. Egli è vero, che non si vede-  
va loro nè testa, nè bocca: ma per quanti differenti  
mezzi la natura non può ella nutrire un essere orga-  
nizzato? Ella nutrisce forse questi vermi singolari,  
come nutrisce le uova degli uccelli nelle loro ovaje.  
Tale è il preciso delle scoperte del Sig. de Reaumur  
sopra la *mosca-ragna*; al conto dettagliato ch'egli  
medesimo ne ha reso nelle sue *Memorie*, ha aggiun-

to una breve esposizione di alcune delle mie osservazioni (1). Siccome il fatto è fin qui unico, e non è ancora sufficientemente schiarito, io credo dover estrarre da' miei giornali tutto quello, ch'essi contengono di più essenziale sopra questo soggetto, e porli qui sotto gli occhi de' miei Leggitori.

324. *Osservazioni dell' Autore sopra la mosca - ragna.*

Verso la fine di Agosto nel 1741. osservando attentamente colla lente un guscio che una mosca-aragna partoriva in mia presenza, viddi distintamente l'estremità più appuntata del guscio, profundarsi, e rialzarsi alternativamente, diventare ora concavissima, ed ora convessissima per diverse volte. Questa estremità avea una specie di corta appendice, che partecipava di questi movimenti, e che io supporrei essere l'estremità de' vasi, che portavano il nutrimento all'embrione quando era ancora ferrato nel ventre della sua madre. Continuando ad osservare viddi de' movimenti analoghi sopra le parti laterali del guscio. Gran parti si affondavano, e si alzavano alternativamente nel medesimo modo. Si sa, che la maggior parte degl'insetti respirano per alcune piccole aperture poste sopra le parti laterali del loro corpo, e che si chiamano *stimate*. Il baco da seta, e tutti i bruchi hanno diciotto di queste bocche, o *stimate*. Quando si ferrano dal grasso l'insetto muore: questo si sa. Mentrechè il guscio della nostra mosca si dava i movimenti di cui io parlo, e mentrechè le sue parti erano più affondate, io ho veduto pulitissimamente de' piccoli fori, delle piccole fossette regolarmente separate come lo sono le *stimate*. Dappoichè le parti laterali del guscio si rialzavano, queste fossette onninamente sparivano. Ad ogni *stimmata* di un bruco,

ter-

---

(1.) Tom. VI. pag. 593. e 594.

termina un pacchetto di vasi, di un bianco color d'argento, formati di una lama sottile rivoltata spiralmente nella maniera di un ordigno ad anelli. Queste sono le *trachee*; un lungo vaso della medesima natura va da un'estremità all'altra dell'animale, e questo è il tronco principale delle trachee; vi è da ogni parte un simil tronco, e tutte queste trachee si dividono, e si suddividono in mille maniere per distribuirsi in tutte le parti; dimodochè l'insetto sembra essere tutto polmone. Risguardando obliquamente il nostro guscio, e sempre colla lente, io ho scoperto sopra le parti accosto a queste fosse, che io prendo per *stimate*, un vaso, che mi è stato facile il riconoscerlo al suo colore, e al suo lustro, per un tronco di trachee. Egli si dividea quà, e là in un infinità d'altri vasi molto più piccoli, e che si dividevano essi medesimi in altri più piccoli ancora. Il tronco principale di queste trachee andava a terminare ad uno de' piccoli corni posti all'estremità posteriore del guscio. Egli avea là un diametro maggiore che altronde, e si diminuiva insensibilmente a misura, ch'egli si accostava all'estremità opposta. Queste particolarità, e particolarmente i movimenti da me descritti, provano abbastanza, che questo guscio sia veramente *animale*, e che non si rassomigli niente a quelli, che si fabbricano tante specie di bruchi, ed in particolare il baco da seta presso alla loro trasformazione. Ma io posso dire di più: ho veduto questo guscio darsi de' movimenti simili a quelli, che si darebbe un verme ritondo, e senza gambe, che si sforzasse di mutar luogo. Io l'ho veduto rovesciarsi sopra una delle sue parti, riprendere dopo la sua prima situazione, e ripeter molte volte questi bilanciamenti. Osservando questo guscio colla lente colla maggiore attenzione possibile, ho veduto nel suo interno delle linee circolari separate, come sarebbero quelle, che segnaessero la congiunzione degli anelli di un insetto.

Que-

Queste linee avevano la loro concavità rovesciata verso l'estremità posteriore del guscio. E questo non permetteva di dubitare, ch'elleno non fossero le incisioni annulari di un insetto posto nel guscio, allorchè le parti di questi si affondavano, esse diventavano trasparenti. Nel ritirarsi allora l'insetto lasciava apparentemente più libero il passo alla luce a traverso le pareti dell'inviluppo. Nell'interno di alcune mosche a due ali, il corpo delle quali è mezzo trasparente, si vede uno spettacolo, che fissa piacevolmente l'attenzione. Sono piccole masse di tenui nubi, che vanno parallelamente l'une all'altre, e che vanno costantemente dall'estremità anteriore del corpo all'estremità opposta. Il Sig. de Reaumur (1) ha trattato con molta profondità questo piccolo fenomeno, ed ha provato, che procede da un'illusione d'ottica, cagionata dal moto de'due gran sacchi polmonari posti nella parte anteriore del corpo della mosca. L'interno de'gusci che le nostre mosche aragne partoriscono in tempo, mi ha fatto vedere il medesimo fenomeno, che probabilmente dipendeva dalla medesima cagione. Le piccole masse nuvolose mi è sempre parso, che siano portate da un moto uniforme dall'estremità posteriore all'anteriore. Non ci scordiamo, che l'estremità anteriore è quella, alla quale corrisponde la testa dell'insetto. Li gusci partoriti di fresco sono bianchi, ma prendono presto un colore giallo, al quale succede un colore di un rosso marrone; questo rosso appoco appoco s'imbrunisce, e diventa un nero assai bello. Dacchè i gusci incominciano a perdere il loro primo colore, acquistano un'opacità, che non permette di vedere più nel loro interno. Io pensai di ritardare i progressi dell'opacità, e che vale il medesimo, dell'indurazione col mettere il guscio nell'acqua.

(1) *Mémoires sopra agli Insetti*. Tom. IV. pag. 264. e seguenti.

acqua. Subito cessò ogni movimento, e non viddi comparire alcun sonaglioddi aria. Verso la fine di un ora levai ilguscio dell' acqua; la piccola appendice non tardò molto a riprendere i suoi moti ordinarj, e le masse nuvolose comparvero di nuovo. Mentrechè il guscio era immerso nell' acqua, osservai che le parti restavano trasparentissime. L' insetto, che allora era in uno stato di contrazione, occupava meno luogo in questa specie di cassettina, e la luce traversiava più liberamente le parti. Immersi di nuovo il guscio nell'acqua, e ve lo lasciai circa tre ore, ed avendolo dopo levato viddi ricomparire le masse nuvolose, il cammino delle quali sempre regolare, si è fatto, secondo l'ordinario, dall' estremità posteriore verso l' anteriore: ma la piccola appendice non si mosse in modo alcuno. Questa volta ebbi il piacere di assicurarmi dell' esistenza delle *stimmate* del guscio. Io le ho designate quì sopra col termine di *fossette*, ed ho detto, che queste fossette non erano visibili, che nell' istante nel quale le parti del guscio si profondavano: e le vedevo sparire allorchè il guscio riprendeva la sua convessità naturale. Non è seguito il medesimo nel caso particolare di cui parlo al presente. Il guscio non fidava più il minimo movimento, e le sue parti erano del tutto rotonde: contuttociò si distinguevano benissimo colla lente le fossette. La loro situazione, il loro ordine simetrico, la loro figura ovale, e il loro gran diametro posto perpendicolarmente all' asse del guscio, le facevano conoscere per vere stimmate. Noi abbiamo dunque una prova diretta, che l' involucro, di cui questo guscio singolare è formato, apparteneva ad un verme, e ch' è stato per qualche tempo la pelle medesima di quel verme, e questa prova leva tutti i dubbj sopra la natura di questo corpo oviforme. In un guscio partorito avanti tempo; che non avea la metà della grossezza naturale, viddi il moto delle masse nuvolose; ma quello che mi par-

par-

parve estremamente rimarcabile, che si faceva in questo in senso contrario, vogliodire, dall'estremità anteriore alla posteriore. Osservai la medesima cosa dopo aver tenuto il guscio per tre ore immerso nell'acqua. Raccontando questo fatto sulla mia fede, il Signor de Reaumur aggiugne ciò che segue.

„ Noi abbiamo riportato come un fatto singolare,  
 „ che la circolazione de' liquori ci era paruto farsi  
 „ nella farfalla in un senso contrario a quello, che  
 „ si faceva nel suo corpo allorchè era bruco. La  
 „ circolazione delle masse nebulose, che nell'uovo  
 „ partorito in tempo da un moto opposto a quello,  
 „ che ha nell'uovo non partorito in tempo, sembra  
 „ dunque provare, che l'uovo partorito in tempo  
 „ contenga un insetto, che ha mutato stato; e que-  
 „ sto cangiamento non ha potuto essere che quello  
 „ di verme in palla bislunga. „ Allorchè questo  
 grande Osservatore, la di cui memoria sarà sempre  
 gradita, fu cortesemente sforzato a farmi parte della  
 sua scoperta sopra la mosca-aragna, in una delle sue  
 Lettere in data de' 30. Aprile 1741.; egli mi parlò  
 del guscio ch'è in quistione come di un vero uovo.  
 Pensava allora, che non fosse un verme. Io non tardai  
 ad osservarlo da per me medesimo, poichè a ciò fare  
 egli cortesemente m'invitava. Io scopri le masse nu-  
 volose, e gli scrissi il 28. del seguente Luglio, il  
 sospetto, ch'esse mi aveano fatto nascere. Il volume  
 di queste memorie non venne alla luce che l'anno  
 seguente. *Quest' uovo dicevo io al mio illustre amico,  
 farebb' egli meno un uovo, che una specie singolarissima  
 di verme, o una specie altresì singolare di ninfa? Quelle  
 masse nuvolose indicherebbono elleno una circolazione?  
 O non è che una illusione di ottica analoga a quella,  
 che avete voi osservata in alcune mosche? Io credo  
 aver veduto in una delle articolazioni delle gambe della  
 nostra mosca, una vera circolazione, ma mi sono aste-  
 nuto dal pronunziare ancora sopra questo soggetto. Io*

mi spiegai più precisamente in una Lettera in data de' 23. Giugno del 1742. e vi assomigliai il nostro guscio ad una *palla-bislunga*. Il Sig. de Reaumur adottò egli medesimo questa idea, e la verificò con molte curiosissime osservazioni, delle quali ho dato qui sopra il preciso. Io invito i naturalisti a trattare con maggior profondità un soggetto, che tocca sì d'appresso la teoria della generazione.

325. *Uova che crescono dopo essere state partorite. Galle delle piante: e come si producano. Uova della mosca fatta a sega.*

Dappoichè un uovo fecondo è stato partorito, l'embrione vi prende un accrescimento relativo a quello, che acquista il feto nella matrice: ma il guscio dell'uovo non è dilatabile come la matrice. Noi non siamo ancora assuefatti a formarci un'idea di un uovo che cresca: contuttociò ve ne sono che crescono, e crescono molto. Bensì che il loro guscio non è crostaceo, come è quello dell'uova degli uccelli, delle farfalle, e di molti altri insetti. Le uova delle quali io parlo sono puramente membranose; non si deve inferire da questo, che tutte le uova membranose crescano; quelle di molte altre specie sono tali, e non crescono; quì dunque v'è un'eccezione rimarcabile ad una regola, che si giudica generale. Tutto il mondo conosce le galle, che nascono sopra diverse parti delle piante. La loro struttura, la loro consistenza, la loro tessitura, le loro proporzioni, il loro colore variano quasi in infinito, ed offeriscono agli occhi dell'osservatore mille interessanti particolarità. Quando Malpighi non avesse fatto, che il suo *Trattato delle galle*, non sarebbe meno l'immortale Malpighi. Il Sig. de Reaumur, suo eguale, che ha fatte tante scoperte, e ne ha perfezionate tante altre, ha consideratamente aggiunto a quelle del Naturalista di Bologna sopra queste escrescenze de' vegetali. Si può consultare la bella Memoria, che termina il terzo volume della sua

Sto.

Storia degli insetti. Le galle, di cui si tratta devono tutte la loro origine alla puntura di un insetto, che appartiene per l'ordinario alla classe delle mosche. Coll'ajuto di una specie di trapano, fa un'incisione in qualche parte della pianta; vi depone un uovo, che si trova subito ferrato in una galla nascente. Nel uscire dal ventre della mosca, quest'uovo è di una picciolezza estrema, al fine di un certo tempo, acquista una grossezza considerabile, e la galla ha già preso tutto il suo incremento prima che nasca il verme. Si può dunque paragonare quest'uovo alle membrane, che involuppano il feto, che sono capaci di cedere, e di estendersi in tutte le parti durante il tempo, che il feto cresce. Il nostro uovo cresce anch'esso; egli ha senza dubbio nelle sue parti esteriori de' vasi, delle specie di radici, che poppano i sughi, che concorrono nella cavità della galla. Questa galla rispetto all'uovo fa lo stesso, che la matrice rispetto al feto. Malpighi credea, che la produzione della galla fosse dovuta principalmente ad un liquore corrosivo, che la mosca introduce nella piaga. Il Sig. de Reaumur ha provato, che non è necessario ricorrere all'intervento di un simil liquore, per render ragione dell'incremento della galla. Egli l'attribuisce alla soprabondanza de' sughi nutritizj, che cagiona la continua azione de' vasi assorbenti dell'uovo. Essi determinano così il sugo a portarsi in maggior quantità verso la galla: e non ne bisogna di vantaggio perchè cresca più essa delle parti vicine? Aggiungete, se voi volete, a questa causa meccanica il calore medesimo dell'uovo, e paragonatelo ad un piccolo fuoco posto nel centro del tumore. (1) Nascono delle galle sopra tutte le parti delle piante, e particolarmente sopra le foglie. La sola quercia ne fa vedere di tutte le spezie. Ma  
vi è

(1) *Mémorie pour servir à l'histoire des Insectes.* Tom. III. pag. 501.

vi è una mosca, che non confida le sue uova, che a' rami, ed in quelli del rosajo suol depositarle. Valisnieri l'ha resa celebre colla Storia, ch'egli ne ha pubblicata, (1) e che il Sig. de Reaumur ha arricchita di nuove osservazioni. (2) I rami, ne quali la mosca ha depositate le sue uova, si distinguono da alcune piccole elevazioni bislunghe, che si vedono sopra la scorza. Le uova sono introdotte nel legno medesimo. Lo strumento, ch'è stato dato alla mosca per formare i tagli, è di una tale struttura, che non lascia di ammirarsi: egli ha le condizioni di tre diversi strumenti, di una sega doppia, di una lima, e di un trapano. Mi dispiace che il mio piano non ne esiga la descrizione, e la maniera, che la mosca lo mette in opera. Con uno strumento così composto, e nientemeno semplicissimo nella sua composizione, essa fa qualche volta sino in 24. tagli, o loggette nel medesimo ramo. Li distribuisce simetricamente, e partorisce in ciascheduno un uovo. Se si paragonano le uova, che da qualche tempo sono state partorite, con quelle che sono partorite di fresco, si troveranno le prime assai più grosse dell'altre. Poichè queste uova crescono realmente nella loggetta, come quelle delle galle crescono nel centro delle medesime galle. A misura che le uova della mosca a sega prendono maggiore accrescimento, forzano le pareti delle loggette ad innalzarsi; la loro capacità cresce per tutte le parti, ed ecco l'origine di queste piccole escrescenze, che si osservano sopra il ramo. Io ho parlato quì dietro la scorta del Sig. de Reaumur: (3) nientemeno mi sembrerebbe più naturale l'attribuire queste piccole escrescenze alla medesima causa produttrice delle galle. E  
cosa

(1) *Galleria di Minerva.*

(2) *Mem. sopra gl' Insetti* Tom. V. pag. 114. e segg.

(3) *Tom. V. pag. 122.*

cosa dura a comprendersi, come un uovo puramente membranoso possa forzare delle parti legnose, e molto inflessibili ad innalzarsi, ed a prendere una convessità molto sensibile. Un'altra mosca del medesimo genere, depone le sue uova sopra una semplice foglia di vetrice. Elleno crescono, e il loro accrescimento è tanto considerabile, che l'Autore avendo paragonato di queste uova, il verme delle quali era sul punto di nascere, con altre uova partorite di fresco, egli ha veduto, che le prime erano più grosse il doppio per lo meno dell'altre. (1) Il Sig. de Reaumur conghiettura, che l'accrescimento delle uova sia dovuto ai succhi, che trasudano dalla foglia, e che penetrano nell'uovo, come in una specie di piccola *placenta*, aumentano le loro dimensioni per tutte le parti. Può essere ancora, che l'uovo abbia de' vasi aspiranti, che si adattino in qualche modo ai pori escretorj della foglia. Se questa si stacca dall'albero, e che si lasci seccare, le uova si corrugano, e gli embrioni periscono, lo che non accaderebbe in simil caso alle uova degli insetti; questa esperienza prova la verità della conghiettura, che ho accennata.

326. *Uova, che contengono più embrioni.*

Ogni uovo nell'ordine naturale non contiene che un solo embrione, e questo si verifica delle uova di tutti gli ovipari, che noi conosciamo. Bisogna niente-dimeno eccettuare delle uova singolarissime che l'Illustre Sig. Folkes, Presidente della Società Reale, ha scoperte, e l'osservazione delle quali egli ha comunicata al Sig. Baker, che l'ha riportata nella sua *Storia del polipo* pag. 99. e 100. della Traduzione Francese. Il Sig. Folkes ne ha trovate moltissime nel fango de' rigagnoli. Elleno sono eguali in grossezza al capo di uno spillo. Sono di color bruno, e rivestite

K 3

di

(1) Ibid. pag. 117.

di un guscio crostaceo , a traverso del quale l'Observatore vide distintamente col Microscopio de' piccioli vermi viventi. Gli obbligò a venire alla luce, rompendo cautamente il guscio, e contò allora con ammirazione otto, o nove piccioli vermi, che uscivano dallo stesso uovo. Tutti erano benissimo formati, e si muovevano con una mirabile agilità. Ciascuno di essi avea un involuppo proprio, estremamente sottile, e trasparente, il quale egli strappò dappoichè ebbe rotto il guscio. Si vedevano di questi involuppi, che galleggiavano sopra l'acqua, ed altri, che restarono attaccati agl'insetti, i quali provavano dell'incomodo a sbrigarfene.

327. *Pipa, o Rospo di Surinam.*

Si era creduto lungo tempo, che il Pipa, o Rospo di Surinam moltiplicasse di una maniera straordinarissima. Si era detto, e ripetuto, che i suoi parti uscivano dal suo dorso, sotto il quale avea molte piccole matrici, dove essi prendevano i loro primi incrementi. Il celebre Ruisch avea descritto tutto questo, ed avealo accreditato colla sua testimonianza. Li Sigg. Folkes, e Baker pareva, che lo avessero confermato. Queste diverse osservazioni non erano pertanto fondate, che sopra apparenze ingannevoli, ed io non ne faccio quì menzione, che per far vedere, quanto bisogna essere scrupoloso nell'esame de' fatti della Storia Naturale. Si era abusato sopra la generazione del *pipa*. Egli partorisce le sue uova, come gli altri animali della sua specie, e dopochè le ha partorite vi si rivolta sopra. Elleno si attaccano così al suo dorso, e si forma intorno una crosta ghiaiosa, che si era presa pel corpo medesimo dell'animale. La pioggia lava questa crosta, e allora le uova cadono.

328. *Fecondità degli animali.*

Li grossi animali sono generalmente molto meno fecondi de' piccioli. I primi non portano che uno, o due feti, gli altri ne portano molti, e sovente delle

le migliaja. Gli *ovipari* sono ordinariamente più piccoli, e più fecondi de' *vivipari*. I feti di questi devono crescere nella matrice; i feti di quelli fuori. La fecondità di alcuni pesci a scaglie è maravigliosa. Una *reina*, un *persico* partoriscono 9. o 10. mila uova, (1) un *merluzzo* 20. mila. La *mollua*, e l'*aringa* non sono meno fecondi. Si può giudicare della fecondità della *mollua* dal gran numero de' vascelli impiegatti annualmente nella pesca di questo pesce. Egli partorisce due volte l'anno, e depone le sue uova sotto l'arena, così nascono più facilmente, poichè il mare non le disperde. (2) Spessi, e numerosi nuvoli di aringhe passano dall'Oceano Polare sopra le coste della Scozia, e dell'Olanda, perseguitate da' grossi pesci, che abitano le voragini di quell'Oceano. Questo piccolo pesce sembra essere una manna preparata dalla Provvidenza pel nutrimento de' mostri marini, e di molti altri pesci, ed uccelli di mare. Finalmente l'uomogli fa la guerra più crudele: molte migliaja d'Olandesi sono occupati annualmente nella pesca di questo pesce. (3) La fecondità d'ogni specie è stata proporzionata ai danni, che minacciavano gl'individui, ed a' mezzi, che aveano di esservi sottoposti. I ragni, le farfalle, diverse specie di mosche ec. partoriscono delle centinaia di uova; li gallinsetti delle migliaja. Io ho parlato di una mosca *vivipara*, la matrice della quale è una vera maraviglia, e che contiene ventimila parti. (4) Le ovaje della *regina-ape* non sono meno ammirabili. Elleno sono distribuite in due pacchetti, poco dissimili da una mataffa, o da un penello; ma le

(1) Scheffer *Piscien Bavario Ratisbonfona Pentas*. Ratisbona 1761. in quarto pag. 34.

(2) *Viaggio di D. Ulloa* Tom. II.

(3) *Vantaggi, e svantaggi della Francia, e dell'Inghilterra* ec.

(4) Articolo 315. nel fine.

le fila di queste mataffe sono tanto sottili, quanto le  
 fila del verme da seta, se non sono più sottili. Con-  
 tuttociò ogni filo è una specie d'intestino, che con-  
 tiene un numero sterminato di uova, la grossezza  
 delle quali diminuisce gradualmente dall'estremità  
 inferiore dell'ovaja fino verso la sua estremità supe-  
 riore; quì le uova sono di una tal picciolezza, che  
 appena si vedono col soccorso de' vetri. Queste uova  
 tanto piccole si rassomigliano più alle uova ordinarie  
 di quelle, che sono più avanzate, poichè la forma bis-  
 lunga di queste sembra imitare quella di un verme,  
 che nasce. L'infatigabile Svammerdam ha osato intra-  
 prendere di numerare i fili di ciascuna mataffa, ed egli  
 crede di averne contati almeno 150. in ciascheduno  
 de' quali egli distingueva 17. uova. Egli sarebbe dun-  
 que arrivato a vedere 5100. uova nell'ovaja della  
 regina-ape. (1) Quanto sarà maggiore ancora il nu-  
 mero di quelli, che gli sono scappati, poichè egli è  
 certo, che una madre-ape mette alla luce 30. 40. o 50.  
 mila mosche! (2) Calcolando sopra le mie esperienze  
 la fecondità de' gorgogli, il Sig. de Reaumur si spiega  
 in questa maniera. (3) „ Se si fa un calcolo grossolano  
 „ di tutti i gorgogli, che possono nascere da un solo  
 „ gorgoglio nel corso di un anno sembrerà, che quando  
 „ non se ne salvasse che un solo nell'inverno in un  
 „ giardino, tutte le foglie degli alberi di quel giar-  
 „ dino non basterebbono per dar luogo a tutti quel-  
 „ li, che nascerebbono da questo solo; la terra mede-  
 „ sima sembra, che ne debba restare ricoperta. Poi-  
 „ chè se si suppone in ciascuno di questi gorgogli  
 „ del sambuco una fecondità eguale a quella de' gor-  
 „ gogli del evonimo, (*volgarmente detto beretta da*  
 „ *cardinale*), ciascuno de' quali mette alla luce nel  
 mede-

---

(1) *Biblia Natura*.

(2) Guardate gli Articoli 297. e 298.

(3) *Mem. sopra gl' Insetti* Tom. VI. pag. 565. e 566.

„ medesimo tempo 90. o 95. piccini, la prima ge-  
 „ neratione di un gorgoglio sarà almeno di 90. picci-  
 „ ni. Se ognuno di questi ne partorisce a suo tempo  
 „ 90. la seconda sarà di 810. gorgogli. La terza sa-  
 „ rà di 8100. moltiplicata per 90. ovvero di 729000.  
 „ gorgogli. Quest'ultimo numero dee ancor'esso es-  
 „ ser moltiplicato per 90. per aver quello de' gorgo-  
 „ gli della quarta generazione, che sarà di 65610000.  
 „ gorgogli, e moltiplicando di nuovo questo nume-  
 „ ro per 90. per avere i gorgogli della quinta ge-  
 „ neratione, questa si troverà di 5904900000. Noi  
 „ ancora non siamo che alla quinta generazione, se  
 „ noi prendessimo tutte quelle, che possono nascere  
 „ da un gorgoglio, che incomincia a partorire nel me-  
 „ se di Aprile, e che non termina, che nel mese di  
 „ Novembre, quante generazioni potrebbero segui-  
 „ re nel corso di un anno, o solamente in sei mesi?  
 „ A metterle al defalco sarebbero più di 20. Ora  
 „ se cinque generazioni hanno prodotto 5904900000.  
 „ di gorgogli, quale innumerabile quantità di que-  
 „ sti piccoli insetti dee nascere da 20. generazioni?  
 „ Ma siamo altresì difesi dalle inquietudini, che po-  
 „ trebbe cagionare una sì grande fecondità, poichè  
 „ sappiamo quanti altri insetti sono occupati gior-  
 „ nalmente a distruggerli per nutrirsene, “ La fe-  
 „ condità di alcune specie di *polipi*, è soprattutto de'  
 „ polipi a *bulbo*, è più sorprendente ancora di quella  
 „ de' gorgogli. Noi abbiamo veduto nell'Articolo 201.  
 „ che da un solo bulbo nascono in 24. ore per divi-  
 „ sioni, e suddivisioni successive, e graduali almeno  
 „ 110. polipi, che tutti possono dar vita nel medesimo  
 „ intervallo di tempo ad una simile successione di poli-  
 „ pi. Il Sig. de Buffon osserva, (1) che gli animali, che  
 „ non producono che un piccolo numero di feti pren-  
 „ dono

(1) *Stor. Nat. Gen. e Part.* Tom. II. pag. 308.

dono la maggior parte del loro accrescimento avanti di essere in istato di generare. Gli animali, al contrario, che moltiplicano molto, generano avanti ancora, che il loro corpo abbia preso la metà, o ancora la quarta parte del loro accrescimento. L'uomo, il cavallo, il toro, sono esempj de' primi, siccome i piccioni, e gli altri uccelli, che non partoriscono, che un piccolo numero d'uova. I Pesci, e le galline sono esempj de' secondi.

## C A P I T O L O VI.

*Scoperte microscopiche del Sig. Needham. Osservazioni sopra queste scoperte.*

329. *Progresso della Storia Naturale dopo l'anno 1740. Riflessioni sopra questo soggetto.*

VEntidue anni sono noi ignoravamo la maniera strana di cui moltiplicano i gorgogli, i polipi, diverse specie di vermi d'acqua dolce, i vermi di terra, le lucciole, e le ostriche di mare, le mosche aragne ec. In meno di quattro anni, noi abbiamo acquistate più idee del tutto nuove sopra il regno animale, di quelle, che se ne fossero acquistate per un lungo seguito di secoli. Appena sono comparsi al Mondo Letterario, Reaumur, Trembley, Sessieu, Lyonnet, che la natura si è fatta un dovere di aprir loro i suoi tesori, e loro scoprire i suoi segreti più nascosti. Al presente, che grazie a' suoi eccellenti osservatori, noi siamo più struiti, non presumeremo nulladimancodi conoscere tutte le maniere, di cui l'animale moltiplica. Noi penseremo piuttosto, che la natura non faccia altro, che incominciare a parlare; perchè non è, per così dire, che un giorno, che ella viene interrogata, come essa richiedeva. I secoli futuri avranno senza dubbio i loro Reaumur, e i loro Trem-

Trembley , a' quali essa compiacerà di rivelare de' nuovi prodigj , e de' maggiori ancora . Tante verità incognite a' nostri antichi , e riservate a' nostri moderni , possono farci credere con qualche fondamento quelle , che scopriranno altri moderni , pe' quali queste saranno di antichi ignorantissimi . Avvi certamente molta differenza dal modo col quale si propagano i polipi a mazzetto , da quello , onde si propagano gli animali , de' quali abbiamo maggior cognizione . Esistono forse degli animalletti , che differiscono molto più risguardo a questo de' polipi a mazzetto , di quel che differiscono questi da un quadrupede , da un uccello , o da un pesce . Quante maraviglie , che la nostra lingua non sarebbe sufficiente a descrivere , non si vedrebbero in questo genere negli animalletti *delle infusioni* , se la loro estrema picciolezza non si mettesse troppo fuori della portata de' nostri migliori microscopj ! Qui incomincia un altro universo , di cui i nostri Colombi , ed i nostri Vespucci non hanno vedute , che le coste , e di cui eglino ci fanno delle descrizioni , che poco differiscono da quelle , che i primi viaggiatori pubblicarono dell' America . Questo mi conduce alle scoperte microscopiche ( 1 ) del Signor Needham , uno di quei moderni Colombi , che avranno la gloria di avere i primi costeggiata questa regione degl' infinitamente piccoli . La novità di queste scoperte , la singolarità degli oggetti , ch' elleno rappresentano , la riputazione molto meritevole del loro Autore , ed il fine , che io mi sono proposto in quest' opera , mi obbligano a darne un estratto . Io mi sono forse troppo trattenuto nel Capitolo VII. del Primo Tomo sopra le osservazioni ,  
che

---

( 1 ) *Sommario delle esperienze fatte ultimamente sopra la generazione , la composizione , e scomposizione delle sostanze degli animali e de' vegetabili . Traduzione dall' Inglese . Questa Memoria è stata inserita nelle " Osservazioni Filosofiche .*

che il Sig. de Buffon ha pubblicate nel medesimo genere. Quelle del Sig. Needham sono molto analoghe ad esse; ma contengono delle particolarità, che le distinguono, e che io ho altrettanto piacere a riportare, quanto fo maggiore stima della sagacità, e de' talenti dell'eccellente osservatore. Noi dobbiammo attristarci, che i suoi occhj abbiano patito nell'attenzione, ch'egli ha dato a sì piccolj oggetti: egli avrebbe riprese le sue curiose ricerche, e le avrebbe portate ad una maggior perfezione.

330. *Scoperte del Sig. Needham sopra gli animaletti delle infusioni.*

*Prima esperienza.* Il nostro Fisico ha piena una caraffa di brodo caldissimo di montone; l'ha sigillata con tanta esattezza, come se fosse stata ermeticamente, e l'ha tenuta nelle ceneri calde. Con questo modo di procedere egli pensa essersi assicurato, che non vi fossero nè uova, nè insetti viventi o nel liquore, ch'egli voleva osservare, o nell'aria, che occupava il circuito della caraffa. Egli nientedimeno ci dice, che questa caraffa formicolò dopo di animaletti di differenti dimensioni. La prima gocciola di liquore, ch'egli osservò immediatamente dopo averla cavata dalla bottiglia, ne conteneva moltissimi; eglino erano perfettamente formati, e tutti i loro movimenti indicavano della spontaneità, e della vita. *Seconda esperienza.* Il Sig. Needham ha ripetuta la medesima esperienza, collo stesso successo, sopra altre sostanze animali, come il sangue, l'orina, ec. *Terza esperienza.* Egli ha paragonati gli animaletti di tutte queste infusioni con quelli, ch'erano nati nelle infusioni della medesima specie, i quali non erano stati nè riscaldati, nè ferrati, ed è rimasto convinto, che gli uni, e gli altri sono del tutto simili. *Quarta esperienza.* Nelle infusioni de' germi di mandorle, e di diversi grani, egli ha osservato dopo otto giorni de'

leg-

leggieri movimenti. Un atomo distinto si staccava sovente da un ammasso di simili atomi, e se ne allontanava un poco. Quindici giorni dopo, che i germi, ed i grani aveano incominciato ad infradiciare, il liquore si vedea popolato di un infinità di atomi moventi, eccessivamente piccoli. Le infusioni del grano pestato gli hanno fatto vedere innumerabili filamenti, ch'erano, secondo esso, perfetti zoofiti presso a produrre, e che si movevano di per se medesimi; molti de' quali erano simili alle collane di perle, o a' rosarij. Eglino non eranò di lor natura animaletti microscopici, ma n'erano il principio. *Tutta la sostanza, dic' egli, dopo una certa separazione de' sali, e delle parti volatili, si è divisa in filamenti, i quali hanno prodotte tutte le diverse specie di animali microscopici.* Il nostro dotto Osservatore aggiugne una cosa assai straordinaria, e che merita la maggiore attenzione. Io la riporterò ancor questa colle sue proprie parole. *Questi medesimi animali microscopici, dopo essersi radunati al fondo del vetro, ed aver perso ogni movimento, si sono ridotti di nuovo ad una sostanza filamentosa, ed hanno prodotto de' zoofiti, e degli animali di una specie più piccola.* Si deve reiterare questa operazione, fintantochè i filamenti, e gli animaletti, degradandosi continuamente, arrivano ad una tal picciolezza, che non sono più percettibili al microscopio. *Quinta esperienza.* L'ingegnoso Fisico ha saputo variare le sue procedure. Invece di fare infradiciare i grani, egli ha tagliato loro l'estremità, per impedir loro il germogliare; gli ha posti perpendicolarmente per un'estremità in un fortilissimo sughero, che galleggiava sopra l'acqua. Questi grani così umettati subito hanno germogliato per la loro estremità inferiore de' lunghi, e numerosi filamenti, che si estendevano nell'acqua, e ch'erano visibilissimi colla semplice vista. Egli ha tagliati di questi filamenti, e ne ha messi i frammenti in piccoli vetri con-

cavi,

cavi, ripieni d'acqua, erano vetri da occhiali quelli, che gli somministravano quei bacini comodi, e si bene adattati alla picciolezza, ed alla natura degli oggetti, ch'egli si proponeva di seguitare. I frammenti, che galleggiavano sopra l'acqua di questi piccoli bacini, sono diventati per esso isole microscopiche, ed incantate, che si sono popolate sotto i suoi occhi di una moltitudine innumerabile di abitanti. In una parola, e per ispiegarmi in termini meno figurati, egli ha veduto ricomparire quì tutti i fenomeni delle infusioni. Egli ha veduto prendere a' filamenti delle nuove forme, animarsi, e produrre degli animaletti simili in tutto a quelli delle infusioni ordinarie. Ciascheduno certamente avrebbe presi questi filamenti de' grani umettati, per una vera *muffa*, e conseguentemente per una produzione puramente vegetale. Il Sig. Needham ne fa come si vede, de' veri *zoofiti*, ed egli pensa, che tutte le muffe sieno precisamente della medesima natura.

*Sesta esperienza.* Avanti d'incominciare a tentare queste esperienze, l'Autore avea veduti de' simili filamenti nella farina del grano *volpato*. Egli avea osservato questa farina corretta animarsi, tutte le volte ch'egli la bagnava: e quando la lasciava seccare delle settimane, e de' mesi, bastava, che vi spandesse una gocciola d'acqua per rianimarla, e per vedervi di nuovo lo spettacolo interessante, che ella gli avea presentato, mentrechè tuttora era fresca, o *bagnata*. Egli paragonò allora i filamenti di questo grano all'anguille dell'acqua dolce. Queste anguille microscopiche non si movevano con moto progressivo; ma si attorcevano spiralmemente sopra loro medesime. Elleno si movevano così in diverse maniere, e questa specie di moto oscillatorio non cessava se non quando tutta l'umidità avea cessato di esalare. Il grano *volpato* conservato all'asciutto per due anni gli avea offeriti i medesimi fenomeni, dap-  
poi-

poichè l'avea umettato. (1) Illuminato il Sig. Needham dall'esperienze, che io ho riportate, pensò, che i filamenti del grano *volpato* non fossero vere anguille; ma egli ha creduto doverle collocare tralli *zoofiti* delle infusioni, ed assegnare ad esse la medesima origine. *Settima esperienza*. Egli ha osservato nascere i medesimi filamenti, animarsi, e produrre ne' succhi latticinosi, de' semi, ed in un frammento d'ala di una farfalla nascosta ancora sotto l'inviluppo di crisalide. *Ottava esperienza*. Finalmente egli ha trovati di questi filamenti fino ne' liquori femminali. Egli ha osservata la loro formazione, i loro sviluppamenti, e le loro specie di metamorfosi, e di generazione, ed ha veduto farsi tutto incomparabilmente più presto in questi liquori, che nelle infusioni. Egli pensa, che gli animalletti *spermatici* sieno prodotti da' filamenti.

331. *Conseguenze del Sig. Needham, ed osservazioni sopra queste conseguenze. Lettera dell'Autore a questo Naturalista, e sua risposta.*

Quanto più si riflette sopra queste diverse esperienze, tanto più si conosce, quanto sia difficile l'assicurarci quì del vero, e dissipare tutti i dubbj, ch'elleno fanno nascere. Io ho notate nella prima esperienza le precauzioni, che il Sig. Needham avea prese per impedire l'ingresso in quelle caraffe agl'insetti esteriori, ed a' loro semi. Fondato sopra queste precauzioni egli si credeva in diritto di concluderne, che gli animalletti da esso scoperti eranfi formati ne' liquori medesimi, in virtù di una forza *produttrice*, o *vegetativa* sparsa in tutte le parti della natura. Ma è egli sicuro, che queste caraffe fossero state sigillate così esattamente, come se lo fossero state ermeticamente? Non vi restavano punto aperture invisibili, che potes-

---

(1) *Nuove scoperte fatte col Microscopio*, tradotte dall'Inglese a Leida 1747. pag. 99. e segg.

potessero essere portoni per animaletti di una tal prodigiosa piccolezza, come quelli, che sono in questione? E' egli ben sicuro, che non vi sieno niisuni Animaletti, ovvero uova, che possano sostenere un caldo eguale a quello delle ceneri calde senza perire, o senza perdere la loro qualità prolifica? E' egli ben sicuro, che nel tempo, nel quale l' Osservatore presentava la gocciola del liquore al microscopio, e che aggiustava lo strumento, gli animaletti, che volano per l'aria, o semplicemente i loro semi non sieno caduti in questa gocciola? E' egli ben sicuro finalmente, che non esistano alcuni animaletti, l'accrescimento de' quali sia tanto rapido, che non sieno loro necessarij, che alcuni minuti, per comparire totalmente formati? Animali, che non sono percosì dire, che una gelatina condensata, i polipi *a mazzetta*, ci hanno somministrati degli esempj di un prestissimo accrescimento: animaletti di una consistenza molto più delicata, o più rara, si svilupperanno molto più presto, poichè i tempi degli sviluppiamenti devono essere relativi ai gradi della resistenza de' solidi. Mentrechè s'ignorava la vera origine de' vermi della carne, e che la sana Filosofia non illuminava ancora li spiriti, si pensava bonariamente, che le molecole della carne, messe in azione da una conveniente fermentazione, si ordinassero, e si organizzassero in maniera da produrre degl' insetti. Si pensava, che la Natura non dovesse mettersi in maggior pensiero, per formare degli esseri tanto vili, e che appena meritano il nome di animali. Siccome niisuno supponeva, che avessero un cervello, un cuore, delle arterie, delle vene, uno stomaco, una quantità innumerabile di trachee, delle migliaja di occhi ec. si giudicava facilmente, che la loro generazione non dovesse essere tanto regolare, come quella de' grossi animali, l'ammirabile organizzazione de' quali non poteva essere sconosciuta. Comparve Redi: egli coprì la carne con un panno,

no, ed in questa maniera impedì, che si accostassero le mosche; la carne si corruppe, e non produsse nè pure un verme. Le maglie del panno del Sig. Needham erano elleno abbastanza serrate? Allorchè per ispiegare la nascita di alcuni animalletti in qualche liquore si ricorre a delle forze *produttrici*, e a delle virtù *vegetative*, non si dicono delle parole invcedi cose? Quale idea abbiamo noi di queste forze? Come si concepisce, ch'elleno organizzino la materia? ch'elleno trasformino delle molecole inanimate in esseri viventi, il vegetale in animale? Questa maravigliosa operazione si eseguisce ella tutt'ad un tratto, o per gradi? Non si fa tutt'ad un tratto, poichè ce ne descrive i progressi; non si fa per gradi, o per una forza di *evoluzione*, poichè lo sviluppamento suppone l'azione combinata di tutti gli organi. Ci potremo risolvere ad ammettere, che il cervello sia formato dopo il cuore, allorchè si penserà a' rapporti tanto numerosi, tanto varj, tanto complicati, che legano il cuore al cervello? Si crederà, che il cuore possa agire avanti il cervello, dappoichè si saprà, che l'azione del primo suppone necessariamente quella del secondo? Quanto più si scandaglia la natura dell'animale, quanto più uno si ajuta co' lumi dell'Anatomia, e tanto più uno si persuade, che un tutto tanto armonico non ha potuto esser formato a pezzi, vale a dire, un pezzo dopo l'altro. E se uno si contentasse di dire, che la forza *generatrice* produce il suo effetto ad un tratto; lo domandarei qual vantaggio si trovi ad ammettere una tal forza invece del Creatore, il quale certamente opera in questa maniera, e di cui il nostro stimabile Autore è lontanissimo nel negarne l'esistenza? Noi abbiamo risò di Epicuro, che formava un Mondo con degli atomi: fare un animale con del brodo di montone, sarebbe questo meno, che offendere la sana Filosofia? Tutta la natura è contraria alle generazioni *equivocche*. Osservate le varietà della

fecondazione, e della generazione; io ne ho disegnata la pittura in questo Capitolo, e nel precedente: imperciocchè tutti gli animali tanto dissimili fra loro per la maniera, di cui sono fecondati, e generano, sono tutti simili in questo, che traggono la loro origine da un animale della medesima specie. I polipiti tanto diversi da tutti gli altri animali, per le proprietà singolari, che li caratterizzano, non hanno una generazione meno regolare, meno *univoca*. Io so, che noi dobbiamo guardarci dalle regole generali; mi pare di averlo provato abbastanza; ma so altresì, che le eccezioni devono essere rigorosamente dimostrate, perchè sieno ammesse, e specialmente allorchè elleno offendono la legge più universale, la più costante, e la più invariabile di tutte quelle, che noi sappiamo. Ora io domando al Sig. Needham, s'egli ha così rigorosamente dimostrato, che gli animaletti delle infusioni non abbiano altra origine simile a quella degli altri animali, come è vero, che i gorgogli moltiplicano senza accoppiamento? Que' filamenti, che il Sig. Needham trasforma in *perfetti zoofiti*, sono eglino realmente tali? Ovvero, abbiamo noi delle prove, che esistano de' veri zoofiti, voglio dire, degli esseri, che sieno nel medesimo tempo, e nel senso proprio, vegetali, ed animali? Per giudicare di questa quistione, bisognerebbe conoscere il *carattere* distintivo, che fa differire l'animale dalla pianta, e coloro, che hanno meditato seriamente questo soggetto, confessano sinceramente la loro ignoranza. Quando si estrae dall'animale tutto ciò, che ha di *comune* colla pianta, si resta sorpreso nel vedere, che non gli resta alcun carattere, che si possa risguardare come *distintivo*. Boerhaave diceva, che la pianta si nutrice per le radici *esteriori*, e l'animale per le radici *interiori*. Egli paragonava le *vene lattee* alle radici. Ma non vi ha un tempo, nel quale l'uomo, il più perfetto degli animali, si nutrice per le radici *esteriori*? L'Embrione non

non germoglia egli nella matrice delle specie diradici? E l'uova che *crescono* nel centro delle *galle*, non sono elleno specie singolari di animali, che si nutrono nella maniera delle piante? Riandate l'Articolo 325. L'*irritabilità*, quella proprietà tanto rimarcabile della fibra *muscolare*, parrebbe somministrarci il carattere più distintivo: ma è egli certo, che alcuna parte del vegetale non sia *irritabile*? Gli animali, che moltiplicano per divisione, e che s'innestano, gli animali, che moltiplicano naturalmente *per polmoni*, non sono più veramente *zoofiti* di quello, che sia il bruco, od il cane. Questi sono solamente gli animali, che hanno maggiori proprietà *comuni* colle piante di quello, che ne abbiano il bruco, od il cane. Un *animale-pianta*, non sarebbe, a propriamente parlare, nè animale, nè pianta; egli formerebbe una classe a parte, una nuova mescolanza, un nuovo gradino nella scala della natura. Ma i filamenti del Sig. Needham hannode' movimenti, ed una specie di vita. Gli atomi si staccano, e si allontanano un poco. Il tronco, ed i rami di alcuni polipi *a mazzetto*, similmente si muovono: gli atomi si staccano, e si allontanano. Se questi polipi fossero tanto piccini, quanto gli animaletti delle infusioni, non c'inganneremmo noi intorno alla loro vera natura? Distingueremmo noi la forma dell'insetto? Scorgeremmo noi distintamente quell'ammasso ammirabile di rami, di ramoscelli, e di campane? Indovineremmo noi la divisione naturale di questi, e tutto ciò, che concerne una moltiplicazione, di cui il regno animale non ci offerisce altri esempj? Io non voglio inferire da questo, che gli animaletti delle infusioni appartengano al genere de' polipi; io ignoro profondamente la struttura di questi animaletti, la loro origine, ed il loro modo di moltiplicare: ma voglio fare intendere, che la loro eccessiva picciolezza non ci permette di giudicare ciò, che sono. Il Sig. Needham conclude ancora dalle sue offer-

vazioni, che gli animaletti, che si staccano da' filamenti sono prodotti da' filamenti medesimi. Io non ne vedo prova alcuna. Gli animaletti aerei, o acquatici, di una estrema piccolezza, che s'introdurrebbono in gran numero nella sostanza filamentosa del seme, che se ne nutrirebbero, che vi si svilupperebbono, e vi si moltiplicherebbono, e che dopo l'abbandonerebbono gli uni dopo gli altri, non produrrebbono eglino delle apparenze, che si accosterebbono molto a tutto ciò, che ci racconta il nostro Autore? Io dico il medesimo di simili animaletti, che starebbono nella muffa, e che vi moltiplicherebbono, siccome molti insetti abitano, e moltiplicano in diverse parti delle piante. I filamenti, che si scoprono nel liquore seminale possono essere di una natura totalmente diversa da quelli delle infusioni, ed io non trovo, che sia meglio provato, che gli animaletti *spermatici* nascano da questi filamenti, di quello che sia, che gli atomi delle infusioni nascano da quella specie di muffa di cui ho parlato. Noi non sappiamo l'origine de' vermi *spermatici*: non è poco, che noi sappiamo solamente, che esistono. Siamo noi a maggior portata dell'origine degli altri vermi del corpo umano, che sono spaventosi colossi in comparazione di questi. Ne concluderemo noi, ch'essi la devono ad una forza produttrice, od al concorso di certe molecole organiche comuni al vegetale, e all'animale? Ma potremmo noi scordarci di quelle mosche *schneumoni*, che vanno a deporre le loro uova nel corpodegl' insetti viventi, e di altre mosche più ardite, che vanno a partorire nel naso del montone, nel retto del cavallo, nel gozzo del cervo? Quanti insetti invisibili, che simili in questo punto a queste mosche, mettono alla luce delle migliaia di animaletti, sopra l'origine de' quali si stancano invano i sistemi! Io ho detto, che il Sig. Needham avea conosciuto, che le pretese anguille, ch'egli credeva nel grano *volpato* erano filamenti, o *zoofiti* simili a quel-

quelli delle infusioni. Il suo eccellente traduttore, il di cui genio Filosofico, e luminoso illuminerebbe delle materie più difficili, e più oscure ancora di queste, fa sopra queste pretese anguille un' importante osservazione, che se fosse trattata con maggior profondità, potrebbe darci la chiave di queste scoperte. Ecco questa osservazione. „ Accade dic' egli, (1)  
 „ assai sovente a queste anguille di rompersi, ed al-  
 „ lora si vede escire da' loro corpi molti piccoli glo-  
 „ buli nerastri, inviluppati in una membrana sottil-  
 „ le; ora io ho osservato molte volte, che da questi  
 „ pacchetti di globuli, n' escivano de' piccoli corpi,  
 „ che nuotavano nell' acqua con molta vivacità. Que-  
 „ sti globuli, che si possono ancora scoprire nel cor-  
 „ po dell' anguilla, a cagione della sua trasparenza,  
 „ sono eglino dunque piccoli animali contenuti nell'  
 „ anguilla come in un stucco. Per essere in istato  
 „ di sciogliere la quistione, bisogna osservare con-  
 „ tinuamente un' anguilla, fintantochè non si sieno  
 „ veduti uscire tutti i globuli; esaminare ciò, che  
 „ ella allora diventa, e seguitare i progressi di que-  
 „ sti ultimi. „ Tale è infatti il giro migliore da se-  
 „ guitarci, per istruirci della storia segreta di questi pic-  
 „ coli corpi, e se il Sig. Needham l' avesse fatto, noi  
 „ non saremmo forse ridotti adesso a delle pure con-  
 „ ghietture. Osservate, ve ne prego, che il Tradut-  
 „ tore non insinua punto, che le anguille, o filamenti  
 „ fossero *zoofiti*, che producessero degli animalletti. L'  
 „ osservazione non ha fatto nascere questa idea nel suo  
 „ spirito: egli saggiamente si limita al semplice rac-  
 „ conto di ciò, che ha veduto, e fa benissimo distin-  
 „ guerlo. Egli dice, *che accade sovente alle anguille di*  
*rompersi, e che allora se ne vedono uscire de' globuli ne-*  
*rastri.* Egli aggiugne, *di aver molte volte osservato usci-*

re

---

(1) *Nuove scoperte fatte col Microscotio ec.* pag. 103.

*re da questi pacchetti di globuli, de' piccoli corpi, che nuotavano con vivacità. Egli non osa nè pur decidere, che questi piccoli corpi fossero animaletti. Ammettiamo nientedimeno col Sig. Needham, che realmente sieno tali: poichè sembrano contenuti nel filamento, come in uno stuccio, non sarebbe questa una ragione per supporre, che questo stuccio sia opera loro? I movimenti sensibilissimi degli stucci, dipenderebbono così da quelli degli animaletti, se eglino non appartenessero ancora alla causa naturale delle parti del granello, od all'azione dell'acqua sopra queste parti. Comunque sia, questa curiosa osservazione, è, a mio credere, una prova assai convincente, che i filamenti del grano *volpato*, di cui parla il Sig. Needham, non sono i veri zoofiti, che generano gli animaletti. E siccome egli pensa, che questi filamenti sieno della medesima natura di quelli delle infusioni, noi possiamo inferirne, che questi ultimi non sieno più zoofiti de' primi; ma che sieno probabilmente specie di guaine abitate dagli animaletti, o piene di globuli moventi. Io non cerco d'indovinare, quale sia l'origine di queste guaine, quale ne sia la natura, come sieno formate, perchè si rompano ec. Io non attendo che a premunire i miei Lettori contro conseguenze, che non risultano immediatamente da' fatti, e che sono contrarie a tutto ciò, che noi sappiamo di più certo della storia degli animali. Io sono dunque assai dispensato dall'esaminare, donde provenga quella continua degradazione di filamenti, e di animaletti, o per seguitare l'idea del nostro Autore, quella conversione graduale de' zoofiti in animaletti, e di animaletti in zoofiti sempre decrescenti. Queste non sono, che pure apparenze, ed il Sig. Needham l'avrebbe senza dubbio conosciute, se i suoi occhi, che ci hanno scoperte tante cose, gli avessero permesso di riprendere delle osservazioni, che avrebbero domandato per parte loro de' nuovi sforzi. Il Sig. de Reaumur*

mur non era stato ingannato da queste apparenze. Si può ricordare ciò, ch'egli ne scrivea al Sig. Trembley, e ch'egli avea confermato a me medesimo nelle sue lettere. (1) *Egli è falsissimo*, diceva questo grande Osservatore, il quale non vedea nella natura se non ciò, che v'era: *Egli è falsissimo, che le generazioni di questi animaletti sieno di più in più piccini, come l'hanno avanzato i Sigg. Needham, e de Buffon; tutto segue qui come l'ordinario, i piccini a loro tempo diventano grandi.* Del resto se qualcuno supponesse, che io avessi troppo pressate le idee del Sig. Needham sopra la maniera, di cui egli pensa, che gli animaletti delle infusioni sieno formati, io non avrei a far altro per dissipare questo sospetto, che citare il passo seguente dell'autore medesimo. *Gli animaletti microscopici, dic' egli non sono generati, e non generano nel modo ordinario; ma servono però come di chiave, per condurre alla generazione degli altri animali.* Queste espressioni, egli è vero, non risvegliano idee molto chiare. L'Autore le sviluppa un poco più parlando delle *anguille della colla*. Egli ci dice, che quelle sono *vivipare*, e che possono continuare a moltiplicare così, fintantochè elleno sono nell'elemento, che conviene loro. Ma egli aggiugne, che si può altrettanto giudicare delle sue osservazioni, che il loro primo principio è tale, come quello di tutti gli animaletti microscopici. Bisogna sapere, che avanti di arrivare allo stato di *anguille*, elleno passano per molti cangiamenti, lo che non provano gli animaletti delle infusioni, e che finalmente arrivano allo stato d'uovo odì *crisalide*, che le conduce immediatamente a quello di *anguille*. Si vede da questa breve esposizione, che il Sig. Needham pensa sopra queste *anguille*, come il Sig. de Buffon, (2), e nè l'uno nè l'altro

(1) Riandate l'Articolo 135.

(2) Riandate l'Articolo 310.

altro non ci danno nissuna prova dimostrativa della verità di una tanto strana opinione. Io amerei, lo confesso, di persuadere me medesimo, che un così buono spirito, com'è il Sig. Needham, e del quale io ho una sincera stima, non avesse adottati tali paradosi. Io lo prego a riflettere di nuovo sopra i fatti, e sopra i loro risultati più immediati, ed io attendo dalla regolarità del suo spirito, del suo candore, e del suo amore pel vero, ch'egli conosca, che le sue conseguenze vanno molto più lontano di quelle, che comporterebbono le sue osservazioni. Egli mi perdonerà la libertà, colla quale mi sono espresso sopra i suoi sentimenti: io non confonderò giammai con esse i fatti preziosi, de' quali egli ha arricchita la Storia Naturale. Io l'ho detto altre volte; gli esseri sensitivi sono stati tanto variati, quanto lo permetteva il piano della creazione. La materia bruta ha per ultimo fine la materia organica, e questa le anime, e le sostanze semplici, che gli sono unite, e che ne ricevono diverse modificazioni. Una particella di materia morta, o viva serve di abitazione, o di pascolo agli animaletti, che vi sono nati. Quello, che segue in grandissimo in un pezzo di carne, che si corrompe all'aria aperta, accade in piccolissimo in una goccia d'infusione, o in un seme. Indipendentemente dagli animaletti di fuori, per tener lontani i quali non saprebbonfi moltiplicare scrupolosamente le precauzioni in queste specie di esperienze, le loro uova, o i loro semi possono conservarsi *all'asciutto*, forse più lungo tempo, che le uova di alcuni polipi, (1) e mettere in questa maniera alla luce nuove generazioni, delle quali si cerca altronde l'origine. Non farebbe ella una delle principali sorgenti di fenomeni quella, che rappresenta il

---

(1) Articolo 317.

il grano *volpato*, e che ho accennata nella festa esperienza dell' Articolo precedente? Dopo aver composto questo Capitolo, ho creduto dovere, scrivere al Sig. Needham, per pregarlo a significarmi s'egli era sempre nelle medesime idee sopra l'origine degli animalletti; poichè io bramavo, che le avesse abbandonate. Eccol'estratto della mia lettera in data de' 31. Dicembre 1761. *Non avete voi scoperto niente di nuovo sopra gli animalletti microscopici dopo le osservazioni, che voi avete pubblicate nelle Transazioni filosofiche? Siete voi sempre nella medesima idea sopra l'origine di questi animalletti? Pensate voi tuttora, che la debbano a que' filamenti, che voi avete risguardati come zoofiti? Ammettete voi ancora quella degradazione continua di filamenti, e di animalletti, e quella conversione di filamenti in animalletti, e di animalletti in filamenti, che decregono gradatamente fintantochè sieno divenuti invisibili al microscopio? Avete voi di nuovo ripetute le vostre curiose esperienze sopra il grano volpato, voglio dire, sopra que' filamenti animati, che presenta la farina corrotta, che li contiene?*

Il Sig. Needham mi rispose in questi termini. *Io non ho trovato ancora alcuna ragione per cangiar i miei sentimenti sopra l'origine degli animalletti in questione. Io ho dopo ripetute spesso le mie sperienze, col medesimo successo, ed ancora poco fa un Professore di Reggio mi ha scritto, ch'egli ha fatte precisamente le medesime osservazioni, alle quali egli ne ha aggiunte molte altre, per confermare i miei sentimenti sopra queste. Egli le pubblica in forma di lettere, e presto le vedrete. Attendendo la pubblicazione di queste nuove osservazioni, io oserei ben predire, ch'elleno non dimostreranno, che gli animalletti, di cui si tratta, abbiano un'origine così strana, come lo ha pensato, e come pensa tuttora il mio celebre confratello. Io mi tengo dunque, senza esitare, alle riflessioni, che io sottometto al giudizio del Lettore illuminato, ed imparziale.*

C A-

## C A P I T O L O   V I I .

*Idee sopra la maniera, in cui si opera la fecondazione appresso gli animali.*

332. *Scopo dell'Autore.*

**T**Anti fatti diversi, che io ho radunati in quest'Opera in favore dell'*evoluzione*, provano sufficientemente, che i Corpi Organizzati non sono propriamente *generati*; ma che preesistevano originalmente in piccolo. Si tratta dunque, per ispiegare il gran mistero della generazione, di assegnare le cause fisiche, che operano i primi sviluppiamenti di questi corpi; poichè se niente si produce, tutto si sviluppa, e non sono più vere generazioni, di quel che sieno vere metamorfosi. Le belle osservazioni del Sig. de Haller sopra il pollo, ci hannodimosttrato quello, che non s'era se non supposto, che l'embrione preesiste nell'uovo avanti la fecondazione. (1) Si è veduto quì sopra, (2) che molti anni avanti questa importante scoperta, io ero partito da questo principio fondamentale, che il liquor femminile non fosse, che un fluido stimolante, e alimentare, che penetrando nell'uovo, vi diventava la sorgente dell'evoluzione del germe. (3) Io ho arrischiato sopra ciò alcune conghietture, che non le ho date se non per quel, che valevano. (4) Il mio disegno non è al presente di sviluppare molto queste conghietture, e di farne un'applicazione seguita a diversi casi, che presenta il mio soggetto. Io riservo queste particolarità  
per

---

(1) Riandate gli Articoli 142. 143. e seg.

(2) Art. 25. 26. 27. 28. 29. ec. e 141.

(3) Art. 43.

(4) Art. 24. e 44.

per un terzo volume, che forse pubblicherò. Io mi limiterò quì a delle considerazioni assai generali, che mi sembrano risultare naturalmente da' fatti.

333. *Principj generali sopra la fecondazione.*

Un uovo *infecondo* non è dunque privo del *germe*; ma il *germe* invisibile, ch'egli contiene non si svilupperà giammai, perchè gli manca una *condizione* necessaria allo *svilupamento*; egli non è stato *fecondato*. La *fecondazione* non introduce dunque nell'uovo, nella vescicola un *germe*, che esiste avanti nel maschio; egli non somministra delle *molecole organiche*, che unendosi in virtù di certe forze di *rappor- to* a quelle della femmina, producano il feto: ma il *germe* posto da principio nell'uovo, o nella vescicola, riceve dal *liquore*, che somministra il maschio, il principio di una nuova vita. Egli lo mette in *istato* di svilupparsi, e di rompere li stretti limiti, che lo ferravano. A misura, che il *germe* si sviluppa, egli cresce nel medesimo tempo di *volume*, e di *massa*. Una forza *impulsiva*, od *espansiva* opera dunque in esso, e delle *molecole straniere* vengono ad *incorporarsi* nelle sue parti *elementari*. Questa *incorporazione* suppone la *nutrizione*. Bisogna, che i succhi nutritivi sieno portati a tutte le parti, perchè s'incorporino con esse, e questo è uno de' principali usi della circolazione. Siccome il *liquor femminile* non forma il tutto intero, egli non formante più, che una parte *integrante* di questo tutto. Egli non aggiugne all'embrione un cuore, che non avesse: ma dà al cuore *preformato* dell'embrione un'attività, senza la quale egli non arriverebbe a superare la resistenza de' *solidi*. La causa *fisica* de' moti del cuore è nella sua *irritabilità*: reiterate esperienze lo provano. (1) Il *liquore semi-*

---

(1) Consultate l'Articolo 285. e la Dissertazione del Sig. de Haller sopra l'*irritabilità*, e quella sopra i moti del cuore.

feminale dunque è una specie di *stimolante*, che irritando il cuore dell'embrione, gl'imprime un grado di forza, che egli non poteva ricevere, se non da questo solo liquore. Il moto una volta impresso al mobile vi si conserva per l'*irritabilità* sempre sussistente, sempre inerente al *muscolo*. Ecco dunque la piccola macchina *montata*; ma il suo lavoro non è semplicemente quello di una mostrina. La molla, i rochetti, le ruote della nostra piccola macchina animale, devono rivestirsi appoco appoco di nuove forme, e di nuove situazioni rispettive: finalmente devono crescere, svilupparfi, ed i cangiamenti di forme, e di situazioni dipendono dallo *svilupamento*. (1) Lo *svilupamento* suppone l'azione di un qualche fluido. Un fluido è dunque mandato dal cuore dell'embrione nelle sue arterie, che lo trasmettono in tutte le parti, donde egli è riportato al cuore per le vene. Questo fluido dee essere proporzionato alla prodigiosa sottigliezza de' vasi del germe. Un sangue tale, come il nostro, non vi passerebbe. Il sangue dell'embrione da principio è un liquore trasparente, e quasi senza colore. Diventa poi giallognolo, poi rossigno, e finalmente rosso. Io prego, che si rilegga attentamente l'Articolo 163. Il fluido, che circola nell'embrione acquista dunque per gradi delle molecole sempre più grosse, e che cangiano sempre più il suo colore primitivo. Egli era dunque da principio sottilissimo, tenuissimo, e probabilmente meno eterogeneo. L'impulsione continua del cuore ingrandisce il calibro de' vasi, la flessibilità de' quali tuttora è grandissima. Eglino ammettono delle particelle più grosse. Il sangue si condensa, si colora, e diventa sempre più eterogeneo. La simiglianza più, o meno osservabile de' figli al padre, o alla madre, e soprattutto

---

(1) Consultate il Cap. IX. del Tom. I.

tutto la simiglianza più decisa del *mulo* all'*asino* ed alla cavalla, devono avere unaragione *a priori*, per servirmi di un'espressione scolastica, che non può trovare; che nella *fecondazione*. Lo sperma del maschio ha dunque un'*influenza* sopra i *solidi* dell'*embrione*, che domina sopra tutta la vita della prole, o del mulo; poichè i *tratti*, che loro imprime, non si cancellano mai. Questa simiglianza non tocca solamente l'*esteriore* dell'*embrione*, ma ancora il suo *interiore*. Il mulo ha una voce, che imita molto la voce dell'*asino*, e non è punto simile a quella del cavallo. L'organo della voce dell'*asino* è uno strumento più composto di quello, che uno possa immaginarsi, e che un bravo Notomista ha saputo farcelo ammirare. (1) Un *tamburo* di una singolarissima costruzione, posto nella laringe, è la parte principale di questo strumento. Ora questo tamburo, ch'è stato accordato all'*asino*, si trova nel mulo, ed il cavallo n'è privo. Lo sperma penetra dunque il germe, e la sua influenza non si limita ad animare il cuore. Il cavallo disegnato in miniatura nell'ovaja della cavalla, riceve dall'impressione dello sperma un organo, che originalmente non avea. Il liquore dell'*asino* sembra dunque trasformarlo in *mulo*. Acciocchè lo sperma operi tali cangiamenti nell'*embrione*, mi pare, che sia necessario, che accada una di queste due cose; o che sia portato egli medesimo dall'arterie dell'*embrione* a tutte le sue parti, o che determini i fluidi dell'*embrione*, a portarsi con maggiore, o minore abbondanza ad alcune parti. La sola sovrabbondanza de' succhi basta, per cangiare una parte a' nostri occhi. Alcune fibre di una foglia diventano una grossa *galla*, allorchè sono troppo imbevute; e quanti

---

(1) Il Sig. Herrissant *Mémoires dell'Académie* 1753. pag. 287. in quarto.

ti de' *tumori* animali, che non hanno altra causa! La mancanza de' *succhi*, al contrario, diminuisce i vasi; eglino finalmente si scancellano, e la parte diventa quasi incognita, se non si scancellà del tutto. I tristi effetti dello *sposamento* indicano abbastanza, che il *liquor seminale* è portato ai nervi del soggetto, ch'è molto analogo agli *spiriti animali*, de' quali egli è forse tutto impregnato. La parte più sottile di un *liquore* sì elaborato, sembra propriissima ad insinuarsi ne' sottilissimi vasi del germe. I fatti provano, che egli li penetra. Potrebbe ancora circolarvi, e produrre, per la sua azione immediata sopra diverse parti, que' tratti spiritosi di somiglianza, de' quali noi tentiamo di scoprire le cause. Questo è quanto aveo io ammesso nelle mie prime meditazioni, che ho esposte nel Capitolo Terzo del Primo Tomo di quest'Opera. Se niente non è *generato*, le lunghe orecchie del mulo, e il tamburo della sua laringe non sono generati. Il *legamentocassulare*, e le fascie *ligamentose*, che si osservano nell' *innesto* dello *sprone* del gallo sopra la sua cresta non sono certamente generate: nientedimeno la più accurata dissezione non può dimostrarle nè nello *sprone*, nè nella cresta. Contuttociò vi erano, ma sotto un' altra forma, e l' *innesto* le ha rese visibili sotto quella, che ha fatto lor rivestire. (1) Il cuore del pollo non si fa vedere da principio, che sotto la figura di un mezzo anello: *nissuni ventricoli*, *nissune orecchie*, almeno apparenti; vedete nelle belle Memorie del Sig. de Haller, come la semplice evoluzione mette alla luce questi diversi organi per l'avanti invisibili, o troppo nascosti. (2) Se dunque non si vede nella laringe del cavallo il tamburo, ch'è tanto visibile in quella del mulo, non ne segue da que-

---

(1) Consultate l'Articolo 271.

(2) Art. 144. e 146.

questo, che non vi sia nella laringe del primo, parte-  
 nissuna, che ricevendo dall'impressione dello sper-  
 ma certe modificazioni, non possa fare delle funzio-  
 ni proprie di questo strumento, ed imitare in questa  
 maniera quello dell'asino. Che lo sperma agisca so-  
 pra certe parti, ch'egli le modifichi, che le faccia  
 germogliare, crescere, sviluppare, morire, questo è  
 chiaro dalla mutazione della voce, dalla vegetazione  
 delle corna del cervo, da quella delle zanne del ci-  
 gnale, delle corna, della cresta, della barba ec. e  
 da molti altri fatti del medesimo genere, che non sa-  
 prebbonfi rinvocare in dubbio. Se lo sperma modifica  
 la voce, ciò non può accadere, che in modificando  
 l'organo medesimo della voce, e posciachè egli è ca-  
 pace di produrre un tale effetto nell'adulto, le di cui  
 fibre sono già sviluppatissime, ed hanno acquistata  
 della consistenza, quali cangiamenti non può egli ope-  
 rare sopra l'organo della voce del germe, che non è  
 quasi, che una gocciola di mucosità organizzata? In  
 questi primi momenti, ne' quali tutto è di una deli-  
 catezza inconcepibile, la più piccola quantità di ma-  
 teria, il più leggiero movimento, possono cangiare l'  
 economia di una parte, e cangiarla per sempre. Per-  
 chè questa parte si nutrice, e cresce? Gli atomi ali-  
 mentari, ch'ella riceve, vi si ordinano conseguente-  
 mente alle modificazioni, che sopravvengono. Egli-  
 no fortificano così l'impressione originale dello sper-  
 ma; la rendono saliente, durevole, e indelebile. Ri-  
 leggete l'Articolo 170. Si è creduto troppo facilmen-  
 te, che il liquor seminale somministrasse all'embrio-  
 ne delle parti *integranti*. Si sono prese per tali delle  
 parti medesime dell'embrione, modificate original-  
 mente dall'azione di questo liquore. Un esame più  
 scrupoloso di queste parti l'avrebbe dimostrato; ma  
 noi ci siamo affrettati di concludere. Il pollo appartie-  
 ne alla gallina, il mulo alla cavalla; le prove dirette  
 sono nell'Articolo 142. tutto il resto non è che indiret-  
 to.

to. Appoggiamo i nostri ragionamenti sopra una base più soda. Il *tamburo* del mulo può imitare il tamburo dell'asino; ma non è certamente quello dell'asino. Io invito il Sig. Herrissant a fare delle nuove ricerche, ed a ricorrere a delle dissezioni più delicate. Io oserei predirgli, che troverà almeno altrettante dissimiglianze, quante sono le somiglianze. I Sigg. de Reaumur, (1) e de Buffon, (2) confessano tutti due, che non sono arrivati a soddisfarsi sopra i *muli*. I risultati dell'esperienze non sono stati invariabili, e soventi volte l'esperienze medesime non hanno prodotto niente: prova evidente, che non è così facile lo stabilire i rapporti al maschio. Osserviamo, facciamo sezioni, paragoniamo. Il toro ha quattro stomachi, l'asina non ne ha, che uno. Dall'accoppiamento del toro coll'asina ne nasce un *giumento*. Noi non abbiamo la sezione di questo mulo, o bastardo, e sarebbe da desiderarsi. Se i principj, di cui parlo sono veri, il *giumento* non dee avere i quattro stomachi di suo padre; ma è possibile, che l'unico stomaco, ch'egli avea nell'ovaja di sua madre, provi de'grandi cangiamenti dallo sperma, e che questi cangiamenti vadino al punto, che lo stomaco sembri come diviso, e moltiplicato. Si asicura, che dall'accoppiamento del gallo coll'anitra nasca un mulo, o bastardo, che ha i piedi di gallo: io faccio sopra questi piedi il medesimo raziocinio, che sopra il *tamburo* del mulo propriamente detto. Lo estenderò ancora a quella famiglia dell'isola di Malta, di cui il Sig. de Reaumur ce ne dà la storia, e gl'individui della quale vengono al Mondo con sei diti a' piedi, e alle mani. (3) Questi piedi di gallo erano egli-

(1) *Arte di far nascere i pulcini* ec. Tom. 2. pag. 371. della seconda edizione.

(2) *Stor. Nat.* Tom. V. pag. 610. e segg.

(3) *Arte di far nascere i pulcini* ec. Tom. II. pag. 377. della seconda edizione.

egolino dunque veri piedi di gallo? Que'diti sopran-  
numerarj erano egolino *veri* diti? Gli uni e gli al-  
tri aveano egolino la struttura *esteriore*, ed *interiore*  
proprie di tali parti? È sopra questo non siamo in  
istato di pronunziare. Un'alterazione un poco con-  
siderabile ne' piedi dell'anitra, un prolungamento  
eccessivo di certe parti ossee, o membranose delle  
mani, e de' piedi, hanno potuto facilmente indurre  
qui in errore, e dar luogo a tirare delle conseguen-  
ze più generali delle premesse. Dico di bel nuovo,  
e posso io troppo ripeterlo? Il pollo era tutto for-  
mato avanti che l'uovo fosse fecondato dal gallo.  
Lo sperma del maschio sostituirebbe egli a' piedi  
dell'embrione già preformato dei piedi di un'altra  
specie? Si è ben meditato sopra tutto ciò che sup-  
porrebbe una simile sostituzione in un tutto così ar-  
monico? E se si dice che lo sperma *trasforma*, una  
trasformazione simile ripugnerebb'ella meno al sen-  
so comune, quanto le metamorfosi de' poeti?

334. *Due punti principali, che restano da  
dilucidare.*

Eccò alcuni principj generali sopra la *fecondazio-  
ne*. Quelli che io ho maggiormente sviluppati nei  
Capitoli III. V. e VI. del primo Tomo, hanno tra  
loro una grande analogia. Ma allora mi mancava un  
fatto essenziale, che non era ancora scoperto, e che  
io solamente supponeva. Dopo la natura medesima  
ha pronunziato; la preeesistenza del germe è stata  
dimostrata, ed ho veduto, che avevo ragionato be-  
ne. Se ne siamo stati troppo lungi, quando abbiamo  
ammesso, che lo sperma somministrava al germe del-  
le parti *integranti*, non si può, per un'altra parte,  
negare, che non vi produca de' cangiamenti grandi.  
Io prendo sempre i muli per esempio, come il più  
strepitoso, e più decisivo. Restano dunque due cose  
da fare, e il mistero della generazione sarà svelato.  
Bisogna dimostrare, come lo sperma arrivi al germe,

e come agisca sopra esso, e gl' imprima que' tratti indelebili, che caratterizzano il *mulo*.

335. *Come lo sperma possa arrivare al germe. Scoperte di Malpighi sopra la fecondazione delle uova della farfalla. Osservazioni dell' Autore sopra questo soggetto.*

Noi abbiamedelle prove, che lo sperma può agire al di fuori. Le uova de' pesci come si è veduto nell' Articolo 294 e più sicuramente ancora quelle delle ranocchie, nell' Articolo 300. sono fecondate in questa maniera. Il maschio le innaffia col suo liquore. Si possono supporre nell' esteriore dell' uovo delle piccole aperture, delle specie di attraenti, o di trombe, che poppano il liquore fecondante. Si è disputato molto sopra la questione, se lo sperma entri nella matrice. Quelli, che lo negavano, lo facevano passare pe' lunghi, e tortuosi giri della circolazione. Verrheyen, e Ruysch hanno fatto meglio, che disputare: hanno tagliato, ed osservato. Il primo avendo aperta una vacca sedici ore dopo l'accoppiamento, trovò molto sperma nella matrice (1). Il secondo avendo aperta una donna sorpresa in attuale adulterio, e che era condotta alla morte, assicurò di aver veduto molto sperma non solamente nella matrice, ma ancora nelle *trombe* (2). Dunque lo sperma entra nella matrice, arriva ancora fino nelle trombe, e bisogna bene, che arrivi ancora fino all'*ovaja*, poichè il Sig. Littré vi ha scoperto un feto tutto formato (3). Si hanno d'altronde delle storie di feti aderenti ad alcune parti del basso-ventre, e che si erano sviluppati così nell'*ovaja*, e di feti, che si erano sviluppati nelle trombe. Io non posso omettere la bella esperienza di Nuck

(1) Annot. Trat. V. Cap. III.

(2) *Tesi Anatomiche*. Tavola VI.

(3) *Mem. dell' Acad.* 1707.

Nuck (1). Egli legò la tromba di una cagna tre giorni dopo il coito; in capo a ventun giorno trovò due feti posti trall'ovaja, e la legatura, il resto della tromba, e la matrice erano vote. Il liquor seminale può innalzarsi nelle trombe coll'ajuto di un moto *peristaltico*, che si crede essere stato osservato nelle medesime, ovvero per una forza analoga a quella, che si esercita ne' tubi *capillari*. Si può sbagliare sopra la causa di quest'ascensione, ma sempre è certo, che il liquor seminale agisce sopra l'uovo contenuto ancora nell'ovaja. Se Malpighi ha veduto bene, come dubitarne? La fecondazione dell'uova della farfalla si opera altrimenti. Il liquore del maschio si conserva in una specie di matrice, posta dalla parte del condotto delle uova. Questo condotto termina all'ano, e per esso escono le uova. L'apertura destinata a ricevere la parte del maschio, è distinta dall'ano. La matrice ha due canali; uno si apre nel condotto delle uova, l'altro si rende alla parte, che caratterizza il sesso. I rami dell'ovaja, o le trombe, che contengono le uova, si scaricano nel condotto pel mezzo de' due tronchi principali. Nel momento, in cui le uova traversano questo condotto, per venire alla luce, nel momento, in cui passano avanti l'imboccatura del canale della matrice, sono fecondate. Dunque basta un istante per renderle feconde. Il liquore fecondante messo in deposito nella matrice, agisce dunque continuamente sopra le uova, che calano dai rami, e traversano il condotto. Le uova, che si staccano dall'ovaja primachè sieno passate avanti il canale della matrice, sono infconde: quelle che si prendono sotto questo canale, sono feconde. Finalmente l'Autore ha trovato nella matrice il medesimo liquore, ch'egli avea osservato nel-

---

(1) *Enciclopedia*. Tom. VII. pag. 568.

nella parte del maschio. (1) Sopra la farfalla del baco da seta, Malpighi ha fatte queste curiose osservazioni. Egli ha osservato, che le uova che sono state fecondate, sono da principio di color giallo simile a quello del zolfo; dopo si cangia in violetto, ed il guscio resta sempre ritondissimo. Le uova sterili al contrario conservano il loro colore di zolfo, e si fa nel guscio una cavità osservabilissima. (2) Se alcuno pensasse che questo segno di sterilità fosse universale, forse Malpighi l'ha egli pensato, s'ingannerebbe. Delle uova di un bruno color di marmo pittato, partorite alla mia presenza da una grossa farfalla, mi hanno fatto vedere precisamente il contrario. Alcune conservarono il loro colore naturale, ed il guscio patì una cavità considerabile. Altre presero un color violetto, ed il guscio restò rotondissimo. Le prime nientedimeno erano feconde, ed io ne vidi nascere da esse delle farfalle; l'ultime non produssero niente. Malpighi ha immaginata un'esperienza ingegnosa che in verità non ha avuti successi; ma io non posso troppo esortare a ripeterla, ed a variarla. Egli ha staccate l'uova dall'ovaja, e le ha innaffiate col liquore del maschio. Se fossero state così fecondate, lo farebbono state in qualche modo per arte, e nella maniera di quelle delle ranocchie. Io non so a quale altezza s'innalzi il liquor seminale nella tromba, perchè non si è trovato ancora sopra l'ovaja medesima. Persone brave pensano, che il vapore odorifero ch'esala da questo liquore basti per operare la fecondazione. Gli odori penetrano benissimo nelle cavità poco diverse da quella: ma mi pare, che quì vi sia necessario qualcosa di più, che semplici odori. Io ne ho già accennate le ragioni, alle quali rimetto il Leggitore.

336.

(1) *Dissert. Epist. de Bombice. Mem. per servir alla Storia degli Insetti*, Tom. II. Mem. 2. pag. 82. e segg.

(2) Ivi pag. 84.

336. *Ultimi tentativi dell'Autore per procurare di schiarire il mistero della generazione.*

La quistione come il liquor seminale agisca nel germe, come imprima al mulo que' tratti che lo fanno differire dal cavallo, passa generalmente per insolubile, e non si è tralasciato di obbiettarla contro la preeesistenza de' germi. Io la credo almeno una delle più difficili della Fisica, e mai mi sono lusingato di scioglierla. Si sono vedute ne' Capitoli III. e VI. del I. Tomo di quest'Opera le idee che mi avea fatte nascere. Adesso io sono chiamato a ritoccarle di nuovo, ed a perfezionarle, se posso. Si è detto, e si è ripetuto in cento scritti, che il liquor seminale è un estratto di tutto l'individuo. Si era supposto questo per render ragione della simiglianza de' figliuoli a' loro genitori. Ma non si era detto, come si preparasse questo estratto; eccettuato il Sig. de Buffon, non ho veduto alcuno Autore che abbia concepito un sistema formato sopra questo soggetto. Io ho riportato l'estratto del sistema di questo Fisico, (1) ed ho dimostrato che pecca ne' fondamenti. (2) Le molecole organiche mandate da tutte le parti del corpo agli organi della generazione, perch' elleno non sono state ammesse in queste parti, come vi sarebbero state disegnate? Qual idea ci dobbiamo noi fare de' modelli *interiori* del nostro Autore, e di quella forza, che secondo esso agisce come il *peso* nel penetrare i massi? Io offenderei il giudizioso Lettore, se io mi tratteneffi d'avvantaggio a confutare queste dotte chimere troppo amate dal celebre Naturalista, e delle quali mi maraviglio, che sia rimasto soddisfatto. Ancora io non vorrei pubblicare delle chimere: si giudicherà dai miei principj, e dalle loro conseguenze. Il germe, che preeiste alla *fecondazione*, non può svilupparsi sen-

(1) Art. 112. e segg.

(2) Art. 122. 123. 124. 171. 172. 174. 177. 309. e 310.

senza essa. Per essa non solamente egli si sviluppa, ma riceve ancora delle nuove *modificazioni*, che toccano l'interiore, e l'esteriore del germe. Queste modificazioni hanno sempre un rapporto più, o meno osservabile coll'individuo, che opera la fecondazione. Egli le opera col liquore, che spande nell'atto della generazione. Questo liquore introdotto nella matrice, s'innalza nella tromba, e l'uovo resta fecondato nell'ovaja medesima. Il liquore fecondante penetra il germe, poichè egli modifica il suo interiore. E se egli lo modifica in un rapporto al maschio, dunque egli medesimo è in un rapporto con esso. Dunque il liquor femminile contiene delle molecole, che corrispondono a diverse parti del maschio; perchè egli imprime al germe de' tratti di simiglianza con diverse parti di quello. Ciascuna parte del gran tutto organico ha la sua propria natura. Ella si nutrice di per se medesima, e fintantochè cresce, ritiene la sua struttura, e le sue prime funzioni. Queste molecole sono separate dal sangue, o dalla linfa. Se elleno vi ritornassero, vi si confonderebbono di nuovo, e vi bisognerebbono ancora degli organi per separarle. Ma la parte aumenta di mole a misura, ch'ella cresce, ed acquista giornalmente consistenza maggiore. Dunque ella ritiene le molecole, che hanno servito alla sua nutrizione, e al suo sviluppamento: dunque queste molecole non sono rimandate agli organi della generazione come a un conservatorio generale. Bisogna pertanto, che il liquor femminile contenga delle molecole analoghe a diverse parti del maschio. Dunque gli organi della generazione del maschio separano dal suo sangue, o dalla sua linfa, delle molecole analoghe a diverse parti del suo corpo. Avvi dunque negli organi della generazione del maschio de' vasi analoghi a questi; in quelle diverse parti, separano le molecole, che convengono loro. Gli organi della generazione del maschio sono dunque, per così dire, un'*angiologia*

gia in piccolo. La medesima mano, che ha disegnato così in piccolo il gran tutto organico, ha ben potuto disegnare in più piccolo il sistema de' vasi *secretorj*, sotto proporzioni relative al grande. Il liquore femminile dell'asino conterrebbe in questa maniera delle molecole corrispondenti alle orecchie, ed alla laringe, che non troverebbonsi nel liquore seminale del cavallo; e questo conterrebbe delle molecole relative allo sviluppo della coda, che non troverebbonsi nel liquore seminale dell'asino. La picciolezza, e la delicatezza estrema del germe indicano, che le sue parti hanno bisogno per nutrirsi, e per svilupparsi di un fluido proporzionato al loro stato attuale. Io ho creduto trovare questo fluido nel liquore, che somministra il maschio. Egli è il principio di uno sviluppo, che non comincerebbe senza esso, e che suppone una vera circolazione. Dunque egli è il principio di questa circolazione. Dunque egli agisce sopra gli organi della circolazione del germe, ne penetra il cuore, egli l'anima, e se l'anima, vi s'introduce; egli può ancora circular in tutte le parti. Egli vi spanderà maggior calore, e vita; egli darà loro maggior consistenza. Egli spiegherà i vasi, aprirà le maglie delle fibre, metterà il germe in istato di ricevere de' nutrimenti più sostanziosi, che gli somministrerà la matrice. Portato così a tutte le parti, egli imprimerà loro maggiori, o minori caratteri, ch'egli trae dal maschio, che lo ha somministrato. Egli non agirà solamente come nutrimento, agirà ancora come fluido dotato di certe proprietà, che lo distinguono, e gli effetti del quale devono variare in un determinato rapporto al soggetto, sopra il quale si spiega la sua attività. Questo soggetto è il germe, gli organi del quale concentrati, stivati, piegati, e ripiegati sopra loro medesimi, hanno delle forme, delle proporzioni, ed un ordine diversissimo da quello che avrebbero nell'adulto. Le rivoluzioni del pollone sono una bella dimo-

zione. Cominciando l'evoluzione, il liquor fecondante tenderà dunque ad aprire, a raddrizzare, a spiegare gli organi del germe, e la sua azione diversamente modificata dalle maggiori, o minori molecole di ciascun genere, precipiterà, od accrescerà l'evoluzione di alcuni organi, mentrechè ritarderà, od impedirà quella di alcuni altri. Come fluido nutritizio s'incorporerà ne' solidi nel rapporto dell'analogia delle molecole altale, o tal solido particolare. Le molecole analoghe, o corrispondenti saranno ammesse; le altre saranno rigettate, e rinviate ad altre parti. Se vi sono maggiori molecole proporzionate ad un certo determinato organo, o se queste molecole sono più attive, quest' organo maggiormente si svilupperà. Egli riceverà dalla loro impressione altre modificazioni particolari, in conseguenza della loro disposizione a dargli maggiore, o minore consistenza, a lasciarlo membranoso, o a determinare l'ossificazione. Così lo sperma dell'asino portato nel germe del cavallo, vi spiegherà la sua attività nel rapporto alla natura propria di ciascun organo del germe, ed a quella delle molecole fecondanti, che gli corrisponderanno. Quindi l'allungamento delle orecchie del cavallo, la nuova modificazione della sua laringe, e l'alterazione della coda. Quindi la trasformazione apparente di cavallo in mulo. Per questa specie di trasformazione il cavallo perde la facoltà di generare. Nientedimeno gli antichi hanno detto, che il mulo generava; ma questo non si è verificato. Il seme dell'asino non apre tutti i vasi proprij all' organo della generazione del cavallo: dunque una parte di questi vasi si scancela, e questo basta, perchè il mulo sia impotente (1). Gli organi della generazione han-

no

---

(1) Dopo aver mandato il mio Manoscritto al Libraj, io ho letto nella seconda parte di Marzo del Giornale Enciclopedico di quest'anno 1762. delle ricerche curiose del fu Sig.

no per fine principale la conservazione delle specie ;  
e non l'aumento del numero delle specie . Eglino sono  
prov-

Sig. Hebenstreit sopra gli organi della generazione del mulo, e sopra la cagione della sua sterilità. Nel cominciare le sue sezioni questo dotto Naturalista si aspettava, come ce lo dice egli medesimo, di trovare un difetto considerabile negli organi del sesso de' muli. Rimase però molto sorpreso, quando conobbe, che il mulo paragonato al cavallo da razza, ed ancora all' uomo, non cedeva loro in niente nell' esatta configurazione delle parti sessuali. I medesimi corpi cavernosi, la medesima uretra, le medesime arterie, le medesime vene, i medesimi muscoli, ed i medesimi nervi, e quello ch' era ancora più rimarcabile, i vasi spermatici ancor essi erano nel migliore stato possibile. I testicoli collocati nella loro borsa erano attaccati a' loro muscoli, ed avevano la loro doppia pelle. Il loro interiore era un composto di milioni di vasi capillari. Il conservatojo spermatico, in particolare, s' innalzava al di sopra del suo luogo ordinario, ed andava a terminare, come si osservava ne' quadrupedi, al suo determinato luogo. Quindi s' si scaricava nelle vescichette seminali, la struttura delle quali era più conforme a quella del cavallo, che a quella dell' uomo ec. Il Sig. Hebenstreit niente dunque scoprendo negli organi della generazione del mulo, che gli potesse somministrare la cagione della sua sterilità, e' si arrestò a considerare il liquor seminale, il quale è abbondantissimo. Egli non trovò in esso conformità alcuna collo sperma degli animali maschi fecondi, quantunque da principio le apparenze fossero le medesime come lo erano gli organi. Quelle molecole animate che si scoprono in sì gran numero, coll' ajuto del microscopio, ne' liquori seminali de' maschi, e che si sono chiamate *animaletti spermatici*, qui non si vedono. Egli è certo, aggiunge il nostro bravo Fifico, che questi *animaletti*, esaminato il liquore con diligenza, e più volte colla lente, non si sono mai veduti. Il Consigliar VValter, ed il Professore Hausel, i quali ciascuno separatamente hanno fatte le loro osservazioni, si sono trovati d' accordo in questo risultato. La materia era ancora calda, fu aperto il mulo subito dopo scannato, e si presero tutte le precauzioni necessarie, acciocchè non restasse dubbio alcuno sopra questa materia. Il Sig. Hebenstreit conclude da queste osservazioni, che si dee cercare la causa della sterilità del mulo nel difetto della parte animata, e per così dire, ignea del suo seme, perch' ei non vuol riconoscere per veri *animaletti* le molecole, in questione. E' più probabile, dic' egli, che quelle particelle agitate, che hanno diverse figure, relativamente a quelle delle specie, sio-

provvisi di vasi che separano le molecole destinate allo sviluppo di questi organi nel germe. Questi vasi

*no la parte attiva del seme, in virtù della quale è animato l'embrione che sempre esiste nell'ovaja. Si è veduto nella nota che ho messa sotto l'Articolo 135. che il Sig. de Reaumur credeva essarsi assicurato, che queste molecole fossero veri animaletti, che si propagassero, e il Sig. Hebenstreit lo ignorava. Ma quando questo non fosse certo, l'assenza di queste molecole, di qualunque natura si suppongano, provverebbe sempre un vizio nel liquore seminale del mulo, poichè si vedono costantemente ne' liquori seminali degli animali fecondi, e mancano in quelli che non sono ancora in istato di generare, o che ne sono divenuti incapaci. Ora questo vizio del liquor seminale del mulo, non può dipendere che da un vizio segreto esistente negli organi che lo preparano. La più diligente Notomia non potrebbe certamente scoprirlo. Appartiene apparentemente a tubi tanto delicati, che i nostri migliori microscopj non potrebbero arrivare a tanto. Io dunque penso che non si debba affermare col Sig. Hebenstreit, che gli organi della generazione del mulo sieno così bene condizionati come quelli del cavallo, e dell'uomo. Egli non ha veduto che le parti più grossolane di quegli organi, o quelle che ne costituiscono l'ossatura. E que' milioni di vasi capillari, de' quali egli parla, avrebb'egli mai potuto distinguergli, e paragonargli a quelli del cavallo, o dell'uomo? Il nostro dotto Professore passa dopo alla descrizione degli organi della mula. Le parti esteriori non gli sono sembrate niente diverse da quelle della cavalla. Ma ciò che v'ha di singolare, dic'egli, e che nessuno Autore ha descritto, si è, che la mula ha il condotto dell'orina in luogo diverso da quello della femmina degli altri animali; egli non viene dalla vulva passando tra il clitoride, e l'orifizio esteriore della matrice, ma egli è posto nella vagina medesima della matrice, e quindi c'ela l'orina. L'Autore di questa scoperta ne inferisce con fondamento, che questa sola conformazione sembrerebbe sufficiente per cagionare la sterilità della mula: deve mandar fuori, aggiugne egli, coll'orina il seme che ha ricevuto. Aggiungete a questo, che il passo continuo dell'orina indurisce talmente la vagina della matrice: che nè pure quando la mula è giovine vi si vedono le grinze, e le rughe ordinarie. Una seconda osservazione importante del Sig. Hebenstreit riguarda l'ovaja. Ella ha, dic'egli, i vasi ordinarij, arterie, vene, nervi; eglino si partono tutti da' soliti luoghi, e si dividono nell'ovaja, come si vedeva distintamente, dopo averli pre-*

vasi possono essere stati costrutti, o calibrati in maniera, che non v'abbia che quelli della medesima specie,

parati col distillamento del Mercurio. Ma quest'ovaja non conteneva nessuna di quelle vescicole trasparenti, che si chiamano uova; almeno queste uova, le quali nella loro origine sono quasi dissi, impercettibili, non erano ancora coperte nella parte gialla dell'ovaja; imperciocchè siccome il soggetto della sezione avea l'età requisita per l'accoppiamento, alcune uova almeno doveano vedersi, come si vedono dell'altra femmine di questa età. Così dalla mancanza di queste uova possiamo concluderne la sterilità. Finalmente una terza osservazione rimarcabilissima è quella, colla quale il Sig. Hebenstreit termina la Lettera, di cui io fo l'estratto. Ella è fatta sopra la matrice della mula. Io non conosco, dic'egli, matrice in nessun'altra femmina, che abbia la pelle tanto delicata, e la circonferenza della quale sia tanto spaziosa, quanto quella della mula. L'utero degli animali generalmente è di una sostanza assai compatta, e forte; quello della mula appena è eguale in sodezza alla vescica dell'orina. Questo me lo fa credere inabile a portare, essendo troppo rara, e trasparente in comparazione di quella degli altri animali, per sostenere il peso del feto. Dunque pare, che l'alterazione degli organi sessuali, che non si conosce ne' muli, se non da' suoi effetti, vale a dire, dallo stato del liquor seminale, si conosca nella mula negli organi medesimi. Non si attenda dame, che io renda ragione del rimovimento dell'utero, bisognerebbe d'altronde assicurarsi, che fosse vero. Risguardo alla vera, o apparente mancanza dell'uova, e della sposità della matrice, questi sono fatti, la spiegazione de' quali rientra nella sfera de' miei principj che li confermano. Tutto questo sempre più ci dimostra, quanta luce possano spandere l'esperienze sopra i muli, intorno al mistero della generazione: sarebbe meglio, che invece di fare delle dissertazioni senza fine sopra questa materia, si fosse uno rivoltato alla natura, collo scalpello, e la lente alla mano. Non è egli maraviglioso, che non si sieno cercate piuttosto per questa via le cagioni dell'impotenza del mulo? Nella parte seguente del medesimo giornale v'è una Lettera del celebre Sig. Klein, relativa alla precedente, ma assai meno istruttiva. L'Autore vi applaude alle osservazioni del Professore di Lipsig, e fa delle riflessioni sopra il mistero della generazione, le quali provano ch'egli non avea cercato di approfondire questa materia. Egli rigetta la preesistenza del germe nell'uovo, e si dichiara Pirroniano rispetto a tutti i sistemi ricevuti. Il Sig. Hebenstreit, dic'egli, ammette, che

zie, che esattamente si corrispondino nel grande, e nel piccolo. Vi farà larghezza maggiore riguardo ad altri organi. I limiti di questa larghezza noi non li sappiamo. La sola esperienza può farceli conoscere; ma non v'ha apparenza che si estenda dal quadrupede all'uccello. Un grande Osservatore ha resi famosi gli amori del coniglio, e della gallina. (1) Probabilmente egli ne avea troppo sperato. Il Sig. de Buffon l'ha rilevato con ragione, facendo vedere, che dall'unione della lepre col coniglio, specie similissime, non n'è risultato niente. (2) *Io non ho punto fede negli amori del coniglio, e della gallina*, mi scrivea il Sig. de Haller; *io ho verificata l'esperienza del Sig. de Reaumur, ed io ho delle ragioni sufficienti per credere, che non sieno che scherzi di un animale vivo in estremo, o che non istà mai fermo.* Consultate l'Artic. 139.

Ma

---

*che l'embrione sempre esista nell'uovo della madre. Ma non è questo un paradosso? L'embrione del mulo esiste sempre nell'uovo della cavalla, e l'asino lo anima. Io per me ci trovo della contraddizione. Aggiungete, che il disegno dell'animale nell'uovo, che co' migliori microscopi mai non si è potuto vedere, sembra essere un gratuito supposto, un ente di ragione, imperciocchè non si trova negli animalisti spermatici. Dopo domanderò in che consista questo disegno, e chi l'abbia disegnato? E' egli simile alle prime pennellate di una pittura, che tuttora sono molto lontane dalla perfezione, ma che presentano un'immagine, che si può conoscere? ec. Se il Sig. Klein avesse meditata con attenzione questa materia difficile, egli avrebbe compreso, che non bisognava cercare un germe di mulo nell'ovaje della cavalla, e che non v'era contraddizione nessuna ad ammettere, che lo sperma dell'asino modifichi il germe del cavallo. Io ho dimostrato come si possa concepire. Parlando del rimovimento dell'utero della mulo, egli aggiugne queste parole: *Io mi ricordo di aver osservata una cosa nel mio Trattato dell'origine de' pesci, pag. 5. ed è, che gli uccelli, come i pesci, rendono l'orina, e gli escrementi pel medesimo canale; io non ho nessuna esperienza che mi dia indizio, che il meato urinario sia nascosto in quello dell'uova.**

(1) Il Sig. de Reaumur. *Arte di far nascere i pulcini*, Tom. II. pag. 340. e segg. Seconda edizione.

(2) *Stor. Nat.* Tom. VI. pag. 303. e 304.

Ma nientedimeno gli uccelli bastardi propagano: il Sig. de Haller mi scrisse ancora; *Gli uccelli bastardi sono esempj evidenti del concorso de' due sessi, con una certa prerogativa di maschio*. Il Sig. Sprengel ha osservata la moltiplicazione de' bastardi, che nascono dall'accoppiamento de' cardellini, co' calderini. Il becco più grosso di questi si è conservato in molte generazioni. Perché in uccelli tanto simili, i bastardi hanno moltiplicato e tra loro, e colle loro razze paterne, e materne? Il seme del calderino dunque è proprio a fare totalmente sviluppare gli organi della generazione del cardellino. Questi organi sono in rapporto coll'altre parti, ed in qualche modo le rappresentano. Il calderino pare, che non sia molto diverso dal cardellino; almeno sono assai simili. Dunque gli organi della generazione del primo devono essere molto analoghi a quelli del secondo, ed i semi sono tra loro come gli organi, da quali sono preparati. Se il becco del calderino si è conservato in molte generazioni, non se ne dee inferire da questo, ch'è tramandi delle molecole modellate agli organi della generazione: ma più presto dobbiamo inferirne, che questi hanno un rapporto col becco, e che le molecole corrispondenti da essi separate, hanno potuto agire sopra la parte dell'organo della generazione del germe corrispondente al becco. Dunque quest'organo avrà filtrate le molecole proprie a modificare il becco del cardellino. Da' miei principj non si può esigere di vantaggio; io non saprei oltrepassare la deduzione. Non è poco, che mi abbiano condotto fin qui. Una nuova modificazione, che sopravvenga ad una parte organica, indebolisce, od estingue un antecedente modificazione. Il becco del calderino appoco appoco si trasmuterà nel becco del cardellino, per l'azione ripetuta del seme del cardellino sopra molte generazioni. Il Sig. de Buffon risguarda come animali della medesima specie tutti quelli, dall'unione de' quali ne nascono degl'individui capaci di

di generare (1). Secondo questa nozione, l'asino, ed il cavallo non sono della medesima specie, poichè il mulo, che nasce da essi non genera. Per la ragione de' contrarj, il calderino, ed il cardellino sarebbero della medesima specie. Io suppongo, che il Sig. Sprengel abbia bene osservato, ed attentamente.

337. *Esperienze da farsi per decider delle idee dell' Autore sopra la fecondazione. Riflessioni sopra queste esperienze.*

Vi è una specie di gallina da cinque dita; le specie comuni non ne hanno che quattro; il Sig. de Reaumur propone de' maritaggi tra' galli da cinque dita, e le galline da quattro dita, e tra' galli da quattro, e le galline da cinque dita (2). Io non pretendo indovinare i risultati, che avrebbero queste esperienze tanto proprie a schiarire il mistero della generazione. Io dirò soltanto, che se i miei principj intorno a questa materia sono veri, il seme del gallo da cinque dita farà sviluppare nel germe da quattro dita qualche cosa, che se non sarà un dito soprannumerario, almeno ne avrà l'apparenza. Forse cangerà ancora la conformazione, o le proporzioni delle dita naturali. Il seme del gallo da quattro dita, portato nel germe da cinque dita, dovrà al contrario lasciare imperfetto il quinto dito, o renderlo mal formato, ed alterare le sue proporzioni. Questo vizio di conformazione, o di proporzione potrà estendersi ancora alle altre dita ec. Il Sig. de Reaumur non ha annunziati simili risultati: egli non era partigiano de' miei principj. „ Se i germi, e' dice, sono nella gallina, „ (3) quella che ha cinque dita, ha i germi a cinque dita, e quantunque ella sia stata fecondata da „ un

(1) *Stor. Nat.* Tom. IV. pag. 384.

(2) *Arte di far nascere i pulcini*. Tom. II. pag. 366. Seconda Edizione.

(3) *Ibid.* pag. 367.

„ un gallo comune, darà de' polli a cinque dita; se-  
 „ i germi sono nel gallo, quelli ch'ella darà non  
 „ ne avranno, che quattro come il gallo, col qua-  
 „ le avrà abitato. Della medesima maniera la gal-  
 „ lina comune, che è stata fecondata da un gallo a  
 „ cinque dita, produrrà de' pulcini a quattro dita,  
 „ se i germi de' pulcini saranno stati in essa; e' pro-  
 „ durrà de' pulcini a cinque dita, se i germi gli sa-  
 „ ranno somministrati dal gallo “. Al presente è di-  
 mostrato *che i germi sono nella gallina*, ed il nostro illu-  
 stre Accademico non lo sapeva. Ma dato, che i ger-  
 mi sieno nella gallina, e' non ne segue da questo,  
 che una gallina a quattro dita, fecondata da un gal-  
 lo a cinque dita debba produrre de' pulcini a quat-  
 tro dita; nè che una gallina a cinque dita, fecon-  
 data da un gallo a quattro dita produr debba de' pul-  
 cini a cinque dita. Questa conclusione è simile a  
 quella, che tira l'Autore dalle uova, che fossero sta-  
 te fecondate da un coniglio *allorchè egli avanza*,  
 (1) *che ci farebbono vedere de' pulcini vestiti di peli,*  
*o de' conigli coperti di piume*. Questi propriamente  
 non farebbono nè pulcini, nè conigli, nè peli, nè  
 piume. I germi, ch'esistono nella gallina sono ger-  
 mi di pulcini, i quali contengono i germi delle piu-  
 me. Il seme del coniglio non trasformerebbe i pul-  
 cini in conigli, e le penne in peli. Nella natura  
 non hanno luogo simili trasformazioni, ed io l'ho  
 sufficientemente provato in molti luoghi di questo li-  
 bro. Ma il seme del coniglio, portato ne' germi de'  
 pulcini vi produrrebbe delle modificazioni più o me-  
 no mirabili, che muterebbono più, o meno la for-  
 ma esterna, ed interna degl'individui. Nulladimanco  
 però farebbono sempre pulcini, siccome il mulo non  
 è altro, che un cavallo modificato. L'azione del li-  
 quor

(1) Ibid. pag. 351.

quor femminile deve variare in un determinato rapporto alla materia sopra la quale egli travaglia. L'Autore della *Venere Fisica* propone altre esperienze, che molto adattate farebbono a verificare i miei principj. „ Vi farebbe sicuramente, dic' egli, (1)  
 „ qualche cosa, che meriterebbe l'attenzione de'  
 „ Filosofi, come il provare se certe determinate  
 „ particolarità artificiali si trasfondessero dopo mol-  
 „ te generazioni negli animali, che nascerebbono  
 „ da quelli. Se delle code, o delle orecchie ta-  
 „ gliate di generazione in generazione diminuisse-  
 „ ro, o alla fine si annientassero “. Si vede, che  
 secondo le mie idee, delle code tagliate a' maschi di generazione in generazione, non diminuirebbono, o non si annienterebbono alla fine le code, delle quali i germi ne fossero stati originalmente provveduti. Questo infallibilmente accaderebbe, se la coda del maschio somministrasse delle molecole, dalla riunione delle quali si formasse quella de' germi. Ma tagliando la coda al maschio, non gli si taglia la parte degli organi della generazione, che io suppongo corrispondere al Coccice.

338. *Sorgenti della similitudine de' figli a' loro genitori ec. Delle voglie delle madri.*

Non bisogna credere, che il germe abbia in piccolissimo tutti i tratti, che caratterizzano la madre come individuo. Il germe porta l'impronta originale della specie, e non quella dell'individualità. E' un uomo in piccolissimo, un cavallo, un toro ec. ma non è un certo determinato uomo, nè un certo determinato cavallo, nè un certo determinato toro ec. Tutti i germi sono contemporanei nel sistema dell'evoluzione; nè si sono comunicati scambievolmente i loro tratti, i loro distintivi caratteri. Non dico, che  
 tutti

(1) *Venere Fisica*, Seconda parte pag. 159. Edizione del 1745.

tutti quelli di una stessa specie sieno identici. Nissuna cosa vedo identica nella natura, e senza ricorrere a' principj *indiscernibili*, egli è chiarissimo che tutti i germi di una medesima specie non terminano di svilupparsi nella medesima matrice, nel medesimo tempo, nel medesimo luogo, nel medesimo clima, in una parola, nelle medesime circostanze. Ecco molte cagioni di diversità. Ve ne sono ancora dell'altre più efficaci; e queste sono i liquori seminali. I rapporti da me concepiti trall'organo della generazione del maschio, e le diverse parti del suo corpo si trasfondono fino ad un certo segno nel germe per l'azione del liquore femminile. Il temperamento della madre, le sue inclinazioni, le sue passioni, gli alimenti de' quali ella si nutrice, l'educazione, che ha essa avuta, il suo genere di vita, il clima che abita, possono altresì tutte queste cose modificare più, o meno l'embrione. E se si ammettesse con diversi Autori, che la femmina somministri un liquore prolifico, questo liquore produrrebbe nel germe delle modificazioni analoghe a quelle, che vi produce lo sperma del maschio. Ma questo liquore della femmina almeno è dubbio. Femmine, che concepiscono benissimo, non spandono alcun liquore nell'atto della generazione. Ruisch non ha trovato nella matrice, e nella tromba, se non quello del maschio. Se le femmine provvedute fossero di un tal liquore, e dovrebbe eccitarle all'amore, come e' v' eccita i maschi. Per qual ragione dunque il cervio, ed il capriolo d'Inghilterra usano eglino della violenza per sortomettere le loro femmine. I corpi *gialli*, che pel Sig. de Buffon somministrano il liquor fecondante della femmina, non sono necessari alla concezione. Il Sig. de Haller non li ha trovati in centinaia di donne, e di fanciulle, da esso aperte, ma e' gli ha veduti in quelle, ch'erano gravide, o che di poco s'erano sgravate. Dunque questi corpi *gialli* sono piuttosto l'effetto, che la causa della fecon-

dazione. (1) Nelle sorgenti, che io ho indicate, troverei le ragioni della somiglianza de' figlj al padre, ed alla madre, dell'aria della famiglia, ed ancora dell'aria nazionale. L'asino, ed il cavallo sono molto diversi. Se il seme del primo produce sì grandi effetti nel germe del secondo, perchè quello dell'uomo imprimerà egli ne' suoi figli tratti diversi di similitudine? Deformità puramente accidentali non si trasmettono, se gli accidenti non avranno influito sopra gli organi della generazione del maschio, o se queste deformità non saranno di natura da influire ne' suoi umori. Ma le malattie ereditarie si trasmetteranno, poichè esse attaccano gli umori, e con essi il liquor fecondante. Una commozione violenta della madre influirà sopra il feto; ma la voglia di un frutto non lo segnerà colla figura di questo frutto; poichè questa *voglia*, o desiderio non appartiene, che all'anima, e l'anima, ed i sensi dell'embrione non sono l'anima, ed i sensi della sua madre. Le *voglie* sono come le nuvole; vi si vede quello, che più ci piace. L'Autore della *Venere Fisica* lo ha osservato benissimo. „ Frattanto, dic'egli, (2) si sente spesso, „ siffatto raccontate di questi segni, che si vogliono „ cagionati dalle voglie della madre. Bene spesso „ so una ciliegia, ora un grappolo d'uva, ed ora „ un pesce. Io ne ho osservati in gran numero, „ ma confesso, che non ne ho mai veduti alcuni, „ che non si potessero facilmente ridurre a qualche „ escrescenza, o a qualche macchia accidentale. Io „ ho veduto fino un topo nel collo di una Signori- „ na, la cui madre era stata spaventata da questo „ animale; un'altra portava nel braccio un pesce, „ che la sua madre avea avuto desiderio di mangiar- „ re.

(1) *Bibliothèque raisonnée* Tom. 45. Extrait de l'*Histoire Naturelle, Générale, & Particulière*.

(2) *Venere Fisica*, Prima parte pag. 83. cc.

„ re. Questi animali sembrano ad alcuni perfetta-  
 „ mente disegnati : ma per me alcuno si riduce ad  
 „ una macchia nera , e pelosa , della specie di al-  
 „ cune altre , che vedonsi qualche fiata nelle guan-  
 „ cie , ed alle quali non si dà alcun nome , e biso-  
 „ gna trovare a chesi rassomiglino. Il pesce non era  
 „ che una macchia bigia. I rapporti delle madri nella  
 „ memoria , ch' elle conservano di aver avute tali ,  
 „ o tali determinate voglie , non ci deono molto in-  
 „ trigare ; poichè elle non si ricordano di aver avute  
 „ quelle voglie , o que' timori , se non dappoichè si  
 „ sono sgravate di un figliuolo segnato ; la memoria  
 „ allora somministra loro tutto quello , che vogliono ;  
 „ ed infatti egli è difficile , che nello spazio di nove  
 „ mesi , una donna non abbia mai avuto paura di nis-  
 „ sun animale , nè voglia di mangiare alcun frutto . „  
 Io lo ripeto spesso ; il liquor seminale , a parlare se-  
 cundo la buona filosofia , non forma niente , e non fa  
 che *modificare* quello , che di già era *preformato*. Li  
 varj tratti di simiglianza , che la fecondazione im-  
 prime nel germe , non possono rappresentare con pre-  
 cisione l' *originale*. Eglino non ne sono , propriamente  
 parlando , le *copie*. Eglino non v' hanno presa l'im-  
 pronta , come in un *modello*. Così i figlij , nè i bastardi  
 non si rassomigliano mai perfettamente al padre loro.  
 Se il liquor seminale modifica il germe , questo mo-  
 difica intorno a se l' azione di quel liquore in un  
 rapporto nel modo di riceverlo , e d' incorporarselo .

339. *Della fecondazione de' germi , da' quali deono  
 nascere delle femmine , e di quella de' germi de' neutri.*

Ma dappoichè un germe di femmina è stato secon-  
 dato , si sviluppano in esso delle parti , che non esi-  
 stono nel maschio , delle ovaie , delle trombe , una  
 matrice ec. Se il liquor seminale è necessario , per pro-  
 curare i primi sviluppiamenti di tutte le parti del ger-  
 me , come può egli procurar quelle parti , che non  
 ha il maschio , e delle quali per conseguenza non

può somministrare le molecole corrispondenti? Io non dissimulo la difficoltà, resterebbe ben presto sciolta, se si provasse il concorso de' due semi. Si sono vedute nel Articolo 338. le ragioni, le quali fanno credere, che le femmine non sieno provviste di un liquore *prolifico*. Io aggiungo, che se elle ne fossero provvedute, non so per qual ragione un quadrupede, un uccello, non moltiplicassero senz'accoppiamento, nella guisa che moltiplicano i gorgogli. Io mi fermerò dunque in questa quistione; se sia assurdo il pensare, che gli organi della generazione del maschio sieno stati costrutti in guisa, che abbiano de' rapporti determinati a diversi organi della femmina? Questa nuova supposizione non rivolterà coloro de' miei leggitori, che avranno ben meditato la conseguenza, che si deduce da' primi principj, e che risguarderanno meco il liquor femminile, come un fluido *nutritivo*, e la *generazione*, come un semplice *svilupamento* operato dalla *nutrizione*. E quanti fatti non ci conducono a questa conclusione! Io ho fatto osservare nell'Articolo 175. la spaventosa ripugnanza, ch'è tra il sistema del Sig. de Buffon, e la generazione de' *neutri* nelle api. (1) Questi *neutri* sono perfetti *bastardi* come l'indica il nome loro. Non solamente non generano, ma sono eziandio privi di  *Sesso*. La più fina dissezione ajutata da' migliori microscopj, non vi saprebbe scoprire il minimo vestigio degli organi interiori della generazione. Dunque sono *bastardi* fatti dalla natura fino dal loro principio. Ella aveagli unicamente destinati al travaglio, ed essa ha dato loro in questo stato degli strumenti, e delle specie di lavoratorj, i quali non ha dati a' maschi, nè alle femmine. Questi strumenti accordati a' *neutri*, sono relativi alla raccolta del miele, e della cera, alla preparazione della medesima, al suo im-

pie-

---

(1) Consultate qui l'Articolo 298.

piego, alla costruzione degli alveari, all'educazione de' parti ec. Se le molecole destinate alla produzione dell'embrione, *si modellassero* nelle parti del maschio, e della femmina, se elleno in seguito fossero rimandate da queste parti agli organi della generazione, come pensa il Sig. de Buffon, e' sarebbe impossibile lo spiegare, secondo questa ipotesi, la formazione di diversi organi propri de' neutri; poichè donde prendere i *modelli* di simili organi? Gl'individui generatori ne sono sprovveduti. Ma se si ammette, che gli organi della generazione de' maschi sieno stati fabbricati in maniera, che filtrino, e che preparino le molecole relative allo sviluppamento di tre spezie d'individui, la difficoltà resterà spianata, ed allora si concepirà, come accada l'evoluzione de' neutri. Le tre spezie d'individui sono state diseguate originalmente in piccolo nelle ovaje della regina ape: la fecondazione non procura de' nuovi organi a' germi neutri, nè annienta loro quelli della generazione, poichè non gli hanno mai avuti; essa dunque non fa altro, che mettergli in istato di svilupparsi, e di venire alla luce.

340. *Osservazioni sopra l'organo della voce del mulo.*

Un Fisico, che arrivasse a spiegare in un modo soddisfacente quella modificazione tanto maravigliosa, prodotta dal liquor femminile dell'asino nell'organo della voce del cavallo, allorchè e' lo trasforma, per così dire, in *mulo*, spiegherebbe nel tempo medesimo tutti i fenomeni della generazione. Io diceva nell'Articolo 136. che se si moltiplicassero le ricerche sopra il mulo fino nel suo interno, si moltiplicherebbono le difficoltà a proporzione, che si profundasse l'esame. La scoperta del Sig. Herissant n'è una bella prova, ed insegna a' Notomisti quanto possano promettersi in questa specie di ricerche. Dopo aver composto l'articolo precedente, ho voluto rileggere la Memoria

moria interessante di questo dotto Accademico, *intorno agli organi della voce de' quadrupedi, e degli uccelli.* (1) Metto sotto gli occhi del Leggitore il passo, che concerne il *mulo*. „ Il mulo, dic' egli, (2) ha una „ voce, che si rassomiglia molto a quella del suo padre, e non è niente simile a quella di un cavallo, che „ nitrisce: così gli organi, pe' quali e'ne forma i „ suoni sono moltiplicati, quasi come quelli della „ voce dell'asino, e fatti presso a poco nella medesima „ maniera. Il tamburo di una composizione tanto „ singolare, che si trova nella laringe dell'asino, e „ che dalla natura non è stato accordato al cavallo, „ essa lo ha bensì accordato al mulo. Ecco dunque „ un animale, che nasce da due animali di diversa „ specie, e che ne ha in parte una porzione di „ una struttura singolarissima, propria del maschio: „ questo è un fatto, la cui cognizione non potrebbe „ esser di poco momento per coloro, che attendono „ a schiarire il mistero della generazione, e „ che pensano come il Sig. de Reaumur con verosimiglianza, che i bastardumi di diverse spezie di „ animali debbano somministrarci i fatti più propri „ per decidere, quale delle opinioni sia vera rispetto „ a questa importante materia. „ Io ho osservato al principio, che il Sig. Herissant non dice, „ che l'organo della voce del mulo sia precisamente „ simile a quello dell'asino. La comparazione da esso „ fatta tralli due organi, l'obbliga a servirsi de' diminutivi *quasi, e presso a poco*. Egli dunque ha vedute „ delle dissomiglianze, e sarebbe da desiderarsi che l'avesse descritte, e che avesse fatto un parallelo sopra „ questo punto essenziale fino a' suoi ultimi termini. La quistione importante, che si procura „ decidere, lo esigea assolutamente. Io dunque sono  
sem-

---

(1) *Mem. dell' Accad. Ann. 1753. pag. 279. in 4.*

(2) *Ibid. pag. 287.*

sempre benissimo fondato a richiamare questo valente Notomista ad un esame più diligente, e scrupoloso. Egli medesimo teneva in mano un filo, che poteva condurlo alla scoperta del mistero della generazione. E' divide gli organi della voce in *semplici*, ed in *composti*. I primi non hanno propriamente, che la *glottide*; essa sola vi costituisce la parte essenziale dello strumento. Gli altri hanno, oltre la *glottide*, una, o più membrane tendinose, con simetria disposte, o specie di sacchi più, o meno ampi, e più, o meno densi, ora membranosi, ed ora ossosi, e finalmente una specie di cassa, o tamburo; e questi sono que' diversi pezzi congiunti alla *glottide*, e che qui producono le modificazioni principali della voce. (1) Con mio dispiacere non so, che nominare delle cose tuttora così poco conosciute, e che ci cagionano molta ammirazione; ma uscirei dal mio soggetto, se mi lasciassi allettare dal piacere di descriverle. Il cavallo, e l'asino ambidue hannò degli organi *composti*; questo punto mi sembra meritare una grande attenzione. Egli è vero, che l'organo della voce del cavallo è assai meno composto di quello dell'asino; e' non è formato che dalla *glottide*, e da una membrana triangolare, e tendinosa posta in piano sopra ciascuna estremità delle labbra della *glottide*, ed al meccanismo di questa membrana sono dovuti i tuoni acuti del *nitrato*. Vi ha maggiore apparato nell'organo della voce dell'asino. Una profonda cavità della cartilagine *tiroide*, forma una specie di cassa, o di tamburo. Questo tamburo è ricoperto di una membrana tendinosa, e molle, posta verticalmente all'estremità delle labbra della *glottide*. Là vi è una piccola apertura, che comunica col tamburo. Sopra le labbra della *glottide*, vi sono due sacchi, che  
hanno

---

(1) Ibid. pag. 282. e 283.

hanno c'ascheduno un foro quasi ritondo, tagliato in tralice, e rovesciato dalla parte dell'apertura del tamburo. (1) Ecco sicuramente un organo ben composto; ma tutta questa composizione non passa nel mulo. Il Sig. Herissant lo fa vedere abbastanza, allorchè dice, *che gli organi della voce del mulo, sono quasi altrettanto moltiplicati, come quelli della voce dell'asino*. Quelli dunque non sono tanto composti quanto questi. Dunque i primi non contengono tutti i pezzi, che ci offeriscono i secondi. La parola *quasi* mi autorizza a sufficienza a tirare questa conseguenza, daltronde molto conforme a' miei principj. Non si è esaminata ancora con tutta l'attenzione la laringe del cavallo. Non se ne conoscono tutte le parti, che modificate dallo sperma asinino, possono far comparire l'organo della voce del mulo più composto di quello del cavallo. Io non vògljo abbandonarmi alle conghietture, che mi vengono adesso nella mente. Elle non avrebbero fondamento, che nella mia ignoranza. Io attenderò nuovi lumi da' talenti, e dalla destrezza del Sig. Herissant, e me ne starò a' fatti, che incontrovertibilmente provano la preformazione de' corpi organizzati.

341. *Che il germe cresce avanti la fecondazione: perchè non termini di svilupparsi senza essa?*

Le uova crescono nelle galline vergini. Le loro ovaie ne contengono di ogni grossezza. Dunque vi cresce ancora il germe. Il giallo è una parte essenziale del pollo, (2) e il giallo esiste nelle uova, che ancora non sono state fecondate. Perchè i succhi della gallina, che possono fare sviluppare il giallo, non possono eglino operare lo sviluppamento dell'altre parti del germe?

Per-

---

(1) *Ibid.* pag. 285. e 286.

(2) Articoli 142. e 151.

Perchè il liquore del maschio è egli necessario a questo sviluppo? Alcune parti *resistono* più dell'altre; le ossa resistono più delle membrane. Il *ripiegamento* aggiugne della resistenza! l'evoluzione è più difficile nelle parti contornate, ripiegate, e che deono estendersi, raddrizzarsi, e svilupparsi. Se il cuore del germe batte avanti la fecondazione, questo battimento è troppo debole, per superare la resistenza de' solidi. Il liquor seminale gl'imprime un nuovo grado di attività. Gli accresce la forza impulsiva. Lo mette in istato di maggiormente aprire i vasi ec. L'incubazione trattiene quest'attività; un calore di 30. o 32. gradi del termometro del Sig. de Reaumur, basta per far nascere i pulcini. Le uova, che non sono state fecondate, sostengono questo calore per 30. 40. e ancora per 50. giorni con poca alterazione. Le uova infecunde conservate in un luogo fresco, sono mangiabilissime in capo ancora a cinque, o sei mesi. (1) Dunque l'uova infecunde non hanno il medesimo principio di corruzione, che risiede nelle feconde. Queste si corrompono ben presto sotto la gallina, o in un forno da pulcini, allorchè l'embrione non arriva a svilupparsi. Dunque questo principio di corruzione unicamente alla fecondazione è dovuto. Un moto interno accelera la corruzione degli umori. Dunque la fecondazione cagiona un moto interno negli umori dell'uovo. Questo moto farebb'egli diversa da quello della circolazione, accresciuto dalla fecondazione, e che dagli accidenti viene interrotto? Se il cuore battesse assai forte avanti la fecondazione, per fare sviluppare tutte le parti, perchè non svilupperebbesi egli tutto il germe senza il soccorso del liquore somministrato dal maschio?

342. *Fatti, che indicano l'incastramento. Risposta ad un calcolo contro questa ipotesi.*

Io

---

(1) *Arte di far nascere i pulcini ec.* del Sig. de Reaumur. Tom. II. pag. 290. e segg. della seconda edizione.

Io non ho rigettata la *disseminazione* de' germi ; ma ho fatto vedere che inclinavo verso l'*incastramento* , ed ho indicati varj fatti , che lo favoriscono . Ve ne sono degli altri , che non lo favoriscono meno degli accennati . Io non parlo de' feti trovati in altri feti ; poichè le storie ne sonò sospette . Ma si è trovato più di una fiata un uovo contenuto in un altro . ( 1 ) Si sono vedute ancora delle parti ossee di un feto contenute in un altro feto . ( 2 ) Si oppongono all'*incastramento* de' calcoli spaventosi . Hartsoeker asseriva , *che il primo seme starebbe all'ultimo , e al più piccolo , che comparisce l'ultimo anno del sessantesimo secolo , come sta l'unità seguita da trentamila zeri alla semplice unità* ; donde e'ne concludeva , che l'*incastramento* era assurdo . Il Signor Bourguet gli ha risposto benissimo , e col rispondere ad esso , ha risposto a tutti gli avversarj dell'*incastramento* . Io porrò qui la sua risposta , quantunque un poco lunga . „ Questo Autore , e' dice , ( 3 ) calcola la picco-  
 „ lezza di un granello di seme riguardo alla gros-  
 „ sezza che acquista , per esempio , una pianta in  
 „ un anno ; mentrechè questo calcolo non deve pren-  
 „ derfi , se io non m'inganno , che dal tempo che  
 „ bisogna , per far comparire il granello del seme  
 „ dal suo concepimento fino alla sua maturità . Io  
 „ chiamo *concepimento* lo stato , nel quale è un gra-  
 „ nello , dacchè il precedente è uscito dalla sua pian-  
 „ ta femminile ; perchè l'esperienza ha fatto vedere ,  
 „ che i semi ( 4 ) sono già nella piccola pianta , do-  
 „ ve

( 1 ) *Stor. dell' Accad.* 1742. pag. 42. dove i Sigg. Petit., e VVinslovv attestano questo fatto.

( 2 ) *Ibid.* 1746. pag. 41. il Sig. Morand.

( 3 ) *Lettere Filosofiche* cc. pag. 134. e segg.

( 4 ) Avanti la scoperta del Sig. de Haller intorno alla preesistenza del pulcino , non vi era nessuna esperienza . che dimostrasse questa cosa ; il Sig. Bourguet suppone dunque ciò , ch'era in quistione quando scrivea . Vedi l'Articolo 178.

„ ve crescono fino in una determinata proporzione,  
 „ nello stesso tempo, che tutte le parti della pianta,  
 „ che li contiene, crescono altresì dalla parte loro,  
 „ Dunque questa proporzione dee esser presa dal tem-  
 „ po, che passa tra questa specie di concepimento, e  
 „ l'intera perfezione del seme. Così il medesimo  
 „ tempo, che s'impiega a far crescere una pianta,  
 „ o un albero, serve in eguali spazj a perfezionare  
 „ una, o più generazioni di semi. Sembra, che l'  
 „ origine dell'equivoco proceda da ciò, che il Sig.  
 „ Hartsoeker pareva supporre, che gli Autori, che  
 „ seguitano il sistema degli sviluppamenti, credano,  
 „ che tutte le parti, che formano il volume di una  
 „ pianta nella sua perfetta grandezza, esistessero  
 „ avanti nel seme.... Ci allontaneremmo senza dub-  
 „ bio molto dalla verità, se si giudicasse dalla primie-  
 „ ra piccolezza del seme delle piante, e di quella  
 „ dell'uova, nell'ipotesi del medesimo Sig. Hartsoe-  
 „ ker, paragonandola colla grossezza, e grandezza,  
 „ che questi diversi corpi organizzati acquisteranno  
 „ dopo un certo determinato tempo più, o meno  
 „ considerabile. Perchè questa comparazione condur-  
 „ rebbe infallibilmente all'equivoco, che si dee schi-  
 „ vare; poichè bisognerebbe dire ammettendo il  
 „ principio del Sig. Hartsoeker, che l'uova degli ani-  
 „ mali di una medesima specie sarebbero state infini-  
 „ tamente diverse nella grossezza, e che i semi di  
 „ una medesima specie di pianta sarebbero del tutto  
 „ dissimili. L'egualità grande, che osservasi nel se-  
 „ me della maggior parte delle piante, dacchè inco-  
 „ mincia a comparire, e quella che hanno da princi-  
 „ pio l'uova di tutte le specie di animali, o i loro  
 „ pretesi vermi seminali, non distrugg' ella il fon-  
 „ damento del calcolo del Sig. Hartsoeker? Non bi-  
 „ sogna nè pure fondar talmente il calcolo, di cui si  
 „ tratta, sopra il tempo, dimanierachè uno si scordi  
 „ di risguardare la diversa tessitura de' germi, e mil-  
 „ le

„ le altre circostanze che rendono lo *svilupamento*  
 „ più pronto, o più lento: altrimenti bisognerebbe  
 „ dire, che un gigante di trent'anni farebbe vissuto  
 „ altrettanto più, quanto la sua macchina eccede  
 „ quella di un nano della stessa età. Frattanto, con-  
 „ tinua il Signor Bourguet, se si esamina la quistio-  
 „ ne da questa parte, e' sembrerà, che il calcolo non  
 „ sia tanto spaventevole, e si vedrà, che vi saran-  
 „ no conservate le proporzioni, secondo i moti più,  
 „ o meno pronti del progresso, che fanno i corpi or-  
 „ ganizzati nel loro accrescimento. Il minimogiardino,  
 „ e le piante più comunali somministrano mol-  
 „ ti esempi di questa varietà di progressi, intorno  
 „ a' quali i Geometri, se non m'inganno, non han-  
 „ no ancora esercitata la scienza del calcolo. Ma  
 „ quale sia stata la proporzione della piccolezza del  
 „ seme di quest'anno, con quella dell'anno passato,  
 „ da cui egli è uscito, ella non può essere, che co-  
 „ me il tempo ch'è bisognato, per rendere l'ulti-  
 „ mo perfettamente simile a quello, che l'ha pre-  
 „ ceduto. Supponghiamo, per esempio, che il seme  
 „ di cui noi parliamo da principio sia stato contenuto  
 „ in quello, da cui è uscito, in una reciproca ragione  
 „ del suo volume di cinque minuti, o trecento se-  
 „ condi, egli avrà potuto accrescere il suo volume  
 „ centomila volte in un anno, poichè trecento ses-  
 „ santacinque giorni, contengono *cinque-cento venti-*  
 „ *cinquemila, e seicento minuti*. Mi pare, che ne se-  
 „ gua da questo, che il seme, che comparve il pri-  
 „ mo anno del Mondo, starebbe a quello, che dee  
 „ comparire l'ultimo anno del sessantesimo secolo,  
 „ come il numero de' minuti, che contengono sei-  
 „ mil'anni, sta al semplice numero quinto. Sessanta  
 „ secoli non contengono, che *tre migliaja, cento*  
 „ *cinquanta-tre milioni, e seicento-mila minuti*. Que-  
 „ sto è un numero picciolissimo in comparazione di  
 „ quelli, che impiega il Sig. Hartsoeker. “ Prego  
 che

che si rilegga l'Articolo 274. Hartsoeker, ed i suoi compagni mettono quì i sensi, e l'immaginazione in luogo del puro intelletto. Essi vorrebbero, per così dire, vedere, e palpare quello, che la sola ragione può concepire.

343. *Sentimento del Sig. Bourguet sopra la generazione. Giudizio sopra questo Autore.*

Il Sig. Bourguet teneva una buona strada, per ischiarire la materia della generazione. Ma gli mancava la cognizione di una moltitudine di fatti, che sono stati scoperti molti anni dopo la pubblicazione del suo libro nel 1729. Il suo gusto veramente filosofico non avrebbe certamente adottate quelle nuove opinioni, che poco dopo si procurò d'introdurre nella Fisica de' corpi organizzati. Egli ammetteva la loro preformazione nelle uova, e non risguardava la generazione, che come un semplice sviluppamento, che si opera mediante l'influsso del liquor femminile, che in qualità altresì di fluido nutritivo lo considerava. E' lo definiva *un liquore spiritoso, che non è, che un estratto delle parti dell'animale, che lo comunica.* (1) Egli ammetteva ancora il concorso de' due femi, ed ecco come e' concepiva la generazione. „ Il „ liquore estratto da' due animali, diceva egli, (2) „ si mescola, ed agisce nell'uovo, dimodochè le parti più sottili del liquore vi entrano, e si uniscono „ col fluido, che circonda la piccola macchina organizzata, vi eccitano un moto, che mette il piccolo animale in istato di svilupparsi, col nutrimento, „ ch'esse gli somministrano, insinuandosi ne' suoi organi, che allora sono di una delicatezza tale, che „ ogni altro nutrimento non gli farebbe conveniente. La quintessenza, per così dire, del grande ani-

(1) Ibid. pag. 149.

(2) Ibidem.

„ animale , serve da principio di nutrimento all'embrione. “ Io ignorava i principj di questo valente Naturalista, allorchè componeva i Capitoli III. V. e VI. del primo Tomo di quest'Opera , e poichè mi ha prevenuto sopra un punto essenziale, mi sono fatto un dovere di riconoscerlo, trascrivendone il passo, che si è letto quì sopra. Sarebbe da desiderarsi, che questo stimabile Autore avesse maggiormente penetrata la sua idea , intorno al liquor femminile , e che ei l'avesse applicata più in particolare , e con più di chiarezza a casi diversi , che di sciogliere si era proposto. E' non spiega in nissun luogo, come si formi quel *estratto*, quella *quintessenza* del grande animale, e quel moto, che risveglia nel germe. Se uno si prende l'incomodo di leggere la maniera, di cui si serve, per render ragione della somiglianza de' figliuoli al padre, ed alla madre , (1) de' bastardi, de' giumenti, ec. (2) sono sicuro, che troverà, ch'è non ha tratto un partito abbastanza grande da' suoi principj, e che non gli ha analizzati abbastanza, e proverà meco del dispiacere, che abbia consumato un tempo prezioso nel confutare le *nature plastiche*, che avrebbe potuto impiegare più utilmente nel penetrare d'avvantaggio la sua materia, e nello sciogliere i fatti, che avea in mano. Ei dice delle cose eccellenti sopra il *meccanismo organico*; (3) ma tutto questo non mi pare, che sbizzato, ed avrei desiderato da per tutto più chiarezza, precisione, ed analisi. La sua definizione del *meccanismo organico* sembrerà un poco oscura: e' voleva conciliare diversi sistemì. Il *meccanismo organico*, e' dice, (4) *non è altro, che la combinazione del moto di un'infinità di molecole eterree, aeree, acquee, olio-*

---

(1) Ibid. pag. 154. 155.

(2) Ibid. pag. 161.

(3) Ibid. pag. 142. e segg.

(4) Ibid. pag. 164. e 165.

oliose, saline, terrestri ec. accomodate a de' particolari sistemi da principio dalla Suprema Sapienza, ed unite ciascuno ad un'attività, o monade singolare, e dominante, alla quale sono subordinate quelle, ch'entrano nel suo sistema. Egli si spiega un poco più chiaramente nel passo seguente, il quale, insieme col precedente formano la *conclusione* di tutti i suoi principj. „ Si possono, continua egli, (1) seguendo quest'idea sopra il *meccanismo organico*, conciliare tutti li sistemi, non essendovene alcuno, che qualche verità non contenga. I *modelli* si trovano in tutte le parti del corpo umano: la figura *ideale*, o *miniata* si trova nelle parti più spiritose dello sperma de' maschi, e delle femmine, poichè essi contengono in piccolo tutti i varj moti, che sono ne' grossi corpi organizzati. L'operazione di questo liquore è simile a quella degli elisirri, e degli spiriti a modo de' Chimici, che hanno dato luogo a tanti pensieri bizzarri, che si sono spacciati sopra questa materia; l'*embrione preformato* si trova finalmente nell'uovo, secondo il sistema degli *sviluppati*, che contiene gli altri senza contenerne le difficoltà. Vi è molta conformità trà l'impiego della gran quantità di materia, che serve all'accrescimento delle piante, e degli animali, ed un'infinità di diversi materiali, che impiegano gli uomini nelle arti meccaniche. Quì segue una circolazione maravigliosa: ciò che l'industria degli uomini, e il *meccanismo organico* tolgono alla terra, col tempo le vien restituito di un'altra maniera. Tutti i diversi materiali, di cui gli uomini si servono non cangiano mai di natura: non sono che mescolamenti, e disposizioni. Della medesima maniera le molecole organiche, ch'entrano ne' corpi organizzati, unendosi, „ e se-

---

(1) Ibid. pag. 165. e 166.

„ e separandosi, possono formare tutti i cangiamen-  
 „ ti necessarj, senzachè vi segua vera trasformazio-  
 „ ne nell'interiore delle cose. Elle bastano a tutto,  
 „ restando ciò, che esse sono, pel meccanismo insti-  
 „ tuito da Dio da principio. Dunque i corpi delle pian-  
 „ te, e degli animali sono in vero piccoli *mondi*; *serie*  
 „ infinite nel loro genere, che contengono un'infini-  
 „ tà di altré *serie* in minime espressioni dell'infini-  
 „ to. “ Del resto, il nostro Autore dalla considera-  
 „ zione de' *muli* ne tirava un argomento, in favore del-  
 „ la preesistenza del germe nella femmina. Ancora qui  
 „ bisogna, che io lasci parlare esso medesimo. Il passo  
 „ è degno di osservazione. „ Niente mi sembra più pro-  
 „ prio, e' dice, (1) a provare la realtà dell'azione  
 „ dell'estratto spiritoso de' corpi del maschio, e della  
 „ femmina sopra il feto, che l'esempio de' parti,  
 „ che sono stati generati da due animali di diversa  
 „ specie. Si vedono nel Piemonte (2) de' *giumen-*  
 „ „ *ti*, che si dividono in due specie: la prima specie,  
 „ che nasce da un'asina, e da un toro, *bis* appellasi,  
 „ e la seconda, che nasce da una cavalla, e da un  
 „ toro, si chiama *baf*. Questi animali, che sono  
 „ veramente *asini*, e *cavalli*, poichè i parti apparten-  
 „ „ gono alla specie della femmina, (3) portano nien-  
 „ „ tedimenò de' segni del maschio, vale a dire han-  
 „ „ no la fronte un poco gobba ne' luoghi, dove i tori  
 „ „ hanno le corna, l'una delle loro mascelle è un poco  
 „ „ più corta dell'altra, e la loro coda tira qualche  
 „ „ co-

(1) Ibid. pag. 160. e segg.

(2) Vedi l'Histoire Générale des Eglises Evangeliques des Valées de Piémont par Mr. Leger Chap. I. pag. 7. e 8. Leiden 1669.

(3) L'argomento, che il Sig. Bourguet trae qui da' *muli* in favore della preesistenza del germe nella femmina, non era abbastanza concludente per fondare quest'asserzione, onde non avrebbe dovuto darlo in buona Logica, che per un supposto probabile. Vedi l'Articolo 333. verso il fine.

„ cosa da quella del bue. Quanto a' *muli*, che sono  
 „ comuni in Piemonte, ed in tutt' i paesi meridio-  
 „ nali dell' Europa, siccome l' asino non è tanto di-  
 „ verso dal cavallo quanto è diverso il toro, così le  
 „ specie ne' parti ne vengono più confuse: contutto-  
 „ ciò i segni del maschio vi sono sensibilissimi, ben-  
 „ chè il mulo sia un cavallo, e non un asino viziato,  
 „ come ognuno può restarne convinto esaminandolo  
 „ con attenzione. Questa doppia specie di mostri  
 „ prova ad evidenza, che i primi corpuscoli organiz-  
 „ zati sono nell' uova delle femmine, e non nello  
 „ sperma de' maschi, e che quello liquore mescolato  
 „ con quello della femmina agisce sopra il corpo pre-  
 „ ventivamente organizzato, lo sviluppa, e gli ser-  
 „ ve di suo primo nutrimento. I figli, che nascono  
 „ da un padre bianco, e da una madre nera, o da una  
 „ madre bianca, e da un padre nero, provano asso-  
 „ lutamente lo stesso, riguardo agli uomini “. 'Co-  
 „ loro, che hanno scritto sopra la generazione dopo il  
 „ Sig. Bourguet, quando non avessero fatto altro, che  
 „ rimaneggiare i suoi principj, perfezionargli, svilup-  
 „ pargli, e applicargli a' nuovi casi, parmi che avreb-  
 „ bono travagliato con più successo, che non hanno fat-  
 „ to in particolare gli Autori delle nuove opinioni.

344 *Sentimento di un Enciclopedista  
 sopra la generazione.*

Il dotto autore dell' interessante Articolo, *Genera-  
 zione* nell' Enciclopedia, ha procurato ancor esso di  
 penetrarne il mistero; ma non sò se la soluzione sem-  
 brerà luminosa. Nulladimeno la trascriverò, poichè  
 devo far menzione de' sentimenti de' Fisici, che si  
 sono più accostati a' miei principj. „ Se il feto, dice  
 „ quest' Autore, (1) preesiste nell' uovo della ma-  
 „ dre, come può essere, che il figlio si rassomigli a  
 „ suo

(1) *Encycloped.* Tom. VIII. pag. 569. 2. colonne vers le milieu.

„ suo padre? Questa obiezione passa comunemente  
 „ per insolubile; ma non si potrebbe togliere ogni  
 „ difficoltà col rispondere, che la disposizione degli  
 „ organi dell'embrione, avanti, e dopo la seconda-  
 „ zione, dipende molto dall'attività più o meno  
 „ grande, colla quale s'esercita, si trattiene la vita  
 „ della madre, e dell'influenza di quest'attività,  
 „ acciocchè sia conformata in tale, o tal maniera,  
 „ analoga a quella di cui questa medesima azione  
 „ della vita (*vis vitae*) nella madre è adattata a' suoi  
 „ proprj organi, e che questa medesima disposizione  
 „ delle parti dell'embrione non può, che dipendere  
 „ altresì più, o meno dalla forza, colla quale elle-  
 „ no sono state messe in opera per l'effetto dello  
 „ spirito seminale del padre, di cui elle sono state  
 „ impregnate? Donde ne segue, che la somiglian-  
 „ za tira più o meno dal padre, o dalla madre,  
 „ secondo che l'uno, o l'altra hanno più influito,  
 „ per quello ancora, che somministra nella genera-  
 „ zione, e la formazione, e lo sviluppamento del  
 „ feto sopra il principio della vita, e l'organizza-  
 „ zione dell'embrione, che ne riceve a proporzio-  
 „ ne una forma più, o meno simile a quella del  
 „ padre, o della madre? Questo può render ragio-  
 „ ne non solamente di quello, che si osserva ri-  
 „ sguardo alla somiglianza quanto alla figura, ma  
 „ ancora risguardo a quella del carattere “.

345. Sentimento del Sig. de Haller

*sopra la generazione.*

Il Sig. de Haller ne' suoi *Corollarj misti* sopra il pul-  
 cino, pubblicati in Lusanna nel 1758. dà una leggiera  
 descrizione delle sue idee sopra la generazione. E' una  
 specie di soluzione, ch'è deduce dalle sue scoperte  
 sopra la formazione del pulcino, e ch'è presenta co-  
 me un risultato dell'osservazione. Io non renderei  
 tutta la giustizia dovuta a questo illustre Fisico, e che  
 godo sommamente di rendergli, se non ponessi qui le  
 pri-

prime sbozze di una teoria, ch'egli saprà perfezionare, ed abbellire nella sua grand'Opera della *Fisiologia*. „ Che mi si opponga, e' dice, (1) l'esempio de' „ muli, e degli animali *ibridi*, che effettivamente „ spesso si rassomigliano al maschio con de' segni distintivi; io crederei contuttociò di poter rispondere. Le mie prove sono dirette: se non v'ha „ qualche falsità ne' fatti, non vene saranno certamente nelle conclusioni. Sarebbe una cosa poco filosofica il dire, che l'arteria del giallo sia nata altre volte da un'arteria della madre, ch'ella si sia staccata nel parto, e ch'è si sia innestata sopra un'estremità dell'arteria mesenterica del feto preparata per essa: che sia accaduto il medesimo della vena, e che tutto il giallo si sia innestato nel medesimo tempo, mediante un piccolo canale in un intestino dell'embrione. Ma come si spiegano nel mio sistema le lunghe orecchie del mulo: i piedi di pollo nell'uccello natoda ungallo, e da un'anitra: il grosso becco dell'uccello bastardo generato dal calderinò, col cardellino femmina? Io meccanicamente non saprei spiegarlo, ma so vedere, „ che questi fenomeni non sono niente contrarj al „ sistema degli Ovaristi. Lo sperma del maschio ha „ senza dubbio la potenza di far crescere qualche „ parte dell'animale più dell'altre; e' fa crescere i „ peli dela barba nell'individuo, di cui egli fa parte, e non fa crescere i capelli: e' fa germogliare le corna degli animali, dal cervo fino allo scarafaggio, e' prolunga le zanne de' cignali, e dell'elefante. Se egli ha la potenza di far germogliare „ certe determinate parti del corpo, con preferenza all'altre nel corpo medesimo, che lo prepara, „ c'può averlo nel corpo del feto, da esso animato. „ Egli

(1) *Memorie sopra la formazione del pulcino* ec. Mem. II. sezione XIII. pag. 189. e 190.

„ Egli può fare in maniera, che germogli il sangue  
 „ con maggior forza nell'arterie dell'orecchia, o del  
 „ becco, e la difficoltà resta sciolta (1). Egli è ben  
 „ vero, che la mia risposta non ispiega il *come*, nè  
 „ il meccanismo, col quale lo sperma mascolino ri-  
 „ sveglia il germe dell'orecchia, e ne ingrandisce  
 „ lo sviluppo. Ma io non devo essere obbli-  
 „ gato a spiegare questo *come*, purchè i miei fatti  
 „ sieno veri. L'influenza dello sperma intorno all'  
 „ aumento della barba, e delle corna, vien dimo-  
 „ strato dalla esperienza, che tutto giorno vediamo,  
 „ e tocchiamo colle nostre mani, quantunque il co-  
 „ me debba forse ignorarsi per sempre “. Avanti,  
 e dopo la pubblicazione de' *pulcini* del Sig. de Hal-  
 ler, noi ci eramo sovente trattieneuti con lettere so-  
 pra la *generazione*, ed io avevo avute molte occa-  
 sioni di assicurarmi, che noi eramo della stessa sen-  
 tenza sopra lo *svilupamento*, e sopra l'*influenza* del  
 liquor seminale. Questa conformità, di cui mi glo-  
 rio, mi diede un poco di confidenza per le mie idee,  
 e mi allettò a ricercarle con maggiore attenzione,  
 a trattarle con maggior profondità, ed a maggior-  
 mente concatenarle insieme, ed ho procurato di far-  
 lo in questo Capitolo. Una delle difficoltà, che mag-  
 giormente ho premuto col Sig. de Haller, è stata  
 quella, che somministra l'aumento delle uova nelle  
 galline *vergini*. *Le uova crescono in queste galline*,  
 gli dicevo; dunque *vi cresce ancora il germe*. *Pex-*  
*chè non può egli pe' l medesimo mezzo terminare di*  
*svilupparsi?* *Perchè gli bisogna il soccorso della fecon-*  
*dazione?* Noi rispondiamo, che i *sughi della madre*  
*possono fare sviluppare il giallo, ma non le parti ossee*  
*del germe. Contuttociò i succhi della madre fanno svi-*  
*lup-*

(1) Mi pare che questo non bastasse, per render ragione de'  
 sorprendenti cambiamenti, che seguono nell'organo della voce  
 del mulo. Vedi ciò che ho detto di sopra negli Art. 332. e 336.

*lupparsi i suoi propri ossi assai più duri; ho detto di sopra, che le parti ossee del germe non possono svilupparsi, che per l'azione del suo cuore, e che se egli batte avanti la fecondazione, batte troppo spessatamente. La risposta del mio illustre confratello fu tale, quale io l'aveo preveduta. Io ho già parlato, mi scrisse egli, della facoltà irritante dello sperma maschile nella mia Fisiologia: io credo la cosa vera. Perchè, donde procede, che l'embrione il quale vivea non cresce? Perchè i suoi vasi non erano dilatati. E perchè non erano dilatati? Perchè il cuore non batteva con forza sufficiente. E donde questa nuova forza dopo l'accoppiamento? E non è seguito niente di essenziale, se non il ricevimento dello sperma del maschio: la sola agitazione del congiungimento non risveglia, senza quella forza, l'embrione.*

346. Nuova considerazione intorno alla moltiplicazione senza congiungimento.

Io ho tentato di rispondere nell'Articolo 73. alla quistione, come segua la moltiplicazione senza il congiungimento? Devo presentemente offerire una nuova considerazione. Gl' insetti, che moltiplicano senza il congiungimento, e quelli che moltiplicano per incisione, sono tutti assai molli; la maggior parte sono ancora gelatinosi: i loro embrioni deono essere ancora più molli, e molto più delicati; dunque le parti di questi embrioni resistono pochissimo; dunque il cuore, o l'organo, che ne fa le veci, potrebbe avere forza abbastanza, per aprire di per se medesimo i vasi, e per superare la resistenza de' solidi, che non hanno quasi, che la consistenza di un fluido. Gl' insetti sottoposti alla legge dell'accoppiamento hanno più o meno parti scagliose, e molto dure; le quali originalmente resistono d'avvantaggio, che quelle le quali deono restar sempre molli, o ancora gelatinose. Così negli androgini, i succhi preparati, che la madre manda agli embrioni, bastano per farli sviluppare. Le

*mate* degli uccelli, quelle degli insetti ci offeriscono degli esempj di uno sviluppo analogo ne' tutti organizzatissimi. I germi delle nuove piume, quelli delle nuove pelli si sviluppano senz'altro soccorso, che quello de' fucchi, che ricevono dall'individuo. Nella medesima maniera o presso a poco, il bruco fa crescere la farfalla, (1) il gambero germoglia delle nuove zampe, (2) il polipo una nuova testa ec. (3) E come io diceva nell' Articolo 73., la moltiplicazione senza congiungimento ci sembrerebbe la più naturale, se ci fosse più familiare. Egli è molto più sorprendente, che per produrre un individuo, bisogni il concorso di altri due individui.

## C A P I T O L O   V I I I .

*Considerazioni sopra la formazione de' mostri.  
Conclusione.*

*457. Celebre disputa sopra i mostri.*

**I**L mio piano non è di trattare a fondo de' mostri. Questa materia altrettanto varia, quanto difficile basterebbe sola per un grosso volume. Io non ho fatto altro nel Capit. III. del primo Tomo, che leggermente sfiorarla. Si fa la lunga, e famosa disputa de' Sigg. Lemery, VVinslovv, che non terminò, se non alla morte di uno de' disputanti; si disputava da una parte, e dall'altra con de' mostri, e quando la vittoria bilanciava si ricorreva alle sottigliezze metafisiche. Il Sig. Lemery sosteneva, che la formazione de' mostri doveasi ripetere dalle cause accidentali, ch'egli assegnava, e ch'egli sapeva impiegare  
con

---

(1) Art. 160. e 161.

(2) Art. 262.

(3) Art. 264.

con molta sagacità, e spirito. Il Sig. VVinslovv metteva da banda tutto questo apparecchio di spiegazioni Fisiche, e collo scalpello alla mano, ei pretendeva trovare in certi mostri delle prove incontrastabili, che la loro formazione era unicamente dovuta a delle uova originalmente mostruose. Uno Storico degno (1) di giudicare i due celebri avversarj, ci ha data una breve relazione della loro disputa. Si leggerà con piacere nella Storia dell'Accademia Reale delle Scienze dell'anno 1740.

348. *Fatti favorevoli all'ipotesi delle cause accidentali.*

Non appartiene a me il decidere una quistione, che ha diviso, e tuttora divide i più valenti Fisici, ma dirò bene, che varj fatti mi sembrano confermare il sentimento del Sig. Lemery; ne accennerò alcuni. Sesi chiama *mostro* una produzione organica, la cui forma esteriore, ed interiore differisce da quella, ch'è propria della specie, i *muli* dunque saranno veri *mostri*. Bisognerà egli per ispiegare tali mostri ricorrere alle uova originalmente mostruose? Credo, che non si penserà questo, e poi come un germe di *mulo* verrebbe egli a presentarsi ad un certo determinato punto, nel momento, che un asino secondasse una cavalla? Ecco dunque già una specie di mostri, che dee la sua formazione a delle cause puramente *fisiche*, e si è veduto nel Capitolo precedente il modo *naturale*, con cui ho tentato di spiegare questa formazione. Un ramo si attacca ad un altro ramo, un frutto ad un altro frutto, una foglia ad un'altra foglia ec. e questa unione *accidentale* diventa tanto intima, che i due tutti non ne formano che un solo. La quarta memoria delle mie *Ricerche sopra l'uso delle foglie nelle piante*, presenta degli esempli mar-  
rati-

---

(1) Il Sig. de Fontenelle.

ravigliosi, e varj di questa specie di *nesto*, e delle mostruosità, che ne risultano. Gl' *innesti*, che fa l' arte o sopra i vegetabili, o sopra gli animali, cagionano altrigenerei di mostri. Io ne ho trattato molto in quest'Opera, allorchè ho intrapreso a render ragione delle riproduzioni vegetabili, ed animali; questi mostri non risiedevano originalmente ne' germi, che li rappresentano in piccolo. Potrebbonfi chiamare *artificiali*, per opposizione a quelli puramente *naturali*. Quello che accade alla scoperta tra due rami, che si attaccano l'uno all'altro, accade il medesimo nell'oscurità di un'ovaja, o di una matrice tra due uova, che si toccano per qualche punto della loro superficie. Due feti umani, che non sono uniti, che per la spina, imitano benissimo due rami, o due frutti innestati per *approssimazione*. Si vedono qualche volta delle uova, che contengono due gialli; dunque contengono due germi: se questi germi arrivassero a svilupparvisi, egli è chiarissimo, che potrebbero facilmente unirsi, od innestarsi per diversi punti delle loro parti esteriori. Tale era apparentemente l'origine di quel pollo mostruoso da quattro gambe, che il Sig. de Reaumur trovò in un uovo covato per lo spazio di diciannove giorni (1). Questo eccellente Fisico ricorre egli medesimo alla spiegazione, che porterò qui sotto, e non crede, che la cosa si possa mettere in dubbio. „ Io avevo veduto, e dice, un germe di più in quell'uovo, che nell'altre uova; li due germi si erano riuniti, e non era restato all'esterno, che le due coscie, e le due gambe dell'animale in uno de' germi. Tutto questo, aggiunge egli, non ha bisogno di prova“. Io ho parlato, ed insistito molte volte sopra la delicatezza prodigiosa delle parti dell'embrione, e le ho rappresentate quasi come fluide; elle dunque allora sono pene-

---

(1) *Nouv. sopra gl'innesti*. Tom. II. pag. 42. e 48.

penetrabilissime. In questo stato egli è facilissimo, che i due germi si confondano in tutto o in parte. Una confusione totale tirerebbe seco la totale distruzione degli organi: ma gli organi *simili* non si confonderebbono che per metà, potrebbero unirsi per quelle metà corrispondenti, che sussistessero, e non formare in questa maniera, che un organo solo, un solo tutto individuale. In questa maniera il Sig. Lermery rendeva ragione di un mostro umano a due teste sopra un corpo solo. La sezione faceva, per così dire, toccare con mano la riunione delle due metà de' due feti, ch'erano arrivati a non comporne che un solo. Bisogna leggere nella Storia dell'Accademia del 1740. la descrizione chiarissima, ed ingegnosissima delle osservazioni del dotto Notomista. Secondo questa ipotesi, i mostri *per eccesso*, o che hanno uno, o più membri *soprannumerarij*, li traggono da un altro germe, tutto il resto del quale è perito.

349. *Mostri per accidente, la formazione de' quali non procede dall'unione de' due germi.*

Ma vi sono altri mostri *per eccesso*, l'origine de' quali è diversissima, e merita, che vi si faccia riflessione. Un feto umano a 26. coste appartiene alla classe de' mostri *per eccesso*. Il Sig. Hunauld, che possedeva in sì alto grado l'arte di vedere, e di tagliare, ha dimostrato, che queste coste soprannumerarie non sono dovute, che ad uno sviluppo eccessivo di una specie di appendice ossea delle *apofisi trasverse* della settima vertebra: io non descriverò questo fatto rimarcabile, poichè devo mandare il mio lettore alle Memorie dell'Accademia delle Scienze, del 1740. pag. 277. e seguenti dell'edizione in quarto. Le medesime cause, o cause analoghe, possono dar luogo ad altri *eccessi*, e conseguentemente ad altre *mostruosità*, delle quali non bisognerebbe cercarne l'origine nella confusione *parziale* de' germi, o nella loro riunione per una specie di *nesto*, imperciocchè lo sper-

ma dell'asino che ingrandisce le orecchie del cavallo, e modifica la sua laringe, agisce presso a poco come le cause delle quali parliamo. Le cause contrarie produrranno i mostri *per difetto*, più facili di tutti a spiegarsi. Una certa pressione sopra i solidi tuttora gelatinosi, e che quasi si toccano, potrà altresì riunirli in una sola massa. Li feti umani che non hanno che venti, o ventidue coste sono specie di mostri *per difetto*. Il Sig. Hunauld dimostrava ancora, che questa specie di *difetto* proveniva qualche fiata dall'unione di due coste in una sola: (1) si è veduta una simile unione nelle dita, ed in molte altre parti e molli ed ossee, che dico io! Si è veduto un bambino di ventidue mesi, privo di articolazioni, e tutta l'ossatura del quale non era composta che di un solo osso. (2) S'immaginano molte cose naturali capaci di alterare diversi organi nel germe, di opprimerne l'evoluzione totale, od in parte, di mutare la loro forma, le loro proporzioni, il loro ordine rispettivo ec. Questi cambiamenti che sembrano prodigiosi nel feto del suo tempo, voglio dire nel feto allorchè è vicino alla nascita, e molto più ancora nel fanciullo, perchè l'evoluzione ingrossa tutto, possono accadere nel germe da piccolissime cause. Una *gelatina* cede facilmente ad ogni minimo impulso, e facilmente prende delle nuove forme. Invece di maravigliarsi de' mostri, uno si dovrebbe maravigliare, ch'è non sieno ancora più comuni.

350. *Varj, esempi di mostri.*

Io farei un libro più voluminoso di questo, se solamente accennar volessi i mostri, e tutte le mostrosità di diversi generi, che gli antichi ed i moderni ci hanno descritti. Ora una specie di ciclopo sen-

(1) *Memorie dell' Accademia*, 1740. pag. 337.

(2) *Memorie del Sig. Lemery sopra diversi mostri. Mem. dell' Accad.* 1740. pag. 439. e segg.

senza naso, senza bocca, e che non ha che un occhio solo in mezzo alla fronte (1). Ora un feto assolutamente privo di sesso, e di ano (2). Ora un figliuolo, che porta il suo cuore pendente dal collo come una medaglia (3). Un'altra volta un feto senza cervello, senza cervelletto, senza midolla spinale, almeno apparenti, poichè si sono veduti tali mostri, che sono vissuti molte ore, ed hanno preso del nutrimento (4). Altronde una massa quasi informe, che non hanè testa, nè collo, nè scapule, nè braccia, nè polmone, nè cuore, nè stomaco, nè milza, nè pancreas, nè intestino sottile (5). Ecco alcuni esempj di mostri *per difetto*, e di quelli *per trasposizione*, presi nella spezie umana, ed alcuni altri *per eccesso*. Si vedono de' mostri a due teste accanto una all'altra, e di cui tutto il resto del corpo è formato presso appoco come l'ordinario: (6) altri mostri con due teste hanno ancora quattro braccia, e quattro gambe; questi mostri si diversificano pe' l' modo, con cui si fa la congiunzione de' due germi; le due teste non si trovano sempre poste accanto l'una all'altra, e per conseguenza cangia ancora la situazione rispettiva dell' estremità (7). Siccome nascono de' mostri a due teste sopra un corpo solo, nascono altresì de' mostri da due corpi sotto una sola testa, e ciascun corpo ha tutte le parti, che sono proprie della specie (8). Qualche volta la congiunzione de' germi si fa verso la metà del corpo, ed uno de' due non ritiene, che la metà delle sue membra:

---

(1) Ibid. Il Sig. Mery. 1709.

(2) Ibid. Il Sig. Mery. 1716.

(3) Ibid. Il Sig. de Vaubonais 1712.

(4) Ibid. Il Sig. Mery 1711.

(5) Ibid. Il Sig. Mery 1720.

(6) Ibid. Il Sig. Lemery 1724.

(7) Ibid. Il Sig. du Verney 1706.

(8) Ibid.

bra: si è veduta una bambina ben formata, che avea alla regione dello stomaco la metà inferiore, e le corrispondenti estremità d'un feto. (1) Ne' mostri *per difetto* una o più parti si scancellano, si distruggono, e periscono; in quelli *per eccesso* una o più parti di un germe si uniscono, e si *anastomafano* con un altro germe; ovvero due o più parti di un medesimo germe si uniscono per non formarne che una sola. L'*analogia* tralle parti favorisce questa unione, siccome ella favorisce quella dell'*innesto* col *soggetto*. Direbbesi, che si fossero date tutte le combinazioni possibili. Se due parti si uniscono per non formarne che una sola, una parte sola si divide qualche volta, per formarne due distinte, e simili. Una donna, che avea avuti molti figliuoli, e che era morta in età di 40. anni di una malattia di petto, avea due matrici benissimo organizzate, e fatte a cuore; avea una sola vagina, ma al collo vi avea due orifizj corrispondenti alle due cavità, o alle due matrici distinte, e simili. La lama interna del peritoneo le divideva, e somministrava a ciascheduno un distinto inviluppo, e l'ispezione fece conoscere, che tutte due erano state occupate, senza poter distinguere, quale delle due fosse stata più volte occupata; l'altre parti del viscere, cioè le ovaie, le trombe, i legamenti, erano come nello stato naturale. (2) Una simil matrice rende facili le *superfetazioni*: elle sono ordinarie negli animali, le femmine de' quali hanno molte matrici, come quella del lepre. Si vede benissimo, che non bisogna cercare l'origine di questa doppia matrice nell'unione di due germi; ella dipendeva probabilmente dalle cause, che aveano agito sopra il viscere medesimo, e particolarmente sopra la lama interna del peritoneo, che l'aveano eccessivamente prolungata, e che ne aveano

no

---

(1) Ibid. Il Sig. VVinslovv.

(2) Stor. dell'Accad. delle Scienze an. 1752. pag. 75. e 76.

no diretta l'evoluzione in maniera da farne nascere una mostruosa duplicatura.

351. *Osservazioni importanti in favore de' mostri per accidente. Diversità tra il germe ed il feto, relativamente alla forma, ed alla disposizione delle parti. Inegualità nell'evoluzione.*

Io farò un'importante osservazione intorno a' mostri, che mi sembra molto favorevole al sistema delle cause *accidentali*. Mentrechè il pollo è ancora nello stato di *germe*, tutte le sue parti hanno delle forme, delle proporzioni, delle situazioni, che differiscono moltissimo da quelle che l'evoluzione farà loro rivestire, dimanierachè se noi potessimo vedere questo germe in grande, tale com'è in piccolo, ci sarebbe impossibile di riconoscerlo per un pulcino. Non si ha da far altro per rimanerne convinto, che rileggere l'Art. 146. Il pulcino esteso allora in linea dritta, non presenta, come il verme spermatico, che una grossa testa, ed una coda sottile, che contiene gli sbizzi del tronco e dell'estremità: questa forma, e questa situazione dell'ossatura, che non farebbersi certamente indovinata, possono render facili certe unioni tra due germi, che diventerebbono difficili tra due embrioni un poco sviluppati, e assolutamente impossibili tra due feti prossimi a venire alla luce. Il germe non è, per così dire, composto che di un seguito di punti, che dopo formeranno delle linee; queste linee si prolungheranno, si moltiplicheranno, e produrranno delle superficie. L'uomo ed i quadrupedi nello stato di *germe*, hanno senza dubbio essi ancora delle forme, e delle situazioni che non sono niente simili a quelle che acquisteranno per lo sviluppo. Quindi gli abboccamenti, le *anastomasi* tra due o più germi che cagionano diverse specie di mostri, la formazione de' quali esercita la sagacità, e l'accortezza de' Fisici. Si osserva, che i mostri per *ecceffo* sono più comuni negli animali che mettono alla

alla luce molti parti in una volta, che in quelli che non ne producono se non uno o due: onde deve accadere più frequentemente ne' primi che s'incontrino due germi, che ne' secondi. La particolare struttura delle ovaje, delle trombe, delle matrici, e varie altre circostanze tendenti a questo, possono pur esse influire assai in questi incontri fortuiti. Finalmente tutte le parti del germe non si sviluppano insieme, e con uniformità: le osservazioni fatte intorno alla incubazione delle uova lo dimostrano; (1) e questa inegualità nell'evoluzione deve modificare gli effetti del contatto, della pressione, dell'aderenza, della penetrazione scambievole, del nesso ec. Ancora qui v'è un importante osservazione, e non è scappata al Sig. Lemery. Ecco come il Sig. de Fontenelle l'ha data, dietro alle riflessioni del valente Fisico. „ Non „ bisogna, dice egli, (2) rappresentarsi, che i due em- „ brioni si distruggano per metà l'uno coll'altro, co- „ me due animali che non differiscono, se non in „ grandezza, con animali venuti di fresco alla luce. „ Ne differiscono più essenzialmente in ciò che pos- „ sono non avere ancora tutte le loro parti svilup- „ pate, o che le avranno più o meno sviluppate „ alcune dell'altre; poichè come si è veduto nella „ storia del 1739. dietro la scorta del medesimo Sig. „ Lemery, e in quella del 1701. lo sviluppamento „ del feto non solamente è successivo in maniera, co- „ me dee esserlo naturalmente, ma inegualmente „ distribuito tralle sue diverse parti, poichè dipende „ dalla sua età. Quindi si concepisce agevolmente, „ che quella tal parte che sarà distrutta dalla na- „ tural pressione de' due feti, non sarà stata una „ pressione perfettamente eguale a quella de' due al- „ tri,

(1) Consultate Malpighi *de ovo incubato*, e soprattutto la seconda Memoria del Sig. de Haller *intorno alla formazione del pollo*.

(2) *Stor. dell' Accad.* 1740.

„ tri , poichè ella non esisteva ancora in que' due  
 „ ultimi che si supporranno più giovani. Può altre-  
 „ si accadere , che due embrioni di diversa età si  
 „ offendano , o si premano in maniera , che quello  
 „ che sarà stato distrutto in uno , rimanga nell'al-  
 „ tro. E basterebbe ancora la sola diversità di, for-  
 „ za con eguale età. Ancora da questi principj ge-  
 „ nerali e' nascer deono molte varietà “.

352. *Altra osservazione in favore de' mostri per accidente. Differenza tra il germe ed il feto , relativamente alla consistenza.*

Il germe umano , quello di un quadrupede , o di un uccello , dopo la fecondazione acquistano una consistenza , che probabilmente non differisce molto da quella di un polipo. Ora niente favorisce tanto la unione tra due tutti organici , quanto la *duttilità* delle parti , e la quantità , siccome la qualità dei succhi , de' quali elle sono continuamente imbevute. Le goccioline della medesima gelatina , o di una gelatina analoga facilissimamente si uniscono. Molto minore analogia ancora , e maggior consistenza non impedirebbono nè pure , che due tutti organici s'innestassero : quanto differisce egli lo sprone del gallo dalla sua cresta? (1) L'arte , e soventi volte il caso , riuniscono delle porzioni di polipo , o diversi polipi , donde nascono cento specie di mostri ; io ho raccontate molte maraviglie in questo genere. (2) Se il Sig. Lemery le avesse conosciute , con qual piacere , e con qual destrezza non le avrebbe egli fatte servire di prova alla sua ipotesi! E non si dica , che la semplicità della organizzazione del polipo non permette , che io lo paragoni all'uomo , ed a' grossi animali. Quante parti *similari* in questi ultimi ! Quante parti ancora *dissimilari* , che l'espe-  
rien-

(1) Articolo 271.

(2) Capitolo XI. Tomo I.

rienza dimostra poterfi riunire, per non formare, se non un sol corpo! Ione ho riportato un bell'esempio nell' Artic. 270. che il mio Leggitore consulterà attentamente. Se tutte le parti, ch'entrano nella composizione di una coscia, possono rifarsi, e riunirsi, dopo essere state totalmente tagliate, e separate, perchè due coscie, due braccia, due spine ec. ancora gelatinose, non potrebbero elleno innestarsi *per approssimazione*? Vi sono d'altronde de'mostri, la sola ispezione de' quali basta per istabilire, che la loro formazione è dovuta ad un simile innesto. Il Sig. Lemery ne produce degli esempj. decisivi, e quelli che gli oppone il Sig. VVinslovv, non mi sembrano provar altro, se non che non potrebbero concepire in certi feti mostruosi, come tale, o tale unione abbia potuto operarsi tra due germi. Ma questo illustre Notomista non si ricordava senza dubbio delle osservazioni di Malpighi sopra il pulcino, che provano, siccome quelle del Sig. de Haller, che la forma, e la situazione delle parti del germe, non sono simili a quelle delle parti del feto. Se noi potessimo osservare i progressi del nesso tra due germi, osservare i diversi effetti, ch'ei vi produce, e dopo paragonarli a' cambiamenti, che l'evoluzione insensibilmente vi arreca, la spiegazione di questi mostri non c'imbarazzerebbe tanto, e noi avremmo la chiave dell' enigma. Accaderebbe ancora il medesimo, se ci fosse possibile di operare sopra due germi, come operiamo sopra due polipi; noi produrremmo ben volentieri diverse specie di mostri umani.

353. *Mostro citato per prova dell' esistenza de' germi mostruosi. Riflessioni intorno a questa materia. Come si possa concepire, che accadano certe divisioni accidentali.*

Siccome si danno delle unioni, le quali non si può concepire come accadano, allorchè si considerano nell' animale sviluppato, così si danno ancora delle

le divisioni di parti, delle quali similmente non si può assegnare la vera causa, senzachè nientedimeno nè l' une, nè l'altre possano risguardarsi in buona Logica, come prove incontestabili dell' esistenza de' germi *originalmente* mostruosi. Frattanto si allegano, come una rigorosa dimostrazione dell' esistenza di simili germi, *due cervelli in una sola testa*, i quali, dice il Sig. VVinslovv, (1) *direbbesi facilissimamente essere stati formati dalla confusione di due corpi uniti insieme, ma* aggiugne egli, *da questi due cervelli uscivano de' nervi, che accompagnati a due a due si diramavano nel medesimo corpo. E' domanda, se questi nervi potessero essere quelli dell' altro corpo, che si supporrebbe del tutto annientato, eccettuato il solo cervello, da cui essi partivano? E' domanda, ancora, come questi nervi avessero potuto restar soli del corpo annientato, e come avessero potuto essere così meccanicamente accompagnati cogli altri nervi del corpo conservato?* La semplice esposizione del fatto prova sicuramente, che questo mostro non dovea la sua origine alla confusione de' due germi, e riguardo a questo io penso comè il Sig. VVinslovv; desidererei però la verità più circoscritta. Ma questo dotto Accademico non commette egli qui quel sofisma, che chiamasi *enumerazione imperfetta*? Perchè il mostro, di cui si tratta, non dovea la sua origine alla confusione de' due germi, ne segue egli *necessariamente*, ch'ei la dovesse ad un germe *originalmente* mostruoso? Non farebb'egli possibile, che vi fossero delle cause *accidentali*, a noi sconosciute, capaci di dividere nel germe il cervello, ed i nervi? Il caso in quistione non farebb'egli punto analogo a quello di quella doppia matrice, di cui ho parlato nell' Articolo 350? Ancora lo ripeto un' altra volta, ciò che noi non giudichiamo *impossibile*, allora-  
chè

(1) *Memorie dell' Accad.* an. 1741. Vallisnieri ha citato questo caso.

chè lo consideriamo dopo l'evoluzione, e che infatti allora non è più impossibile, potrebbe in certe circostanze, che noi ancora non siamo in istato di assegnare, facilmente operarsi nel germe, tanto diverso in tutto dal feto prossimo a venire alla luce. Qual conseguenza si tirerebbe dalla forma, dalle proporzioni, e dalla situazione relativa delle parti del feto, a quelle delle parti del germe? Che non si prenderebbe egli pel medesimo animale? Che sappiamo noi, perchè debba esser permesso di arrischiare quì delle conghietture, quando abbiamo tutta l'attenzione di avvertire, che non le diamo se non per tali; che sappiamo noi, dico io, se alcuni di questi mostri a venti quattro dita, o almeno a ventuno, o ventidue dita, gli esempj de' quali non sono molto rari, non traggano le loro dita soprannumerarie da una divisione accidentale, accaduta sopra il dito vicino, allorachè il germe non era altro, che una gocciola di fluido condensato? In questo stato di delicatezza estrema le dita del germe, i tendini, i vasi, che vi terminano, possono essere in qualche modo paragonati al corpo del polipo, che si divide secondo la sua lunghezza, e che dopo di per se medesimo si riproduce. Siccome l'Autore della Natura ha messo in riserva ne' vegetabili, e negli animali de' germi per la riproduzione, e per la riproduzione de' tutti organici, come abbiamo veduto negli Articoli 238. 253. e 257. egli ha messo altresì in serbo in ciascheduna parte di un tutto organico, delle fibre, e delle fibrette relative a diversi casi fortuiti, che ne esigerebbono l'evoluzione, e che esse medesime potrebbero farla nascere, e questo l'abbiamo veduto nell' Articolo 236. Dunque queste fibre, e fibrette non erano chiamate a svilupparsi, se non allorachè sopravvenissero tali, o tali casi, e la divisione accidentale sopprimendo l'evoluzione di molte altre fibre, impiega in vantaggio delle fibre messe in serbo i succhi nutritivi, che si farebbono im-  
pie-

piegati nell'accrescimento di altre fibre. Dunque queste fibre sussidiarie si prolungano per tutti i versi, e conseguentemente alla determinazione fortuita, che hanno elleno ricevuta, e la parte, a cui elleno appartengono, si ripara, e si forma. Così io concepirei, che un dito tuttora gelatinoso, diviso a caso, potesse somministrare in certi casi un dito di più alla mano, od al piede. Si riparano benissimo nell'adulto de' vasi, de' tendini, delle ossa squarciate, e tagliate, delle rotture in mille maniere; dunque vi seguono delle nuove evoluzioni, che suppongono la preesistenza delle parti da svilupparsi. Quante piaghe enormi, che si sono perfettamente cicatrizzate? Quali sussidj non sono stati preparati nel regno vegetabile, e nel regno animale dall'Intelligenza adorabile, che ha provveduto tutto, e che sola conosce il fondo delle sue opere! Io non posso contenermi dal ricordare ancora per un'altra volta al mio Leggitore il nesso particolare dello sprone del gallo sopra la sua cresta, le bande ligamentose, che ne nascono, e che avanti pareva non esistessero, come lo abbiamo veduto nel Articolo 271, e la bella esperienza, che ho riportata nel Articolo 270. eseguita sì felicemente dal Sig. Dnhamel sopra la coscia di un pollo. Qual sorgente di spiegazioni non ci offeriscono elleno queste due esperienze! Quali idee non ci danno elleno dell'economia organica, e delle ricchezze della natura! Se si fanno nell'adulto delle riparazioni, e delle produzioni, che non sarebbesi osato di predire, quali non devono esser quelle, che possono accadere nel germe, tutte le fibre del quale sono sì duttili, e dove tutto deve svilupparsi! Se le dita di ciascuna mano, e di ciascun piede si toccassero nel germe, accaderebbe spessissimo, che si attaccherebbono insieme; poichè in parti così penetrabili, l'attaccamento si renderebbe facile; io dunque concepisco, che vi è una causa, che attende a tenerle separate, e ad impedire la loro

unione. Se questa causa, qualunque ella sia, ajutata dal concorso di circostanze particolari, operasse con troppa violenza, e' sarebbe facile, che ella tendesse allora a dividere le ossa del metacarpo, e del metatarso, e con esse le corrispondenti dita: le ossa, che meno resistessero, sarebbero le più esposte a questa divisione accidentale.

354. *Influenza, che può avere il liquor seminale sopra la formazione de' mostri.*

Forse esiste un'altra causa delle *mostrosità*, più nascosta, gli effetti della quale sarebbe possibile, che si diversificassero molto, ed ancora che si propagassero. Parlo delle *modificazioni* fortuite, che possono sopravvenire agli organi della generazione de' maschi, in virtù delle quali eglino separarebbono maggiori, o minori molecole proporzionate a tale, o tal parte del germe, e molecole di un'attività, e di una qualità diverse da quelle, che sono proprie della specie. Si può giudicare da' miei principj esposti intorno alla formazione del *mulo*, fin dove possa arrivare l'*influenza* del liquor seminale sopra i solidi del germe. Egli è già dimostrato, ch' e' non modifica solamente l'esteriore, ma ancora l'interiore; e che in particolare cangia tutta l'economia della laringe; noi non sappiamo precisamente come ciò succeda; ma siamo sicuri, che il fatto esiste, e che non esiste, se non per l'intervento dello sperma. Sappiamo forse noi come questo liquore faccia crescere le corna nel cervo, le zanne del cignale, la cresta ec. ? Dunque negli organi della generazione dell'asino vi è qualche cosa, che corrisponde alla sua laringe, e che si comunica a quella del germe: la conseguenza è legittima poichè l'organo della voce del cavallo imita sempre quello dell'asino, ogni volta che il primo riconosce il suo sviluppo dall'azione del liquor seminale nell'ultimo. Supponghiamo adesso, che la parte degli organi della generazione dell'asino, che corrisponde  
alla

alla sua laringe, a caso si muti, e che venga ad imitare quella dell'organo della generazione del cavallo, che corrisponde altresì alla sua laringe; e' ne nascerebbe dalla copula un mulo, l'esteriore del quale sarebbe simile ad un mulo ordinario, ma la voce imiterebbe quella del cavallo. Così supponendo altre specie di modificazioni negli organi della generazione dell'individuo fecondatore, avrebbonfi altri risultati nel germe fecondato. Il mulo non genera; gli organi della generazione del cavallo patiscono dunque un cambiamento dalla diversità dello sperma fecondatore del germe; dunque lo sperma dell'asino non può svilupparli totalmente, come fa quello del cavallo; dunque il perfetto sviluppo di questi organi dipende originalmente dal concorso del liquor fecondante proprio della loro specie. Ma se la modificazione sopravvenuta nel germe da questi organi non fosse di natura da apportare la *sterilità*, l'animale avrebbe la capacità di produrre de' *mostri*, che potrebbero essi medesimi produrne degli altri, con nuove modificazioni, che il seguito delle generazioni, e delle diverse circostanze sarebbe nascere appoco appoco, e muterebbe insensibilmente gli effetti della prima impressione.

355. *Famiglia di mostri, che si propagano.*

Sarebbe certo, che da simili principj io tenterei di spiegare il più imbarazzante di tutti i fatti, e sopra la certezza nel quale noi non potremmo formare il minimo dubbio. Io ancora non l'ho se non accennato, e temo di averne a intraprendere la spiegazione; bisogna pertanto, che io lo trascriva, e che procuri di analizzarlo; se l'omettessi, avrebbersi ragione di obiettarcelo. Noi lo dobbiamo ad un eccellente Osservatore, il Sig. Godeheu de Riville, Commendatore di Malta, e corrispondente dell'Accademia Reale delle Scienze, che ne comunicò la relazione al Sig. de Reaumur: eccola, come questo valente Accademico l'ha pubblicata nella sua *Arte di far nasce-*

re i pulcini. T. II. pag. 377. e seguenti della seconda edizione. „ Grazio Kalleja, nato di un padre che „ avea sette figli, venne al mondo con sei dita alle „ mani, ed a' piedi; le sei dita delle mani sono formate perfettissimamente, e le muove tutte con „ eguale facilità, il soprannumerario è posto trall' „ indice, e il medio, quelli de' piedi sono deformati, e formano una specie di corona, che rende il piede di una figura disgradevole. Questo *Grazio Kalleja* „ essendosi ammogliato in età di ventidue anni, ebbe „ quattro figli, Salvatore, Giorgio, Andrea, e Maria. Salvatore, il maggiore di tutti nacque con „ sei dita alle mani, ed a' piedi: le mani però non „ erano così ben formate come quelle del padre, „ ma le dita de' piedi erano ben disposte; il sesto „ dito era un poco più corto degli altri, ma questo „ non impediva, che il piede fosse di una bella „ figura. Questo Salvatore in età di 19. anni prese „ moglie, e fino al presente ha avuto due maschi, ed „ una femmina con sei dita alle mani, ed a' piedi, e „ un altro figlio, che non ne ha che cinque. Giorgio secondo figlio di *Grazio* nacque con cinque dita „ alle mani, ed a' piedi: si osserva nulladimeno una „ deformità nelle mani; i suoi due pollici sono più „ lunghi, e più grossi di quel, che dovrebbero essere, e toccandoli si sente in mezzo una specie di „ separazione, come se vi fossero due dita contenute dentro la medesima pelle; le cinque dita de' „ piedi sono, come ordinariamente sogliono essere, „ a riserva delle due prime dita del piede sinistro, „ che sono attaccate insieme. Questo Giorgio avendo „ preso moglie, ebbe tre femmine, ed un maschio; le due femmine maggiori hanno ciascuna „ sei dita alle mani, ed a' piedi, e la terza, che ha „ sei dita ad ambe le mani, ed al piede dritto, non „ ne ha che cinque al piede sinistro, ch'è benissimo „ formato; il maschio, che ancora è alla mammella „ non

„ non ha , che cinque dita a' piedi ed alle mani . An-  
 „ drea terzo figlio di *Grazio* nacque con cinque dita  
 „ alle mani , ed a' piedi benissimo formate , ed ha  
 „ avuti molti figli , che non hanno alcuna deformità .  
 „ Maria figlia di *Grazio* nacque con cinque dita alle  
 „ mani , ed a' piedi , ma ella ha ne' due pollici la  
 „ medesima deformità di Giorgio , le cinque dita de'  
 „ piedi sono della figura ordinaria ; ella si maritò in  
 „ età di diciotto anni , ed ha avuti due maschi , e  
 „ due femmine ; uno de' maschi ha sei dita ad un  
 „ piede , e gli altri tre sono della figura ordinaria .  
 „ Bisogna osservare , che i figli di Giorgio , che han-  
 „ no sei dita , sono per così dire storpiati ; appena  
 „ possono servirsi delle loro mani , per fare qualche  
 „ travaglio ; uno di questi figli ha due dita senz'  
 „ ugnà , ed un altro ne ha due storte , e quasi para-  
 „ latiche : la deformità delle mani di Giorgio fa-  
 „ rebb'ella passata ne' suoi figli ? I figli di *Salvadore*  
 „ hanno le mani , e i piedi meglio formati , e pos-  
 „ sono travagliare ; m'interessa il maritaggio della  
 „ sua figlia , che ha già quattordici anni , ed i  
 „ piedi , e le mani della quale non sono in nessuna  
 „ maniera deformi ; io sono curioso di sapere , s'ella  
 „ avrà de' figliuoli a sei dita , quantunque ella sposi  
 „ un marito , che non ne abbia che cinque ; se questo  
 „ accade , ecco degli esempj contrarj , ed allora sarà  
 „ vero , che il principio della generazione risiede  
 „ nell'uno , e nell'altro sesso . Noi abbiamo già per  
 „ prima prova *Maria* figlia di *Grazio* , ch'ebbe un  
 „ maschio con sei dita al piede sinistro , ma la fi-  
 „ glia di *Salvadore* potrà somministrarci qualche co-  
 „ sa più decisiva . „ *Grazio* , che avea sei dita alle  
 „ mani , ed a' piedi , i quali erano deformi , ebbe  
 „ dunque tre figli , ed una figlia , *Salvadore Giorgio* ,  
 „ *Andrea* , *Maria* . *Salvadore* nacque come suo padre ,  
 „ con sei dita alle mani ed a' piedi ; questi sono ben  
 „ formati , il sesto dito solamente è un poco più corto

degli altri; ma le mani sono altresì ben fatte, come quelle di suo padre. Egli ebbe due figli, ed una figlia a ventiquattro dita, ed un altro figlio, che non ne ha che venti. Giorgio nato con cinque dita alle mani, ed a' piedi, ha nulladimeno una deformità nelle mani; i suoi due pollici sono più grossi, e più lunghi, di quello che dovrebbero essere, ed allorchè si toccano, si sente nel mezzo una separazione, che indica, che siano doppi; v'ha ancora una specie di deformità nel piede sinistro, poichè le prime due dita sono attaccate insieme. Egli ebbe un maschio, e tre femmine; il maschio ha le mani, e i piedi senza deformità nissuna; le due figlie maggiori hanno sei dita alle mani, ed a' piedi, ma la minore, che ha sei dita a ciascuna mano, ed al piede dritto, ne ha sole cinque al piede sinistro. Osservate, che i figli di Giorgio, che hanno sei dita, sono in qualche modo storpiate, e non possono servirsi delle loro mani per travagliare. Andrea terzo figlio di Grazio, è venuto al Mondo con cinque dita alle mani, ed a' piedi ben formate, ed egli ha avuti molti figli, che non hanno alcuna mostruosità. Maria figlia di Grazio, nacque con cinque dita alle mani, ed a' piedi; ma ha ne' due pollici la medesima deformità di Giorgio suo fratello; ella ha messo alla luce due maschi, e due femmine, uno de' maschi ha sei dita ad un piede, gli altri tre non hanno niente di mostruoso.

356. *Saggio della spiegazione de' mostri che si propagano. Nuovi scbiarimenti de' principj dell' Autore intorno alla generazione.*

Io ho ricapitolate le principali circostanze del fatto, affinchè il mio Leggitore le concepisca meglio: ecco dunque una famiglia di *mostri*, che si propagano, ma con varietà più, o meno rimarcabili, e che l'ignoranza delle cause porterebbe a risguardarle come bizzarrie; la frequenza, e la propagazione del fenomeno mi pare, che non permetta di ricorrere all'ipotesi

teside'germi originalmente mostruosi. Grazio mostro a ventiquattro dita trasmette dunque le sue mostruosità in tutto, od in parte, nella maggior parte de' suoi figli. Siccome si è dimostrato negli Articoli 142. 154. 156. che il *germe* appartiene alla femmina, e che egli preesiste avanti la *fecondazione*, così non potrebbe fare a meno di non ammettere, che i figli di *Grazio* non fossero originalmente ben formati: i germi, che li rappresentavano in piccolo, non avevano, che cinque dita alle mani, ed a' piedi; eglino non sono diventati mostri, che per l'atto della generazione; quest'atto non invia al germe, che un liquore; dunque questo liquore contiene qualche cosa, che fa nascere la mostruosità. Perchè il liquor fecondante contenesse questa cosa, sorgente della mostruosità, bisognava che gli organi della generazione di *Grazio*, che lo hanno preparato, contenessero un'altra cosa, che corrispondesse alla mostruosa conformazione delle sue mani, e de' suoi piedi; dunque un accidente a noi sconosciuto avea *modificati* gli organi della generazione di *Grazio*, in un rapporto più, o meno determinato alla deformità, di cui si tratta; imperciocchè questa deformità è *per eccesso*, e questo eccesso suppone, che le molecole dello sperma adattate all'evoluzione delle mani, e de' piedi, fossero più attive, o più abbondanti in *Grazio*, che non sono negli altri uomini: posciachè la mostruosità si è *propagata*, il caso torna a quello del *mulo*. Lo sperma asinino agisce *per eccesso* sopra il germe cavallino, e' vi modifica singolarmente l'organo della voce; dunque e' v'ha negli organi della generazione dell'asino qualche cosa di *eccedente*, che non si trova in quelli del cavallo: dunque v'era negli organi della generazione di *Grazio* qualche cosa di *eccedente*, che comunemente non si trova nella specie umana; dunque questi organi in *Grazio* contenevano più vasi secretorj di un certo determinato genere, o de' vasi diversamente costituiti

da quelli degli altri uomini. Così il liquor femminile di *Grazio* ha potuto agire sopra i germi de' suoi figli, in un certo rapporto alle deformità del loro padre. E' non v' avrà generate delle nuove parti, i disegni delle quali non esistessero avanti: egli è abbastanza stabilito, che niente è generato, ma e' v' avrà determinato con maggior forza, e secondo le direzioni contrarie all'ordine *naturale*. L'evoluzione di diverse parti, o membranose, o cartilaginose, o ossee del metacarpo, e del metatarso, vi avrà cagionate delle divisioni, ed un eccesso di aumento, che avranno dato nascimento a quelle mostruosità, delle quali noi procuriamo di scoprire le cause. I solidi sono originalmente formati di diverse lame, che l'arte fa dimostrare separandoli; queste lame sono i rudimenti delle parti, che il germe farà vedere in seguito in più grande. Ciò, che l'arte eseguisce sopra simili lame, non potrebbero elleno farlo altresì delle cause naturali? Un impulso troppo violento di un liquore attivissimo, o un certo modo di agire di questo liquore, non potrebbero separare alcune di queste lame, che in questa maniera diventerebbono il principio di parti soprannumerarie? Bisogna bene, che il liquor femminile produca questo effetto, od un effetto analogo, poichè la mostruosità si propaga, ed è certo, che questo liquore non genera niente: dunque avanti la sua azione esistevano delle parti, ch'egli ha moltiplicate, e ch'e' non poteva moltiplicare, se non col dividerle, e col farle crescere eccessivamente. Si giudica facilmente, che questa evoluzione contro natura dee esser sempre più, o meno irregolare. Le parti *eccedenti* non potrebbero esser conformate interiormente, ed esteriormente di una maniera precisamente simile a quella di cui sono conformate le parti, che si sviluppano nell'ordine naturale? quelle deono differire da queste per alcuni caratteri più, o meno visibili, e più, o meno numerosi. La sezione  
ci

ci farebbe vedere questi segni, come ci fa vedere quelli del *mulo*, ma non abbiamo la sezione delle mani, e de' piedi di *Grazio*, nè quella de' suoi figli. La deformità, che si osservava nella conformazione de' piedi del primo, e in quella delle mani de' suoi due figli maggiori, e della sua figlia, prova sufficientemente, che l'evoluzione sia stata irregolare. Ma se l'azione di un certo sperma modifica *straordinariamente* diverse parti di un germe, quest'azione può essere modificata intorno a se dalla particolar costituzione, e dalla resistenza di queste parti in altri germi della medesima specie: poichè mi si accorderà senza difficoltà, che i germi *specificamente* simili, *individualmente* possono non esser tali. Quindi accaderà, che il medesimo liquor seminale non produrrà i medesimi effetti essenziali sopra tutti i germi da esso fecondati; egli è molto eterogeneo, ed i solidi de' germi non lo sono meno. Quante circostanze concomitanti, e susseguenti possono far nascere delle nuove irregolarità! Se la costituzione *originale* de' solidi è tale, che essi conservino la loro primiera conformazione, e che non si dividono, o alterino, il liquor seminale del mostro si contenterà di fare sviluppare il germe, e questo germe non sarà un *mostro*: in questa maniera *Andrea*, terzo figlio di *Grazio*, è potuto venire alla luce senz'alcuna deformità, almeno sensibile, e non è sorprendente, ch'egli abbia avuti de' figli, che lo abbiano somigliato in questo punto; ma i figli mostruosi di *Grazio*, hanno avuti de' figli altresì *mostruosi*. Come si è ella propagata la mostruosità? Mi pare, che sia quì la parte più difficile del problema. Io non abbandonerò i principj, che ho procurato di stabilire nel Capitolo precedente, Articoli 332. e 336. Poichè i figli mostruosi di *Grazio* hanno generato de' *mostri* bisogna, secondo i miei principj, che il liquor seminale del padre abbia agito sopra gli organi della generazione de' suoi figli in maniera, da modificare que-

questi organi in un rapporto alla mostrosità in questione. Si consulti di nuovo l'Articolo 354. Io ho ammesso questo per gli organi della generazione dell'avolo, e ne ho addotta la ragione. Nel medesimo tempo, che il liquor seminale di questi agiva intorno alle mani, ed ai piedi de' suoi figli, egli avrà agito ancora intorno alla parte degli organi della generazione, che corrispondeva ne' figli, alle loro estremità inferiori, e superiori, ed avrà impresso altresì in questi organi una disposizione a riprodurre la mostrosità. Io non so, se m'inganno; ma mi pare, che la conseguenza sia legittima. Acciocchè si operi *una certa* propagazione, bisogna, che gli organi, che servono alla propagazione, abbiano un *certo* rapporto colla cosa da propagare. Io non posso dire precisamente, in che consista questo *rapporto*, perchè non conosco l'intima struttura degli organi della generazione: io conosco solamente, che siccome il fegato, per esempio, è costruito in maniera da preparare, e separare la bile, così ancora vi sono negli organi della generazione delle specie di piccolissime viscere, che separano, e preparano le molecole relative a diverse parti del tutto. Se si mutasse la struttura del fegato, egli è evidentissimo, che non separerebbe più la bile, come la separava prima; nella medesima maniera, quando le piccole viscere, che io suppongo contenute negli organi della generazione, si mutano, le secrezioni particolari deono similmente mutarsi più, o meno, o relativamente alla qualità delle molecole separate. Il prodigioso numero de' vasi differenti, di cui sono composti gli organi, che preparano il liquor seminale, i loro maravigliosi intralciamenti, le loro piegature, e ripiegature, le loro circonvoluzioni, la loro estrema sottigliezza le più sublimi idee ci somministrano del meccanismo di questi organi, e possono aiutarci a concepire la possibilità della composizione, che io suppongo in essi. Quanto non si accrescerebb'ella la nostra ammi-

mi-

mirazione, se ci fosse permesso di conoscere distintamente tutta questa composizione, e di osservare pulitamente la forma, il lavoro, e le varie operazioni di questa innumerabile moltitudine di vasi secretorj. Le belle scoperte del Sig. Ferrein (1) intorno alla struttura delle viscere chiamate *glandulose*, le rendono ancora più maravigliose. Gli Anatomici fanno, che Malpighi pensava, che il fegato, la milza, i reni ec. fossero composti di un numero quasi infinito di glandule. Egliino fanno ancora che Ruysch si oppose a questa sentenza, e ch'ei pretendea di avere scoperto, che queste viscere fossero unicamente formate dell'intralciamiento di una moltitudine di piccoli vasi sanguigni. Il Sig. Ferrein, che ha osservato più di questi valenti Fisici, nell'organizzazione delle viscere, ha dimostrato la falsità delle loro opinioni, poichè ha veduto, e riveduto con maraviglia, che la sostanza propria del fegato, e de' reni era tutta composta di un'infinità di picciolissimi tubi, bianchi, e di figura cilindrica, incastrati gli uni negli altri in mille modi diversi, e l'ammirabile ammasso de' quali non ha niente di comune, nè colle glandule di Malpighi, nè co' vasi sanguigni di Ruysch. Una iniezione rossa penetrantissima non passa in questi piccoli vasi, ed il color bianco della loro propria sostanza non patisce la minima alterazione. Il Sig. Ferrein ha trovato il medesimo meccanismo in altre viscere, e il de Graaf avea provato, che l'organo, il quale prepara il liquor seminale era pur esso della medesima struttura. La scoperta di questo maraviglioso sistema de' tubi è una delle maggiori, che fatte abbia la Notomia ne' nostri tempi, e la sagacità del valente Accademico  
bril-

---

(1) *Memor. sopra la struttura delle viscere dette glandulose e particolarmente sopra quella de' reni, e del fegato. Mem. dell'Accad. Reale delle Scienze, an. 1749. pag. 489. e segg.*

brilla nella sua esposizione. Ma vi è senza dubbio gran lontananza dal punto, al quale egli è arrivato, a quello dove noi desideriamo di andare. Quante cose interessanti, e che ci furono lungo tempo sconosciute, non contengono questi piccioli cilindri, sì artificiosamente raggruppati, ripiegati, e contornati! Qual diversità non può egli esservi nella loro forma interiore, nella loro tessitura, nel loro calibro, nelle loro funzioni ec.! Se si riflette sopra tutto questo, sono certo, che si troverà, che la mia ipotesi non è sprovvista di fondamento nella natura; poichè questi piccoli tubi, o differenti porzioni di un medesimo tubo, possono somministrare all'organo de' *filtri* di diversi ordini. Uno non si riscuote dalla maraviglia, quando si pensa, che tutti i tubi bianchi di un rene umano messi per filo, formerebbono una lunghezza di diecimila pertiche. Il Sig. Ferrein lo ha provato; prego il Leggitore a consultare la sua bella Memoria; io temo di non poterla nè pure abbozzare. Adesso prego i veri Fisici a dirmi, se fin qui ho ragionato bene, se ho offesi i fatti, e se ho contraddetto a' miei principj? Ma si presenta una gran difficoltà. *Maria* unica figlia di *Grazio*, nata con cinque dita alle mani, ed a' piedi, ha avuti due maschi, e due femmine, uno de' maschi ha sei dita ad un piede. Il Sig. de Riville ne conclude, che il principio della generazione risiede nell'uno, e nell'altro sesso. (1) E il Sig. de Reaumur pare, che adotti questa conclusione, allorchè dice, (2) che questi fatti non sembrano favorevoli alla preesistenza de' germi. Contuttociò, egli è certo, come lo abbiamo veduto nell'Articolo 142. che il germe risiede originalmente nella femmina, e questi due valenti Naturalisti non lo sapevano. E' non è meno certo, che il ger-

---

(1) Vedi l'Articolo precedente.

(2) *Arte di far nascere ec.* Tom. II. pag. 376. seconda edit.

germe non è generato nella femmina, e che vi è sempre esistito. Come conciliare con questi principj il fatto singolare, che si offerisce al nostro esame? Quantunque questa *Maria* figlia di *Grazio* avesse il numero ordinario di dita, l'attento osservatore ci fa considerare, ch'ella avea ne' due pollici la medesima deformità di *Giorgio* suo fratello. Se le femmine fossero dotate d'un liquore prolifico, e' sarebbe facilissimo l'applicare agli organi della generazione di *Maria* quello, che ho detto di quelli di suo padre, e de' suoi fratelli; ma noi abbiamo veduto nell'Articolo 338. le ragioni, che sembrano provare, che le femmine non abbiano un simile liquore. Io non ricorrerò alla immaginazione della madre; refugio familiare di varj Autori, che non aveano abbastanza meditato sopra il meccanismo del nostro essere: io confesserò, che non concepisco, come l'immaginazione possa moltiplicare, e fare le dita del germe, e domando al mio Lettore, se ei lo concepisce. Molto meno dirò, che il liquor seminale di *Grazio* abbia agito sopra uno de' germi della seconda generazione, in virtù dell'*incastramento*, poichè se questo fosse vero, *Maria* avrebbe potuto sgravarsi di questo figlio a ventun dito, senza aver avuto commercio con alcun uomo; perchè il germe di questo figlio sarebbe stato fecondato dall'avolo. Ma quali ragioni ci sforzano ad ammettere, che questo figliuolo di *Maria* traesse il dito soprannumerario da sua madre, o dal suo avolo? Prego il mio Leggittore di osservare, che i tre altri figliuoli della figlia di *Grazio* non aveano niente di mostruoso. Non mi farebb'egli permesso d'inferirne da questo, che il dito in quistione non apparteneva alla fecondazione, e che egli era l'effetto di una causa *accidentale* concomitante, o susseguente, che avea diviso uno de' diti del piede ec. conforme a ciò, che ho esposto nell'Articolo 353. ? Non si sono veduti nascere de' figli con uno, o più diti soprannumerarj, senzachè il padre, nè la madre, nè alcu-

alcuno degli antenati avessero niente di mostroso, almeno esteriormente. Se *Maria* non fosse nata di una famiglia di mostri, che si propagano di padre in figlio, non si sarebbe attribuito alla fecondazione l'origine del dito soprannumerario di uno de' suoi figliuoli. Io non so, come avrebbe pensato il Sig. Lemery della nostra famiglia di Malta, nè come avrebbe spiegato que' mostri, che si propagano: io nientedimeno sospetterei molto, ch'egli avrebbe cercato la ragione di quel dito soprannumerario del figliuolo di *Maria* nell'unione di due germi, supponendo, come avea fatto ad altri mostri simili, o analoghi, che uno de' due germi fosse stato distrutto, e che non fosse rimasto di sue reliquie, se non il solo dito, di cui parliamo. Ma ricorrendo a questa ipotesi, uno si espone alle obiezioni tratte dalla *Dottрина della probabilità*, che il Sig. de Mairan ha quella opposte nella Storia dell' Accademia Reale delle Scienze per l'anno 1743. pag. 58. e segg. alle quali rimetto il mio Lettore. Frattanto mi prenderò la libertà di fare osservare, che le obiezioni di questo illustre Accademico perderebbono senza dubbio la loro forza, se noi conoscessimo tutte le circostanze, che possono procurare la parziale unione di due germi, e produrre la distruzione quasi totale di uno de' due, imperciocchè il numero delle *cognizioni*, che noi abbiamo di questo problema è assai piccolo. Le mostrosità, che si propagano, deono, secondo i miei principj, andar sempre scemando di generazione in generazione. L'effetto della prima causa, che diventa causa a suo tempo, non può produrre un effetto, che le sia precisamente eguale, e simile: non essendo i germi originalmente mostrosi, tendono sempre a ritenere la loro forma *naturale*, e primitiva; eglino dunque modificano l'azione de' liquori femminali, che s'indebolisce di mano in mano. Questo apparentemente si confermerebbe, se noi avessimo il seguito della storia de' discendenti di *Grazio Kallsia*, ed io prego il Sig. Commendatore de Riville a trasmettercelo.

celo. Questa materia è forse la più difficile, e la più interessante di tutte quelle, che possono offerirsi alla meditazione di un Fifico. Io desidererei di averla maggiormente schiarita; almeno ho procurato di portarmi in maniera, che i miei principi potessero condurmivi. Io lascio a' Fisiologiſti il giudicare dell' applicazione, che ho tentato di farne, ed intanto attendo delle nuove iſtruzioni dalla loro ſagacità, e dalle loro ricerche.

357. *Come ſarebbe poſſibile, che le cauſe accidentali agiſſero avanti la fecondazione.*

Io ſcorgo un' altra ſorgente di *moſtruofità*: l' aumento delle uova nelle galline *vergini*, non ci permette di dubitare, che il germe non creſca avanti la fecondazione, ſiccome l'abbiamo veduto nell' Articolo 341. Ei dunque potrebbe contrarre avanti la fecondazione, delle diſpoſizioni a certe *moſtruofità*; e ſarebbe anche poſſibile, che queſte diſpoſizioni non diventaeſero ſenſibili, ſe non dopo la naſcita. Perchè infatti non eſisterebbono egliino delle cauſe *accidentali*, che operaeſero ſopra il germe avanti la concezione, e che modificaeſero la conformazione originale di alcune delle ſue parti? Forſe vi ſono delle modificazioni *moſtruoe*, che ſi attribuiſcono alla fecondazione, o a delle cauſe concomitanti, e che ſono molto anteriori ad eſſe?

358. *Individui, le viſcere de' quali ſono traſpoſte. Oſſervazioni ſopra queſta traſpoſizione.*

Evvi una ſpecie di uomini, che il Sig. Lemery non voleva con ragione, che ſi qualificaeſſe di *moſtruoa*, e che gli avverſarj delle cauſe *accidentali* gli opponevano confidentemente; in queſti la forma eſteriore, ed interiore è precipamente la medefima, come negli altri uomini, e queſti preteſi moſtri fanno tutte le funzioni proprie della ſpecie, ma le loro viſcere ſembrano eſſere traſpoſte, il cuore, e la milza ſono dalla parte deſtra, il fegato dalla ſini-

stra ec. „ Figuriamoci, dice il Sig. de Fontanelle, „ (1) due case in tutto perfettamente simili, sup- „ ponghiamo, che una sia fabbricata in maniera, „ che la scala sia a mano destra, e nell'altra sia a „ sinistra; quella sarà fabbricata alla moda, se così „ si vuole, che avrà la scala a mano destra, ma „ l'altra casa non lascerà assolutamente di esser pur „ essa regolare, comoda, e bene intesa “. Così una simile trasposizione non cambia niente affatto l'essenza dell'economia organica, nè per conseguenza le funzioni vitali; dunque ella non potrebbe esser ravvisata come una vera *mostruosità*; il soggetto in cui è stata dimostrata per la prima volta, era vissuto 72. anni, senzachè si fosse mai dubitato della singolarità, che inchiudeva nel suo corpo. Egli non avea avuto moglie, e lo Storico dell' Accademia aggiugne a questo proposito, *ch'ei sarebbe stato curioso di sapere, se i suoi figliuoli avessero avute le parti interne trasposte, come esso, o almeno, se le aveano avute i suoi genitori*. Si vede benissimo, che secondo le mie idee, una simile trasposizione non è di natura sua da passare dal padre ne' suoi figliuoli. Il liquor femminile non può fare tali cambiamenti, siccome non può produrre un cuore, od un fegato. Questo esempio di trasposizione generale non è raro, (2) e queste spezie di casi senza dubbio si moltiplicherebbono più di quello, che si pensa, se il numero de' cadaveri, che si aprono, non fosse così sproporzionato rispetto a quello de' cadaveri, che non si aprono. Il Sig. Sue, che reca la descrizione, e la figura di una simile trasposizione, è sì certo della frequenza del caso, che egli esorta

(1) *Storia dell' Accademia*. 1740.

(2) Vedi l'Histoire de l'Accademie avant 1699. en Francois, Tom. II. pag. 44. année 1683., e le Recueil des Mémoires avant 1699. Tom. X. pag. 731.

ta i Medici, ed i Cerusici ad assicurarsene avanti di operare, ed accenna loro i mezzi per riconoscerlo. „ Vi sono, aggiugne egli, (1) delle malattie interne, ed accade di dover fare delle operazioni chirurgiche, nelle quali il Medico ed il Chirurgo si espongono a esser disprezzati, se non fanno avanti di trattare le malattie, o di fare le operazioni, la ricerca, e l'esame di una simile mutazione“. Siccome i germi, le parti de' quali sono state originalmente *trasposte*, non producono de' tutti organici meno perfetti, meno regolari, meno sani, così il Sig. Lemery ammetteva volentieri nelle uova questa *originale* trasposizione, e gli sembrava, siccome al Sig. de Fontenelle, una prova incontrastabile della libertà Divina.

359. *Malattie organiche; ultima ragione a favore de' mostri per accidente.*

Finalmente, se vi sono nell'adolescenza, e ancora nell'età virile, delle malattie, che possono render deformati, o mostruose diverse parti del corpo umano, (ch'è un'ultima ragione in favore de' mostri *per accidente*,) il Sig. Lemery non ha mancato di farla valere. Egli cita sopra questa materia degli esempi di cervelli, di membrane, di omenti in tutto, od in parte impietrite dalle straordinarie incurvature della spina, delle corna, che sono nate in diverse parti del corpo (2). Quest'ultimo caso non è meno rimarcabile: si legge una descrizione nelle *Trasfazioni Filosofiche*, (3) che si crederebbe favolosa, se non fosse attestata da testimonj irrefragabili. Siamo assicurati, che una fanciullina,

---

(1) *Mémoires de' Doctes Strangers* pubblicate dall'Accademia delle Scienze di Parigi, Tom. I. pag. 294. 1750.

(2) *Mémoires dell'Accademia* 1740.

(3) An. 1685. *Osservazioni curiose sopra tutte le parti della Fisica*, Tom. I. pag. 330.

lina, in età di tre anni, incominciò a germogliare delle corna in diverse parti del corpo, e particolarmente dalle giunture, e dalle articolazioni; queste corna ogni anno si moltiplicavano; in età di tredici anni era tutta armata di corna, nè pure le mammelle n'erano esenti; nella loro base erano simili a' porri, e nell'estremità alle vere corna; alcune erano a torre, a foggia di quelle del montone: ne avea uno a tutte l'estremità delle dita delle mani, e de' piedi, e la sua lunghezza era di due, o tre pollici: finalmente quando alcune di queste corna cadevano, in luogo loro ne nascevano altre (1). Il Sig. Lemery da questi fatti straordinari tira questa legittima conseguenza, e dice, che se simili malattie *organiche* si fossero manifestate in un feto, farebbesi qualificato per un *mostro*.

#### 360. Ragioni metafisiche.

Io non toccherò le ragioni *metafisiche pro e contra* l'esistenza de' germi originalmente mostruosi. Era inutile, secondo me, che i due celebri Antagonisti abbandonassero la Fisica, per occuparsi in discussioni, che gli erano del tutto straniero. Non bisogna dire, quello è saggio, dunque l'ha fatto Iddio, ma bisogna dire l'ha fatto Iddio, dunque è saggio. Ora non si dimostrava, che Iddio avesse fatti de' germi mostruosi.

### C O N C L U S I O N E.

Tutto ciò, che io ho esposto in quest'Opera intorno alla generazione degli animali, si applica naturalmente a quella de' vegetabili. Non prova meglio l'analogia di queste due classi di esseri organizzati-

---

(1) Vedi la Raccolta di molti esempj analoghi nella *Biblioteca della scienza* Tom. XVI. prima parte 1761. pag. 134. e seg.

nizzati, che la bella scoperta del sesso delle piante. Ciò, che fa il liquor seminale all'uovo, la *polvere degli stami* lo fa al seme; dunque io posso ragionare sopra questa, come ho ragionato sopra quello. Il pulcino esiste nell'uovo avanti la fecondazione, la *plantula* similmente preesiste nel seme, e la polvere degli stami è il principio del suo sviluppo. Io l'ho dimostrato nell'Articolo 178. Io già ho trattato assai profondamente nel Capitolo XII. del primo Tomo delle *riproduzioni* de' vegetabili; adesso dovrei trattare delle *varietà*, che si osservano nella loro fecondazione, e generazione, dopo passare alle mostruosità di ogni genere, che eglino ci offeriscono, e provare così con nuove ricerche l'*universalità* della Legge dell'*evoluzione*. Questa forse sarà la materia di un terzo volume, nel quale dopo avere esposto come in una pittura, le diverse maniere, per le quali gli animali, ed i vegetabili arrivano allo stato di perfezione, procurerò di penetrare d'avvantaggio la meccanica dell'*accrescimento*.

F I N E.

# T A V O L A

## D E' C A P I T O L I ,

### E DEGLI ARTICOLI

Contenuti in questa Seconda Parte.



### C A P I T O L O   P R I M O .

**C**ompendiosa esposizione di diversi fatti concernenti le Propagini, e gl' Innessi animali. Osservazioni sopra la riproduzione de' vermi di terra, sopra quella de' vermi di acqua dolce, e sopra la rigenerazione delle zampe del gambero. Saggio della spiegazione di questi fatti. Pag. 3

242. Introduzione.

243. Invito a fare delle nuove esperienze sopra i vermi di terra, per perfezionare la teoria delle riproduzioni animali, e quella della generazione.

244. Esperienze dell' Autore sopra la riproduzione dei vermi di terra.

245. Conseguenze di queste esperienze. Parallelo delle riproduzioni de' vermi di terra con quelle de' vegetabili. Conformità dell' une, e dell' altre.

246. Esperienze dell' Autore sopra la riproduzione di una specie di vermi d'acqua dolce.

247. Maniere colle quali si fa la riproduzione. Circostanze che la precedono, e che la seguitano.

248. Tubercoli, che germogliano le porzioni di questa specie di vermi. Conghiettture sopra la loro natura.

249. Continuazione del medesimo soggetto. Verme da due teste, e da due volontà.

250. Piccolissimi vermi usciti dall'interno di alcune porzioni di un verme grande.
251. Esperienze dell'Autore sopra un'altra specie di vermi d'acqua dolce. Quanto questa specie è degna di osservazione per la singolarità delle sue riproduzioni, e in che consista questa singolarità. Che ancora essa germoglia de' tubercoli.
252. Fenomeni della riproduzione delle zampe del gambero.
253. Saggio della spiegazione de' fatti esposti in questo Capitolo. Principj importanti tratti dalle riproduzioni vegetali. Applicazione di questi principj alle riproduzioni animali, di cui si fa quistione.
254. Conseguenza.
255. Esame della quistione, se i medesimi germi servono ed alla moltiplicazione naturale della specie, ed alla riproduzione delle parti tagliate. Comparazione tratta dalla differenza essenziale, ch'è tralla plantula esistente nel seme, e quella ch'esiste nella gemma del legno.
256. Indifferenza della quistione al fine dell'Autore. Ragioni di lasciarla indecisa.
257. Riflessioni sopra la preesistenza delle parti, o de' tutti che sembrano riprodotti, o generati.
258. Dell'unione della parte riprodotta col tronco: com'ella s'operi.
259. Regolarità perfetta delle riproduzioni ne' vermi d'acqua dolce, della prima specie.
260. Ricerche sopra le cause che determinano lo sviluppamento di un germe con preferenza a quello di un altro, in un dato luogo.
261. Conghietture sopra quella specie di vermi d'acqua dolce, che in certe circostanze germogliano una coda in vece di una testa.
262. Tentativi per ispiegare la riproduzione delle zampe del gambero.

## CAPITOLO II.

*Continuazione della storia delle propagini , e degl' innesti animali. Saggio della spiegazione de' polipi.* Pag. 35

263. *Introduzione alla teoria delle riproduzioni del polipo. Vedute dell' Autore.*
264. *Come si operi la riproduzione del polipo diviso trasversalmente. Energia della forza riproduttrice.*
265. *Come si può concepire, che si faccia la riproduzione nel polipo diviso pel mezzo secondo la sua lunghezza.*
266. *Spiegazione dell' idre , e della maniera che si forma un nuovo stomaco in frammenti piccolissimi del polipo.*
267. *Singolarità grande, che fanno vedere i frammenti del polipo diventati essi medesimi veri polipi. Conseguenza relativa alla struttura dell' insetto , ed al suo rovesciamento.*
268. *Come le porzioni del polipo arrivino ad innestarsi l' une all' altre.*
269. *Come si può concepire , che segua l' unione , o l' innesto di due polipi messi l' uno nell' altro.*
270. *Esclamazione delle maraviglie del polipo. Che la rigenerazione delle piaghe de' grandi animali ci offerisce de' fatti altrettanto maravigliosi. Bella esperienza del Sig. Duhamel sopra questa materia.*
271. *Spiegazione dell' innesto dello sprone del gallo sopra la sua cresta.*
272. *Tentativi per render ragione de' diversi fenomeni che presentano i polipi radrizzati in parte.*
273. *Spiegazione del polipo tagliato , rovesciato , tagliato di nuovo, ec. Riflessione sopra le nostre idee di animalità.*
274. *Spiegazione della moltiplicazione del polipo per germogli. Argomento in favore della precontinenza , o incastramento.*

275. *Come semplici porzioni del polipo facciano di per se medesime delle nuove produzioni. Effetto delle derivazioni.*
276. *Nuove considerazioni sopra la quistione, se la moltiplicazione naturale per polloni, e quella per divisione, si operino da germi identici.*
277. *Mostruosità. Qual idea si può fare della moltiplicazione naturale per divisione.*
278. *Conclusione. Ragione della gran fecondità del polipo.*
279. *Come si possa render ragione della moltiplicazione naturale per divisione di una specie di millepiedi.*
280. *Analogia tralla moltiplicazione del polipo fatto a imbuto, e quella del millepiedi fatto a dardo.*
281. *Difficoltà di spiegare la moltiplicazione per divisione naturale, del polipo fatto a bulbo. Motivo del silenzio, che l'Autore s'impone riguardo a questo.*
282. *Perchè gl'insetti che si trasformano, non sembrano propri ad essere moltiplicati per divisione. Riflessione sopra questo soggetto.*

### CAPITOLO III.

*Idee sopra la metafisica degl'insetti, che possono essere moltiplicati per divisione ec.* Pag. 59

283. *Che il polipo non è più favorevole al Materialista che al Cartesiano. False idee, che si sono fatte sopra questo soggetto, per non averlo meditato abbastanza. Scopo dell'Autore.*
284. *Sede dell'anima. Sensazioni. Me del polipo.*
285. *Dove risieda il me nell'insetto, che si divide in due trasversalmente. Dei movimenti che sembrano spontanei, e non sono che macchinali. Principj propri per ispiegarli, tratti dalla dottrina dell'irritabilità.*

286. Nuovo me, che si produce, e come.  
 287. Che le idre sono persone composte. Spiegazione del verme da due teste, e da due volontà. Osservazione sopra il fenomeno metafisico che presentano le idre.  
 288. Del me ne' polipi innestati.  
 289. Del me ne' polloni.  
 290. Del me negl' insetti, che si trasformano.

## CAPITOLO IV.

*Della fecondazione, e della generazione degli animali. Varietà, che vi si osservano. Osservazioni sopra alcuni luoghi della Storia Naturale del Signor di Buffon.* Pag. 67

291. Disegno di questo Capitolo.  
 292. Le nostre cognizioni sopra il sistema generale sono molto limitate. Conseguenza pratica.  
 293. Maniera, con cui si opera la fecondazione nella maggior parte degli animali.  
 294. Maniera singolare con cui si opera la fecondazione ne' pesci a squamme.  
 295. Eccezione rimarcabile alla regola dell' intromissione. Mosche di case.  
 296. Altra eccezione rimarcabile nella situazione degli organi della generazione. Amori delle cavallette, e quelli degli aragni.  
 297. Fecondazione, e parto dell' ape regina.  
 298. Continuazione del medesimo soggetto. Individui privi di sesso. Principio della politica delle pecchie. Idee sopra il loro istinto. Osservazione sopra il sentimento del Sig. di Buffon intorno alla fabbrica degli alveoli.  
 299. Diversità notabili tra il maschio, e la femmina in alcune specie. Le farfalle sprovviste d' ali. Il verme rilucente. Altro scarafaggio singolare. Li gallinsetti.

300. *Amori del rospo , e parto della femmina . Fecondazione e parto delle ranocchie . Scoperte del Svammerdam , e de Sigg. de Mours , e Roefel .*
301. *Gli animali ermafroditi . Il verme di terra . La lumaca . Alcune specie di conchiglie . Scoperte del Sig. Adanson .*
302. *Che gli ermafroditi , che non possono fecondare se medesimi rendono più dubbiosa l'esistenza de' vermi androgini . Nuova ragione di dubitarne . Problema Fisico .*
303. *Scoperte dell' Autore sopra i gorgogli . Soluzione del problema Fisico . Seguito di generazioni nate da un individuo solo , e loro risultato .*
304. *Distinzione reale di sesso tralligorgogli , e loro accoppiamenti . Osservazione sopra un passo del Sig. de Buffon , relativo a questo soggetto .*
305. *Differenze rimarcabili tra gl' individui della medesima specie appresso i gorgogli .*
306. *Che i gorgogli sono vivipari nella Primavera , e ovipari verso il finire dell' Autunno . Conghietture sopra l'uso de' loro accoppiamenti . Esperienza da tentarsi per verificare queste conghietture .*
307. *Che i polipi non hanno distinzione di sessi , e che sono veri androgini .*
308. *Insetti privi di sesso per una gran parte della loro vita .*
309. *Confutazione del sentimento del Sig. de Buffon sopra le metamorfosi degl' insetti .*
310. *Confutazione dell' opinione del medesimo Autore sopra la generazione de' bacchi ne' bambini , e sopra le generazioni equivoche .*

## CAPITOLO V.

*Serie di varietà che si osservano nella fecondazione , e nella generazione degli animali .* Pag. 111

311. *Introduzione .*

312. *Varietà nel tempo della copula.*
313. *Varietà negli effetti, che produce l'accoppiamento negl'individui generatori.*
314. *Varietà nel tempo del parto, e della covatura.*
315. *Specie vivipare. Specie ovipare. Specie che sembrano essere egualmente vivipare, e ovipare. Specie vivipare, e specie ovipare nella medesima classe, e nel medesimo genere. Matrice singolare di una mosca vivipara.*
316. *Specie vivipare, e ovipare nel medesimo tempo. Li gorgogli, ed i polipi fatti a spennacchio.*
317. *Nuova osservazione del Sig. Trembley sopra una specie di polipo fatto a spennacchio, le di cui uova possono esser conservate all'asciutto per molti mesi.*
318. *Ragioni che provano, che i polipi fatti a branchie, sono vivipari, ed ovipari. Perchè alcune specie siano nel medesimo tempo vivipare, ed ovipare. Come le uova de' pesci possono rinascere ne' stagni disseccati. Esperienza da tentarsi sopra questo soggetto.*
319. *Specie, che non sono propriamente nè vivipare, nè ovipare. Polipi, che moltiplicano per divisioni, e suddivisioni naturali. Come si possa concepire la generazione de' polipi fatti a bulbo. Riflessioni sopra la struttura de' polipi, e sopra l'animalità.*
320. *Movimenti osservabili, che si danno il tronco ed i rami de' polipi fatti a mazzetto. Principio di questi movimenti, e ciò che siano i rami.*
321. *Nuova scoperta del Sig. Trembley sopra i polipi fatti a nassa. Corpi oviformi, ai quali essi devono la loro origine. Singolarità del loro modo di nascere. Osservazioni sopra questo soggetto.*
322. *Specie la cui prole nasce tanto grossa come la sua madre. La mosca aragna. Principi sopra le metamorfosi degl'insetti in generale. Della meta-*  
mer-

*morfofi in palla allungata in particolare. Nuova prova della falſità dell'epigenefi.*

323. *Spiegazioni della mosca-aragna. Nuovo argomento in favore dell'evoluzione.*  
 324. *Oſſervazioni dell'Autore ſopra la mosca-aragna.*  
 325. *Uova che crefcono dopo eſſere ſtate partorite. Galle delle piante, e come ſi producano. Uova della mosca fatta a ſega.*  
 326. *Uova che contengono più embrioni.*  
 327. *Pipa o roſpo di Surinam.*  
 328. *Fecondità degli animali.*

## CAPITOLO VI.

*Scoperte Microſcopiche del Sig. Needham. Oſſervazioni ſopra queſte ſcoperte.* pag. 154

329. *Progreſſo della Storia Naturale dopo l'anno 1740. Riſſeſſioni ſopra queſto ſoggetto.*  
 330. *Scoperte del Sig. Needham ſopra gli animalletti delle infuſioni.*  
 331. *Conſequence del Sig. Needham, e oſſervazioni ſopra queſte conſequence. Lettera dell'Autore a queſto Naturaliſta, e ſua riſpoſta.*

## CAPITOLO VII.

*Idee ſopra la maniera, in cui ſi opera la fecondazione appreſſo gli animali.* pag. 170

332. *Scopo dell'Autore.*  
 333. *Principj generali ſopra la fecondazione.*  
 334. *Due punti principali che reſtano da dilucidare.*  
 335. *Come lo ſperma poſſa arrivare al germe. Scoperte di Malpighi ſopra la fecondazione delle uova della farfalla. Oſſervazioni dell'Autore ſopra queſto ſoggetto.*  
 336. *Ultimi tentativi dell'Autore per procurare di chiarire il miſtero della generazione.*  
 337. *Eſperienze da farſi per decider delle idee dell'Autore.*

*Autore sopra la fecondazione. Riflessioni sopra queste esperienze.*

338. *Sorgenti della similitudine de' figli a' loro genitori. ec. Delle voglie delle madri.*
339. *Della fecondazione de' germi, da' quali sono nascere delle femmine, e di quella de' germi de' neutri.*
340. *Osservazioni sopra l'organo della voce del mulo.*
341. *Che il germe cresce avanti la fecondazione: perchè non termini di svilupparsi senza essa?*
342. *Fatti che indicano l'incaltramento. Risposta ad un calcolo contro questa ipotesi.*
343. *Sentimento del Sig. Bourguet sopra la generazione. Giudizio sopra questo Autore.*
344. *Sentimento di un Enciclopedista sopra la generazione.*
345. *Sentimento del Sig. de Haller sopra la generazione.*
346. *Nuova considerazione intorno alla moltiplicazione senza congiungimento.*

## CAPITOLO VIII.

*Considerazioni sopra la formazione de' mostri. Conclusione.*

Pag. 214

347. *Celebre disputa sopra mostri.*
348. *Fatti favorevoli all'ipotesi delle cause accidentali.*
349. *Mostri per accidente, la formazione de' quali non procede dall'unione de' due germi.*
350. *Varj esempj di Mostri.*
351. *Osservazioni importanti in favore de' mostri per accidente. Diversità tra il germe, ed il feto, relativamente alla forma, ed alla disposizione delle parti. Inegualità nell'evoluzione.*
352. *Altra osservazione in favore de' mostri per accidente. Differenza tra il germe ed il feto, relativamente alla consistenza.*

353. *Mostro citato per prova dell' esistenza de' germi mostruosi . Riflessioni intorno a questa materia . Come si possa concepire che accadino certe divisioni accidentali .*
354. *Influenza , che può avere il liquor seminale sopra la formazione de' mostri .*
355. *Famiglia di mostri che si propagano .*
356. *Saggio della spiegazione de' mostri , che si propagano . Nuovi schiarimenti de' principj dell' Autore intorno alla generazione .*
357. *Come sarebbe possibile , che le cause accidentali agissero avanti la fecondazione .*
358. *Individui , le viscere de' quali sono trasposte . Osservazioni sopra questa trasposizione .*
359. *Malattie organiche ; ultima ragione a favore de' mostri per accidente .*
360. *Ragioni Metafisiche .*
- CONCLUSIONE.

pag. 244 .



F I N E.





